

Les oiseaux rares dans le Tarn et l'Aveyron

Premier rapport du Comité d'Homologation Tarn-Aveyron

Année 2012

Amaury Calvet, Samuel Talhoët et le CHTA.

Introduction

Ce 1^{er} rapport du Comité d'Homologation Tarn-Aveyron (CHTA) couvre l'année 2012.

114 fiches, concernant 203 observations, ont été examinées (56 tarnaises et 58 aveyronnaises) et le taux d'acceptation global est de 91 %.

Le Comité d'homologation est composé de 8 membres : Timothée Bonnet (LPO Tarn), Pascal Bouet (LPO Aveyron), Amaury Calvet (LPO Tarn), Gilles Cartier (LPO Aveyron), Pierre Chavanon (LPO Tarn), Alain Hardy (LPO Aveyron), Michel Malaterre (Secrétaire - LPO Tarn) et Samuel Talhoët (LPO Aveyron).

Le fonctionnement du comité et la liste des espèces soumises à homologation sont consultables sur http://www.faune-tarn-aveyron.org/index.php?m_id=20025

Révision de la liste des espèces soumises à homologation dans le Tarn et l'Aveyron

A partir du 1^{er} janvier 2013, suite à leur retrait de la liste du Comité d'Homologation National (CHN), les quatre taxons suivants sont soumis à l'homologation interdépartementale et intègrent donc la liste 2013 du CHTA. Il s'agit du Busard pâle *Circus macrourus*, de la Buse pattue *Buteo lagopus*, du Goéland à ailes blanches *Larus glaucoides glaucoides*, (le Goéland de Kumlien *Larus glaucoides kumlieni* restant sur la liste CHN) et de l'Étourneau roselin *Sturnus roseus*.

Validation des fiches

Chaque fiche qui parvient au comité est examinée par les huit membres. Une fiche peut être validée ou acceptée par un membre (vote A) ou bien refusée (vote R). Un membre peut aussi demander que la fiche soit discutée en réunion plénière (vote D) ou bien se déclarer non compétent pour donner un avis sur telle ou telle espèce ou pour statuer sur tel ou tel problème d'identification (NC). Si plus de 2 membres se déclarent incompetents, l'avis d'un expert extérieur peut être sollicité. La fiche est acceptée ou refusée par l'avis unanime des membres se déclarant compétents. Dans les autres cas, la fiche est examinée lors de la réunion plénière du CH et doit recevoir un avis unanime. Les données des deux départements sont validées par l'ensemble des membres composant le CH, sans distinction quant à leur origine géographique et départementale. Un membre du CH ayant rédigé une fiche ne participe pas à son examen ni à son homologation. Le CH se réunit en séance plénière au moins une fois par an. Cette séance plénière a eu lieu le 17 février 2013 à Lagrave (Tarn).

Fiche d'homologation

Une fiche d'homologation est constituée de deux parties : une partie *signalement* destinée à recueillir les informations générales concernant l'observation et une partie *description* de l'oiseau observé. Cette dernière, indispensable pour que le comité puisse se prononcer, doit être rédigée à partir des notes prises sur le terrain et non après consultation des guides, ce qui fausse

très souvent l'objectivité. Lorsque des photos sont prises, et nous engageons fortement tous les observateurs à essayer de photographier systématiquement les oiseaux lorsque cela ne remet pas en cause l'intérêt de ces derniers (éviter tout dérangement), il est bon de les joindre à la fiche, accompagnées d'une ou deux lignes de commentaires. Un simple croquis annoté ou un dessin constituent également des documents précieux et se montrent souvent plus fidèles à la réalité qu'une rédaction différée fondée sur le souvenir. D'autant qu'ils peuvent facilement être scannés ou photographiés puis envoyés par courrier électronique. Un **réel effort de rédaction** est demandé à tous les observateurs qui nous envoient leurs fiches. Dans une majorité de situations, il est tout à fait possible de faire une description claire et sans ambiguïté en quelques lignes. Une bonne description se contente de lister les uns sous les autres les critères déterminants qui ont permis l'identification. Cette méthode de la liste de critères est beaucoup plus convaincante qu'un long commentaire qui s'attarderait sur des aspects non diagnostiques du plumage.

Le Comité tient à remercier chaleureusement les observateurs ayant joué le jeu en lui soumettant leurs observations. Ils ont contribué au succès de cette 1^{ère} année de fonctionnement !

Liste systématique des données homologuées

Les données sont présentées comme suit :

1. Noms français et scientifique.
2. Dates pour lesquelles l'espèce est soumise à homologation
3. Entre parenthèses, les chiffres représentent respectivement le nombre de données et le nombre d'individus correspondant homologués en 2012.
4. Présentation des données par année classées par ordre alphabétique des départements.
5. Commune par ordre alphabétique, effectif (si non précisé : se réfère à 1 individu), âge et sexe si connus.
6. Précision si l'oiseau a été tué, trouvé mort ou capturé (capt.) par un bagueur.
7. Précision si l'oiseau a été photographié (photo), enregistré en vidéo (vidéo) ou sur bande audio (enr.) ou dessiné (croq.).
8. Date(s) d'observation.
9. Nom(s) du (ou des) observateur(s) ayant rédigé une fiche et/ou fourni une photo (classés par ordre alphabétique). La mention *et al.* Indique que d'autres observateurs ont vu le ou les oiseaux en question ; en cas de pluralité d'observateurs, le premier nom mentionné dans le rapport CHTA est celui du découvreur.

La séquence taxonomique est celle de la Liste des Oiseaux de France (CAF 2007), complétée par les mises à jour publiés par la CAF (Jiguet *et al.* 2009).

Les données présentées sont la propriété entière des observateurs. Elles doivent être citées comme telles dans la littérature, par exemple : Fuligule nyroca – deux individus à Serviès, Tarn, les 7 et 8 janvier 2012 (B. Long, in Calvet A., Talhoet S. *et al.* (2013). *Premier rapport du Comité d'Homologation Tarn-Aveyron – année 2012. CHTA*).

Afin que chaque observateur ait un aperçu global des observations d'oiseaux rares dans la région, le rapport du CHTA mentionne également les données d'espèces présentes sur la liste nationale et observées dans l'Aveyron et le Tarn l'année couverte par ce rapport (quand l'information est disponible) ainsi que l'année précédente. Ces données, homologuées ou au contraire rejetées par le Comité d'Homologation National, sont extraites des rapports annuels de ce comité et figurent ci-dessous, sans commentaires et précédées de la mention CHN.

FULIGULE NYROCA *Aythya nyroca* (1^{er} janvier – 31 décembre) **(46/10)**

Tarn – Serviès : 2 ind., photo, 7 et 8 janvier (B. Long) ; 1 ind., 28 et 29 janvier (B. Long et A. Calvet) ; 1 mâle ad. et 2 fem. ad., 4 et 7 avril (B. Long et S. Maffre) ; Fréjeville : mâle ad., photo, du 17 mars au 12 juillet (B. Long, S. Maffre, M. Malaterre et al.) ; 2 ad., 24 et 25 avril (S. Maffre) ; Cambounet-sur-le-Sor : 1 ind., 28 avril (B. Long).

Ce fuligule oriental est un migrateur et un hivernant rare dans notre pays où sa nidification reste exceptionnelle. La présence de 1 à 3 individus sur les plans d'eau de la vallée de l'Agout durant l'hiver 2011-2012 et le séjour d'un mâle jusqu'en juillet 2012 sont remarquables pour le département (où l'espèce était d'apparition occasionnelle jusqu'à ces dernières années). Bien que l'espèce puisse être détenue en captivité, le comportement des oiseaux (notamment les distances de fuite élevée, analogues aux individus sauvages d'espèces proches) plaident pour une origine sauvage.

HARLE BIEVRE *Mergus merganser* (1^{er} janvier – 31 décembre) **(13/8)**

Aveyron – Cantoin, fem., 28 février (S. Talhoet) ; Castelnau-de-Mandailles, mâle ad. et fem. ad., 12 et 13 février (M. Bernard, P. Ayrat) ; Saint-Symphorien-de-Thénières, fem. ad., 7 mars (S. Talhoet)

Tarn – Sorèze, 1 à 2 mâles et 1 fem., photo, du 4 au 24 février (J.M. Coste, B. Long et al.) ; Sorèze, mâle, 7 décembre (J.M. Coste)

Les observations de cette espèce sont devenues annuelles sur quelques sites ces derniers hivers dans nos deux départements. A noter le stationnement de plusieurs oiseaux sur le Bassin de Saint-Ferréol (Sorèze-81) durant tout le mois de février (bien qu'il ne soit pas certain qu'il s'agisse des mêmes individus sur toute la période).

BUTOR ETOILE *Botaurus stellaris* (1^{er} janvier – 31 décembre) **(1/1)**

Aveyron – Flavin, photo, 5 avril (A. Paba)

Il s'agit de la 5^e donnée aveyronnaise lors du passage migration pré-nuptial, à une date tout à fait conforme aux autres observations. La particularité de cette observation réside dans le lieu de l'observation : en bordure d'un jardin privé. Cela n'est pas sans rappeler cette observation d'un Butor étoilé perché sur le toit d'une maison à Millau le 6 avril 2002 !

IBIS FALCINELLE *Plegadis falcinellus* (1^{er} janvier – 31 décembre) **(18/5)**

Tarn – Guitalens-Lalbarède : 1 à 4 individus, photo, 13 mars au 28 avril (B. Long, M. Malaterre, S. Maffre et G. Vautrain) ; Labruguière : 1 ind., photo, 25 au 28 mars (P. Delgado).

Ce stationnement est exceptionnel pour le département, tant par le nombre d'oiseaux que par la durée du séjour. Seules 5 observations avaient été rapportées jusque là dans le département, essentiellement à Cambounet et Fréjeville.

Ces observations sont à mettre en relation avec la forte croissance des effectifs nicheurs en Camargue ces dernières années (14 couples en 2006 et 518 en 2011 -Dupuis et al. 2011).

SPATULE BLANCHE *Platalea leucorodia* (1^{er} janvier – 31 décembre) **(15/4)**

Tarn – Carbes, Fréjeville et Cambounet-sur-le-Sor : imm., photo, du 4 au 28 mars (B. Long, A. Calvet, C. Daussin et al.) ; Cambounet-sur-le-Sor : imm., les 10 et 14 juin (B. Long et al.) ; 1 imm. et 1 ad., photo, le 10 juillet (B. Long, E. Haber et R. Malrieu).

Année exceptionnelle avec trois observations différentes, dont le séjour d'un immature durant presque tout le mois de mars sur le complexe de gravières de Fréjeville – Cambounet et la présence de deux oiseaux en juillet à Cambounet. L'espèce n'avait été notée jusque là qu'à 5 reprises dans le département ; la première mention datant 1998 à Cambounet.

FLAMANT ROSE *Phoenicopterus roseus* (1^{er} janvier – 31 décembre) **(5/1)**

Tarn – Cambounet-sur-le-Sor, imm., photo, du 25 au 31 décembre (S. Maffre, B. Long).

L'espèce est d'apparition occasionnelle dans le sud du département du Tarn, essentiellement à la Réserve naturelle de Cambounet-sur-le-Sor. Jusque là, seules 4 observations ont été réalisées dans le Tarn depuis 2000. Pour mémoire, rappelons la présence exceptionnelle de 35 individus à Cambounet-sur-le-Sor le 21 mars 2005 (C. Aussaguel), certainement déroutés par un coup de vent « marin ».

ELANION BLANC *Elanus caeruleus* (1^{er} janvier – 31 décembre) **(10/6)**

Aveyron – Belmont-sur-Rance, ad., photo, du 26 août au 5 septembre (T. Bonnet et al.) ; Laval-Roquecezière, ad., photo, 6 septembre (A. Calvet et al.) ; Saint-Georges-de-Luzençon, photo, 13 avril (A. Hardy) ; Sévérac-le-Château, ad., photo, 25 et 29 septembre (F. Legendre et al.) ; Villeneuve, ad., du 7 au 8 octobre (P. Bounie, A. Amiel).

Tarn – Fréjairolles, 2 septembre (T. Matarin).

Pas moins de 6 individus différents observés en 2012. Le stationnement le plus long est noté dans le Rougier de Camarès avec une présence d'au moins 10 jours. Au vu des concordances de dates et de la distance de seulement 14 km entre les deux sites, il est possible que l'individu observé à Laval-Roquecezière soit le même que celui observé dans le Rougier de Camarès. Excepté l'observation du 13 avril à Saint-Georges-de-Luzençon, toutes les observations ont été effectuées entre la fin août et début octobre. L'explosion démographique de l'espèce depuis les sites de nidification du sud-ouest de la France (139 jeunes à l'envol en 2010) se traduit logiquement par une augmentation des contacts dans les régions avoisinantes (de Seynes et al. 2011).

BUSARD DES ROSEAUX *Circus aeruginosus* (1^{er} novembre – 15 mars) **(1/1)**

Aveyron – Saint-Félix-de-Sorgues, type fem., 12 mars (R. Straughan).

Cette espèce n'avait pas été vue aussi précocement en Aveyron lors du passage pré-nuptial depuis 2003 (11 mars).

CHN –BUSARD PALE *Circus macrourus* **(1/1)**

Aveyron – Sévérac-le-Château, mâle ad., 30 septembre (F. Legendre).

Il s'agit de la deuxième observation de cette espèce dans le département de l'Aveyron après un mâle immature le 9 septembre 2008 à Laval-Roquecezière.

CHN –BUSE PATTUE *Buteo lagopus* **(1/1)**

2011 Aveyron – Salles-Curan, 21 mars (P. Dréno, S. Talhoet).

Cette observation est à replacer dans un contexte d'un hivernage 2011-2012 en France très important, certains oiseaux ayant atteint le sud de la France et même le nord de l'Espagne.

AIGLE BOTTE *Aquila pennata* (1^{er} octobre – 15 mars) **(2/2)**

Aveyron – Fondamente, 19 février (F. Legendre).

Tarn – Lalbarède, 8 février (S. Maffre).

Dates atypiques mais faisant suite à plusieurs observations répétées dans les départements frontaliers à cette période (Hérault par exemple). Les cas d'hivernages sont rares mais annuels ces dernières années sur le littoral méditerranéen.

FAUCON EMERILLON *Falco columbarius* (15 mai – 15 septembre) **(1/1)**

Tarn – Caucalières, type fem., photo, 3 septembre (C. Daussin).

Observation précoce pour ce petit faucon nordique dont le passage intervient plutôt à partir de la fin septembre. Quelques hivernants sont rapportés annuellement dans le Tarn.

FAUCON D'ELEONORE *Falco eleonora* (1^{er} janvier – 31 décembre) **(14/17)**

Aveyron – Saint-Chély-d'Aubrac : 1 sombre le 4 août (P. Dréno, S. Talhoet) ; Laval-Roquecészière : 1 clair le 16 août (T. Bonnet) ; 1 clair et 1 sombre le 18 août (T. Bonnet) ; 1 clair et 2 sombres, photo, le 19 août (D. Alquier, T. Bonnet, B. Long) ; 1 sombre le 23 août (T. Bonnet) ; 1 clair le 25 août (S. Talhoet) ; 1 clair le 30 août (A. Calvet, J.L. Cance) ; Villeneuve : 1 clair le 14 septembre (M. Fayret).

Tarn – Burlats : 1 clair le 23 juin (A. Calvet) ; Labruguière : 1 clair le 29 juillet (A. Calvet) ; Viane : 1 clair le 15 août, 1 sombre imm., photo, le 18 août et 1 clair ad. le 24 août (T. Bonnet) ; Palleville : 1 sombre le 4 septembre (J.M. Coste).

Secteurs et dates d'observation classiques pour le département du Tarn et le Sud-Aveyron. Ce rare faucon méditerranéen est un « estivant » régulier en petit nombre dans les Monts de Lacaune et la Montagne noire, où il est observé chaque année depuis le début des années 2000. Belle série de 9 observations en août sur le secteur de Roquecészière (12) – Viane (81). Les données du nord et de l'ouest de l'Aveyron sont plus originales quant à leur localisation.

MARQUETTE PONCTUEE *Porzana porzana* (1^{er} janvier – 31 décembre) **(1/1)**

Aveyron – Villefranche-de-Rouergue, croq., 18 mars (M. Fayret).

Cette marouette est une migratrice occasionnelle en Aveyron où seuls 2 ind. avaient été observés auparavant (un du 7 au 11 avril 1998 et un du 27 mars au 5 avril 2004). On peut remarquer que ces 3 observations sont précoces puisque la migration pré-nuptiale de cette espèce culmine généralement fin avril pour se prolonger en mai.

MARQUETTE POUSSIN *Porzana parva* (1^{er} janvier – 31 décembre) **(3/1)**

Aveyron – Martiel, mâle ad., photo, du 27 mars au 1^{er} avril (G. Cartier, S. Rey et al.)

Il s'agit de la 1^{ère} observation de l'espèce dans le département de l'Aveyron. Comme pour la Marouette ponctuée, on peut remarquer que cette observation semble assez précoce puisque la migration pré-nuptiale de cette espèce culmine dans la deuxième décennie d'avril puis diminue progressivement.

RALE DES GENETS *Crex crex* (1^{er} janvier – 31 décembre) **(2/1)**

Aveyron – Laguiole, 6 et 11 juillet (P. Ayrat).

Un chanteur entendu dans une prairie de fauche aveyronnaise, cela n'était pas arrivé depuis le milieu des années 1980 ! En 2012, les prairies des Basses Vallées Angevines où se situe la majorité des reproducteurs en France sont restées inondées très tardivement, obligeant les Râles des genets à chercher de nouveaux sites de nidification. Ainsi, dans ce contexte, de nombreux chanteurs ont été contactés en Lozère (Aubrac et Causses) et donc un oiseau à Laguiole.

GRUE CENDREE *Grus grus* (15 avril – 30 septembre) **(1/2)**

Aveyron – Sainte-Croix, 2 ind., 30 juin (M. Fayret).

Observation toute à fait remarquable au vu de la date, même à l'échelle nationale. Les oiseaux ont été vus en vol correctement et les cris ont été entendus permettant ainsi d'exclure une erreur d'identification.

GRAVELOT A COLLIER INTERROMPU *Charadrius alexandrinus* (1^{er} janvier – 31 décembre) **(1/1)**

Aveyron – Canet-de-Salars, mâle ad., 29 avril (P. Dréno, S. Talhoet).

Migratrice occasionnelle en Aveyron, cette espèce n'avait été observée qu'une seule fois auparavant (11 avril 2008). L'observation de 2012 était pédagogique puisque le Gravelot à collier interrompu était en compagnie d'un Petit Gravelot et d'un Grand Gravelot ! La date d'observation est classique par rapport au passage pré-nuptial en France.

PLUVIER ARGENTE *Pluvialis squatarola* (1^{er} janvier – 31 décembre) **(1/1)**

Aveyron – Saint-Chély-d'Aubrac, photo, 22 septembre (E. Poncet).

Il s'agit de la 1^{ère} mention de l'espèce pour le département de l'Aveyron. Le lieu semble assez atypique puisque le plan d'eau est situé à 1 300 m d'altitude mais de nombreux limicoles ont déjà été observés en halte migratoire sur ce plan d'eau. La date d'observation correspond au pic de passage post-nuptial en France.

BECASSEAU SANDERLING *Calidris alba* (1^{er} janvier – 31 décembre) **(2/2)**

Aveyron – Canet-de-Salars, 2 ind. le 29 avril puis 1 ind. le 1^{er} mai (P. Dréno, S. Talhoet et al.).

Très rare de passage en Aveyron. Ces observations constituent les 4^e et 5^e données de migration pré-nuptiale et les premières données pour le Lac de Pareloup. Les dates sont en revanche classiques.

BECASSINE SOURDE *Lymnocyptes minimus* (1^{er} janvier – 31 décembre) **(1/1)**

Tarn – Gijounet, 18 mars (T. Bonnet).

Observation d'une espèce discrète, très rarement notée ces dernières années par les observateurs tarnais.

BECASSE DES BOIS *Scolopax rusticola* (1^{er} avril – 15 octobre) **(2/2)**

Aveyron – Najac, 9 avril (J.L. Cance).

Tarn – Murat-sur-Vèbre, 20 juin (F. Bonnet).

L'observation de Najac concerne probablement un hivernant ou un migrateur tardif. En revanche, l'oiseau de Murat-sur-Vèbre est noté en pleine période de reproduction avec un comportement de nidification (croule), le site étant connu pour abriter quelques oiseaux reproducteurs.

CHEVALIER STAGNATILE *Tringa stagnatilis* (1^{er} janvier – 31 décembre) **(3/1)**

Tarn – Cuq, photo, du 27 au 29 avril (B. Long, M. Malaterre).

*Il s'agit de la 1^{ère} observation de l'espèce dans le département du Tarn. La date d'observation correspond au pic de passage pré-nuptial en France. Cette petite gravière a permis l'observation de nombreuses espèces rares en 2012 et a aussi accueilli le premier cas de nidification de l'Échasse blanche (*Himantopus himantopus*) dans le Tarn ! Les niveaux d'eau, extrêmement bas au cours du printemps 2012, ont dégagé des vasières propices au stationnement des limicoles.*

CHEVALIER ABOYEUR *Tringa nebularia* (1^{er} novembre – 28 février) **(4/2)**

Tarn – Cambounet-sur-le-Sor, 2 ind. 1^{er} novembre (S. Maffre) ; Fréjeville, 2 ind. du 8 au 11 novembre (S. Maffre, B. Long).

Au vu des concordances de dates et de la distance de seulement 2 km entre les deux sites d'observation, il s'agit très probablement des mêmes oiseaux. Les déplacements d'oiseaux sont réguliers entre ces deux gravières de la vallée de l'Agout.

TOURNEPIERRE A COLLIER *Arenaria interpres* (1^{er} janvier – 31 décembre) **(6/3)**

Aveyron – Soulages-Bonneval, 2 ind. le 31 août puis 1 ind. le 1^{er} septembre (P. Ayrat, P. Bouet).

Tarn – Vielmur-sur-Agout, 1A, photo, du 5 au 11 septembre (B. Long, S. Maffre).

Il s'agit des premières mentions de l'espèce pour le département de l'Aveyron. Le site a accueilli de nombreux limicoles à la fin de l'été en raison des nombreuses vasières favorables aux haltes migratoires de ce groupe d'espèces. L'observation tarnaise est, quant à elle, la 4^{ème} mention pour le département. Les dates d'observations sont classiques par rapport au passage post-nuptial en France.

LABBE PARASITE *Stercorarius parasiticus* (1^{er} janvier – 31 décembre) **(1/1)**

Aveyron – Laval-Roquecezière, 1A, 20 août (T. Bonnet).

Tarn – Saint-Salvy-de-Carcavès : 1A, 20 août (T. Bonnet).

Cette observation remarquable de cette espèce marine constitue la 1^{ère} mention pour le département de l'Aveyron mais aussi pour le Tarn car le site d'observation est limitrophe et l'oiseau a également survolé la commune tarnaise de Saint-Salvy-de-Carcavès. Cette donnée est à replacer dans un contexte national où plusieurs Labbes parasites ont été observés à l'intérieur des terres à peu près à la même période (Pyrénées et Auvergne notamment).

GOELAND RAILLEUR *Larus genei* (1^{er} janvier – 31 décembre) **(1/1)**

Tarn – Fréjeville, 2A, 11 mars (M. Malaterre).

Troisième mention tarnaise pour ce rare goéland méditerranéen après l'observation d'un adulte en mai 2011 à Labruguière et la reprise d'un oiseau bagué poussin en Ukraine en juillet 1981 et trouvé mourant à Mazamet en novembre 1982.

STERNE HANSEL *Gelochelidon nilotica* (1^{er} janvier – 31 décembre) **(2/2)**

Tarn – Fréjeville, 28 avril (S. Maffre) ; Labruguière, 30 juin (M. Malaterre).

Deux observations le même printemps d'une espèce qui n'avait jusqu'ici été notée qu'à trois reprises dans le département ; la dernière mention remontant à avril 2004 à Labruguière.

PIGEON COLOMBIN *Columba oenas* (15 novembre – 15 février, uniquement en Aveyron) **(1/5)**

Aveyron – Vimenet, 5 ind., 4 janvier (Y. Beucher).

Il s'agit de l'une des rares données hivernales de Pigeon colombin en Aveyron alors que l'espèce est assez commune dans le département du Tarn à cette saison !

BERGERONNETTE PRINTANIERE D'ITALIE *Motacilla flava cinereocapilla* (1^{er} janvier – 31 décembre) **(4/3)**

Aveyron – Soulages-Bonneval, 1 mâle le 3 avril, 2 mâles le 4 avril, 1 mâle le 7 avril (P. Ayrat, S. Talhoet et al.).

Tarn – Labruguière, 1 mâle le 30 avril (A. Calvet).

BERGERONNETTE PRINTANIERE FLAVEOLE *Motacilla flava flavissima* (1^{er} janvier – 31 décembre) **(9/5)**

Aveyron – Martiel, 1 mâle le 19 avril (J.L. Cance) ; Soulages-Bonneval, 1 mâle, photo, du 3 au 13 avril (P. Ayrat, S. Talhoet, F. Legendre et al.).

Tarn – Cuq, 2 mâles, photo le 11 avril puis 1 mâle les 12 et 13 avril (B. Long) ; Fréjeville, 1 mâle le 15 avril (B. Long).

Belles séries d'observations de ces sous-espèces de Bergeronnette printanières réputées rares lors des passages dans nos départements. Un statut qui pourrait évoluer avec l'amélioration des connaissances et une meilleure attention portée par les observateurs à ce sujet assez complexe.

CHN – BERGERONNETTE CITRINE *Motacilla citreola* (2/1)

Aveyron – Soulages-Bonneval, mâle ad., 3 et 6 avril (S. Talhoet, P. Ayrat).

Il s'agit des premières mentions de l'espèce pour le département de l'Aveyron. Le site a accueilli de nombreuses Bergeronnettes printanières (plusieurs sous-espèces) et grises au printemps en raison des nombreuses vasières favorables aux haltes migratoires de ce groupe d'espèces.

GORGEBLEUE A MIROIR *Luscinia svecica* (1^{er} janvier – 31 décembre) (2/2)

Aveyron – Salles-Courbatiès, fem., 7 avril (A. Amiel) ; Salles-Courbatiès, mâle, 14 avril (A. Amiel)

Deux oiseaux différents observés sur le même site à une semaine d'intervalle. Cela laisse présager un passage plus important qu'on ne le croit dans le département de l'Aveyron ! Ces observations constituent les 6^e et 7^e données de migration pré-nuptiale, à des dates un peu plus tardives que les 5 données précédentes (comprises entre le 21 mars et le 1^{er} avril).

ROUSSEROLLE TURDOÏDE *Acrocephalus arundinaceus* (1^{er} janvier – 31 décembre) (1/1)

Tarn – Lagrave, 21 juin (P. Chavanon).

La présence d'un individu chanteur au sein de la roselière de Lagrave en bord du Tarn n'a été que ponctuelle. La nidification de l'espèce sur ce site était connue jusque dans les années 1990 (2000?). La Rousserolle turdoïde est en net déclin aussi bien au niveau national qu'en Midi-Pyrénées, où les quelques mentions récentes en période de reproduction proviennent toutes des vallées de la Garonne et du Tarn (Haute-Garonne et Tarn-et-Garonne – Frémaux et Ramière 2012).

FAUVETTE GRISETTE *Sylvia communis* (1^{er} octobre – 15 mars) (2/2)

Aveyron – Saujac, 1^{er} octobre (P. Bounie) ; Villeneuve, 3 octobre (A. Amiel).

Avant ces deux observations, la Fauvette grisette n'avait été observée que 3 fois au mois d'octobre en Aveyron : le 2 octobre 2004 à Najac, le 1^{er} octobre 2010 à Labastide-l'Évêque et le 2 octobre 2011 à Najac. On peut remarquer la similitude de ces dates !

POUILLOT A GRANDS SOURCILS *Phylloscopus inornatus* (1^{er} janvier – 31 décembre) (1/1)

Aveyron – Montlaur, photo, 14 octobre (V. Guiraud).

Il s'agit de la 1^{ère} mention en Aveyron pour cette espèce sibérienne. Cette donnée est à replacer dans un contexte national où plusieurs Pouillots à grands sourcils ont été observés dans les départements voisins à cette période (notamment en Lozère, l'Hérault, le Puy-de-Dôme...).

CHN – MESANGE A LONGUE QUEUE *Aegithalos caudatus caudatus* (1/3)

2011 Aveyron – Le Clapier, 3 ind., photo, 10 mars (F. Legendre).

Il s'agit de la 1^{ère} mention de cette sous-espèce pour le département de l'Aveyron. Cette observation est à replacer dans un contexte d'un hivernage 2010-2011 en France très important.

GRIMPEREAU DES BOIS *Certhia familiaris* (1^{er} janvier – 31 décembre) **(3/3)**

Aveyron – Saint-Chély-d'Aubrac, 2 avril (P. Ayral) ; Sainte-Geneviève-sur-Argence, photo, 6 janvier (S. Puechmaille) ; Soulagès-Bonneval, 7 avril (F. Legendre).

Ces trois sites d'observations semblent assez classiques par rapport à la répartition départementale actuellement connue.

PIE-GRIECHE A TETE ROUSSE *Lanius senator* (15 septembre – 31 mars) **(1/1)**

Tarn – Labruguière, 1A, 25 septembre (T. Bonnet).

Une observation tardive pour ce migrateur transsaharien qui quitte notre pays habituellement entre la fin juillet et le début de septembre.

CASENOIX MOUCHETE *Nucifraga caryocatactes* (1^{er} janvier – 31 décembre) **(1/1)**

Tarn – Mazamet, 18 octobre (P. Pouzenc).

Seconde observation de l'espèce en Montagne noire après celle d'un oiseau au Pic de Nore (Aude, à proximité de la limite avec le Tarn) par S. Nicolle le 29 juillet 2009.

Les données sont extrêmement rares dans nos deux départements.

NIVEROLLE ALPINE *Montifringilla nivalis* (1^{er} janvier – 31 décembre) **(1/8)**

Tarn – Dourgne, 8 ind., photo, 18 novembre (B. Long).

Observation à une date de passage classique pour l'espèce. Les mentions de niverolles sont rares dans le département. L'hivernage de quelques individus est régulier au Pic de Nore en Montagne noire audoise (à quelques centaines de mètres du Tarn).

PINSON DU NORD *Fringilla montifringilla* (15 avril – 30 septembre) **(1/1)**

Aveyron – Sévérac-le-Château, 30 septembre (S. Talhoet).

Il s'agit de la donnée automnale la plus précoce dans le département de l'Aveyron. L'hivernage du Pinson du nord a été important dans nos régions lors de l'hiver 2012-2013, ceci expliquant peut-être cela.

SIZERIN FLAMME *Carduelis flammea* (1^{er} janvier – 31 décembre) **(2/2)**

Aveyron – Bertholène, 10 novembre (S. Talhoet).

Tarn – Lacaune, 3 novembre (T. Bonnet).

Cette espèce n'avait pas été recontactée dans le département de l'Aveyron depuis 1965, soit près de 50 ans ! La donnée tarnaise est seulement de la 3^{ème} mention circonstanciée (en dehors de deux données anciennes non vérifiées), après l'observation d'un oiseau à Brassac le 14 novembre 1997 et la capture pour baguage d'une femelle à Vabre le 8 mars 2008. Un afflux assez important a été noté lors de l'hiver 2012-2013, l'espèce ayant été vu à plusieurs reprises dans les départements limitrophes, notamment la Lozère, l'Hérault, le Cantal ou encore la Haute-Loire. Les sous-espèces de ces deux oiseaux n'ont pu être notées mais il est fort probable qu'il s'agisse de la sous-espèce cabaret.



Marouette poussin *Porzana parva*
Martiel (12), mâle, 29 mars 2012 (S. Reyt).
1^{ère} mention aveyronnaise.



Chevalier stagnatile *Tringa stagnatilis*
Cuq (81), 28 avril 2012 (B. Long).
1^{ère} mention tarnaise.



Pluvier argenté *Pluvialis squatarola*
Saint-Chély-d'Aubrac (12), 22 septembre 2012 (E. Poncet).
1^{ère} mention aveyronnaise.



Tournepièrre à collier *Arenaria interpres*
Vielmur-sur-Agout (81), 5 septembre 2012 (B. Long).



Bergeronnette printanière flavéole *Mottacilla flava flaveola*
Mâle, Soulagès-Bonneval (12), 4 avril 2012 (F. Legendre).



Bergeronnette printanière flavéole *Mottacilla flava flaveola*
Mâle, Cuq (81), 11 avril 2012 (B. Long).



Fuligule nyroca *Aythya nyroca*
Mâle, Fréjeville (81), 7 avril 2012 (B. Long).



Harle bièvre *Mergus merganser*.
Mâle, Sorèze (81), 9 février 2012 (C. Aussaguel).



Ibis falcinelle *Plegadis falcinellus*
Guitalens-Lalbarède (81), 17 mars 2012 (B. Long).



Butor étoilé *Butor stellaris*
Flavin (12), 5 avril 2012 (A. Paba).



Elanion blanc *Elanus caeruleus*
Laval-Roquecezière (12), 6 septembre 2012 (A. Calvet).



Flamant rose *Phoenicopterus roseus*
Cambounet-sur-le-Sor (81), 3 janvier 2013 (P. Leprince).



Faucon d'Eléonore *Falco eleonorae*
Viane (81), 18 août 2012 (T. Bonnet).



Faucon d'Eléonore *Falco eleonorae*
Laval-Roquecezière (12), 19 août 2012 (T. Bonnet).

Liste systématique des données non homologuées

CHN – Buse pattue *Buteo lagopus*

2011 Aveyron – Sainte-Radegonde, 26 janvier ; Laguiole, 27 décembre.

Bécasseau de Temminck *Calidris Temminckii* (1^{er} janvier – 31 décembre)

Tarn – Mailhoc, 22 avril : la description trop succincte ne permet pas d'écarter le Bécasseau minute *Calidris minuta*.

Chouette de Tengmalm *Aegolius funereus* (1^{er} janvier – 31 décembre)

Aveyron – Peyreleau, 9 janvier : la description du chant, inexistante, ne permet pas d'écarter un chant de Chouette hulotte *Strix aluco* dont un individu chantait quelques minutes plus tard au même endroit ; la Chouette hulotte peut en effet imiter la Chouette de Tengmalm.

Bergeronnette printanière d'Italie *Motacilla flava cinereocapilla* (1^{er} janvier – 31 décembre)

Tarn – Cuq, 12 avril : les photos montrent un individu à gorge blanche et à calotte gris sombre mais la présence d'un demi-sourcil blanc en arrière de l'œil exclue la sous-espèce *cinereocapilla* et plaide en faveur d'une Bergeronnette printanière « méridionale » (hybride *B.flava cinereocapilla* x *B.flava iberiae*).

Bergeronnette printanière ibérique *Motacilla flava iberiae* (1^{er} janvier – 31 décembre)

Aveyron – Nant, 8 avril : description ne permettant pas d'écarter un individu de forme intermédiaire entre deux sous-espèces

Tarn – Fréjeville, 15 avril : description ne permettant pas d'écarter un individu de forme intermédiaire entre deux sous-espèces.

La détermination de certaines sous-espèces, dont *iberiae*, est particulièrement complexe sur le terrain, notamment en raison des nombreux oiseaux intermédiaires existant entre sous-espèces (hybrides). A noter que les planches figurant dans les principaux guides d'identification (dont le Guide Ornitho) ne traitent que de façon incomplète des sous-espèces et formes intermédiaires ce qui peut induire en erreur l'observateur. Nous renverrons sur ce sujet aux articles publiés dans la revue Ornithos par P.J. Dubois (2001 et 2012).

Fauvette des jardins *Sylvia borin* (15 octobre – 15 avril)

Aveyron – Le Fel, 11 avril : identification au chant mais aucune description de celui-ci n'a été faite dans la fiche d'homologation ; Meljac, 14 avril : même remarque que pour l'observation précédente. D'une manière générale, il convient de faire particulièrement attention en début de saison aux premiers chants de Fauvettes à tête noire *Sylvia atricapilla* qui peuvent ressembler à s'y méprendre à ceux de la Fauvette des jardins.

Rousserolle verderolle *Acrocephalus palustris* (1^{er} janvier – 31 décembre)

Tarn – Albi, 30 septembre, photo : initialement identifiée comme une Rousserolle effarvate *Acrocephalus scirpaceus*, cette observation a été soumise à l'avis du CHTA afin d'écarter ou de confirmer une possible Rousserolle verderolle (certains critères évoquant celle-ci). Malgré les photos, le comité et les experts sollicités (bagueurs notamment) n'ont pu trancher en faveur de l'une ou l'autre de ces deux espèces très proches.

Grimpereau des bois *Certhia familiaris* (1^{er} janvier – 31 décembre)

Aveyron – Bozouls, 12 avril : la localisation est atypique, en dehors des habitats de l'espèce (forêts de montagne) et des zones de présence connues en Aveyron (Aubrac...). Au regard de ces éléments et des difficultés d'identification avec le Grimpereau des jardins (*Certhia brachydactyla*), le CHTA a préféré, par prudence et en l'absence de photo de l'oiseau, ne pas homologuer cette donnée, malgré la description pouvant correspondre à cette espèce transmise par un observateur expérimenté. Des recherches complémentaires seraient à réaliser dans ce secteur où une autre mention ancienne, non circonstanciée, semble exister.

CHN – Pie-grièche masquée *Lanius nubicus*

2011 Aveyron – Ambeyrac, du 15 mai au 5 juin.

Cassenoix moucheté *Nucifraga caryocatactes* (1^{er} janvier – 31 décembre)

Aveyron – Lapanouse-de-Cernon, 4 décembre : la description ne correspond pas à l'espèce mais à un Étourneau sansonnet *Strunus vulgaris*.

Bibliographie

Commission de l'Avifaune de France (2007). En direct de la CAF. Liste officielle des Oiseaux de France (Catégories A, B et C). *Ornithos* 14-4 : 234-246

De Seynes A. et les coordinateurs espèces (2011). Les oiseaux nicheurs rares et menacés en France en 2010. *Ornithos* 18-3 : 155-156.

Dubois P.J. (2001). Les formes nicheuses de la Bergeronnette printanière *Motacilla flava* en France. *Ornithos* 8-2 : 44-73.

Dubois P.J. (2012). A propos de l'identification de la Bergeronnette d'Italie *Motacilla flava cinereocapilla*. *Ornithos* 19-2 : 122-131.

Dubois P.J., Le Maréchal P., Oliosio G & Yésou P. (2008). Nouvel Inventaire des Oiseaux de France. Delachaux et Niestlé, Paris.

Dupuis V. et les coordinateurs espèces (2012). Les oiseaux nicheurs rares et menacés en France en 2011. *Ornithos* 19-5 : 289-235.

Frémaux F. et Ramière J., coord. (2012). Atlas des oiseaux nicheurs de Midi-Pyrénées. Nature-Midi-Pyrénées, Delachaux et Niestlé, Paris.

Jiguet F., Crochet P.-A., Dubois P.J., Pons J.-M., Yésou P. & Le Maréchal P. (2009). Décisions prises par la Commission Avifaune Française en 2008-2009. 12^e rapport de la CAF. *Ornithos* 16-6 : 382-393

LPO Aveyron. (2008). Faune sauvage de l'Aveyron – Atlas des vertébrés. Éditions du Rouergue. Rodez.

Maurel C. coord. (2001). Les oiseaux du département du Tarn. LPO Tarn. Castres.

Peignot C. & le CHR-LR (2013). Les oiseaux rares en Languedoc-Roussillon en 2011. 4^e rapport du Comité d'Homologation Régional du Languedoc-Roussillon.

Reeber S. & le CHN (2012). Les oiseaux rares en France en 2011. 29^e rapport du Comité d'Homologation National. *Ornithos* 19-6 : 353-395