



La Gorgebleue 2.0

Les articles et notes de
www.faune-vendee.org

Référence : 004-FV2014

Les oiseaux rares et accidentels en Vendée en 2006, 2007 et 2008

Quatrième rapport du Comité d'Homologation Départemental Vendéen

Frédéric PORTIER & le CHD 85

Citation : PORTIER F. & le CHD 85, 2014. Les oiseaux rares et accidentels en Vendée en 2006, 2007 et 2008. Quatrième rapport du Comité d'Homologation Départemental Vendéen. *La Gorgebleue 2.0*, 004-FV2014, 15p. www.faune-vendee.org

INTRODUCTION

Ce quatrième rapport du Comité d'Homologation Départemental Vendéen (CHD 85) porte sur les années 2006, 2007 et 2008, en intégrant des données des années 2002 à 2005 reçues très tardivement. Le nombre de fiches examinées est de 86 pour 2006, 73 pour 2007 et 51 pour 2008. Le taux d'acceptation est respectivement de 93 %, 94 % et 96 %.

Évolution et renouvellement de la composition du CHD 85

Pour l'année 2006 le comité se composait des 9 membres suivants : Michel Bibard, Didier Brossard, Christian Gonin†, Julien Gonin (secrétaire), Lucien Grillet, Xavier Hindermeyer, Frédéric Portier, Matthieu Vaslin et Théophile You.

Pour l'année 2007 le comité se composait des 7 membres suivants : Michel Bibard, Didier Brossard, Christian Gonin†, Julien Gonin, Xavier Hindermeyer (secrétaire), Frédéric Portier, Matthieu Vaslin. En fin d'année 2007, plusieurs membres du CHD 85 ont fait connaître leur intention de quitter celui-ci, à savoir : Didier Brossard, Christian Gonin†, Julien Gonin et Xavier

Hindermeyer. Didier Desmots a rejoint le CHD 85 à l'automne 2007 suivi en fin d'année par André Barzic, Yves Gaugris, Bertrand Isaac et Pierre-Paul Evrard.

Pour l'année 2008, le CHD 85 était donc composé des 8 membres suivants : André Barzic, Michel Bibard, Didier Desmots, Pierre-Paul Evrard, Yves Gaugris, Bertrand Isaac, Frédéric Portier (secrétaire) et Matthieu Vaslin.

Rappels sur les évolutions de la liste des espèces soumises à homologation départementale

La liste des espèces soumises à homologation départementale a subi des modifications notables à compter du 1^{er} janvier 2006, suite à des changements intervenus dans la liste nationale.

Le Comité d'Homologation National (CHN) a en effet révisé la liste des espèces soumises à homologation nationale (Crouzier & le CHN 2006). Ainsi, 16 taxons ont été supprimés de la liste et ne sont donc plus soumis à homologation nationale : la Bernache (cravant) du Pacifique *Branta bernicla nigricans*, le Fuligule à bec cerclé *Aythya collaris*, le Faucon crécerellette *Falco naumanni*, le Faucon d'Éléonore *Falco eleonora*, la Marouette poussin



AGIR pour la
BIODIVERSITÉ
VENDEE

La LPO Vendée fait partie du réseau VisioNature.

Grâce aux technologies Internet, débutants, amateurs et professionnels naturalistes, peuvent partager en temps réel leur découverte et ainsi améliorer la connaissance et la protection de la faune.



Porzana parva, la Talève sultane *Porphyro porphyro* (sous-espèce type), le Bécasseau tacheté *Calidris melanotos*, le Labbe à longue queue *Stercorarius longicaudus*, le Goéland railleur *Larus genei*, le Goéland d'Audouin *Larus audouinii*, le Goéland à bec cerclé *Larus delawarensis*, le Pipit de Richard *Anthus richardi*, le Pouillot à grands sourcils *Phylloscopus inornatus*, le Pouillot (véloce) de Sibérie *Phylloscopus collybita tristis* (et le Pouillot véloce de type sibérien), le Gobemouche nain *Ficedula parva*, l'Étourneau unicolore *Sturnus unicolor*. Cette décision a pris effet au 1^{er} janvier 2006.

Les données concernant ces espèces sont désormais collectées par le Comité de suivi des Migrateurs Rares (CMR) et, lorsqu'ils existent, les comités d'homologation régionaux et départementaux.

À l'inverse, un taxon a été ajouté à la liste nationale le 1^{er} janvier 2006, l'Oie des moissons de la taïga *Anser fabalis fabalis*.

Le CHD 85 a donc décidé d'intégrer ces 16 taxons à la liste des espèces soumises à homologation en Vendée et de supprimer le nouveau taxon soumis à homologation nationale.

Dans le même temps, et après 5 années de fonctionnement, le CHD 85 a décidé de profiter de cette occasion pour apporter d'autres modifications à la liste des espèces soumises à homologation départementale. Ainsi, ont été supprimés de la liste des espèces à homologuer : le Puffin cendré *Calonectris diomedea*, le Puffin des Anglais *Puffinus puffinus*, le Puffin fuligineux *Puffinus griseus*, le Cormoran huppé *Phalacrocorax aristotelis*, le Harle bièvre *Mergus merganser*, le Labbe pomarin *Stercorarius pomarinus*, le Guêpier d'Europe *Merops apiaster*, la Locustelle tachetée *Locustella naevia*. Pour le Traquet oreillard, n'est soumise à homologation départementale que la sous-espèce *hispanica* qui ne relève pas du CHN.

De même, ont été supprimées de la liste des sous-espèces à homologuer : la Bergeronnette ibérique *Motacilla flava iberiae*, la Bergeronnette nordique *Motacilla flava thunbergi* et la Bergeronnette d'Italie *Motacilla flava cinereocapilla*.

Pour le Traquet motteux du Groënland *Oenanthe oenanthe leucorhoa*, suite aux récentes publications qui indiquent l'impossibilité de reconnaître cette sous-espèce hors capture et mesure, il a été décidé de n'homologuer que les

oiseaux capturés et mesurés. Un critère désigné par (3), signifiant "uniquement capturés et mesurés", a été ajouté à la liste.

Il a également été décidé de ne plus soumettre à homologation certaines espèces sauf en dehors des sites de nidification. Pour ces espèces (Blongios nain *Ixobrychus minutus*, Rôle des genêts *Crex crex*, Locustelle lusciniôide *Locustella luscinioides*, Pouillot de Bonelli *Phylloscopus bonelli*, Pouillot siffleur *Phylloscopus sibilatrix*), un (1) signifiant "hors sites de nidification" a été ajouté.

Enfin, ont été ajoutés à la liste l'Outarde canepetière *Tetrax tetrax* (seulement en dehors des sites de nidification) et le Goéland pontique *Larus cachinnans* (récemment élevé au rang d'espèce et non soumis à homologation nationale).

L'ensemble de ces modifications a pris effet rétroactivement au 1^{er} janvier 2006 (cf. liste des espèces soumises à homologation départementale à compter du 01/01/2006, en annexe).

Rappels sur les fiches d'homologation

À partir du 1^{er} janvier 2006, en raison des difficultés importantes rencontrées pour étudier les fiches auditives, le CHD 85 a décidé de ne plus homologuer les fiches uniquement auditives (oiseau non vu). Le critère auditif est cependant toujours important pour juger de la validité d'une observation.

Il a également été décidé de ne plus homologuer les fiches sans description, c'est à dire fondées uniquement sur une ou plusieurs photos.

Le comité remercie l'ensemble des observateurs qui ont transmis leurs fiches.

FAITS MARQUANTS

L'année 2006 apporte les premières mentions pour la Vendée de Venturon montagnard et de Vautour fauve, la première donnée homologuée de Tichodrome échelette avec l'hivernage complet d'un oiseau dans la ville de La Roche-sur-Yon, la deuxième mention d'Étourneau unicolore (sans doute le même oiseau observé depuis 2004 sur l'île de Noirmoutier).

À noter également une belle série

d'observations d'océanites culblancs fin octobre, puis début décembre suite aux forts vents d'Ouest.

L'année 2007 apporte les deux premières données de Grand Corbeau depuis la création du CHD (avec notamment le séjour prolongé d'un oiseau sur l'île d'Yeu). À noter également les deuxièmes données homologuées depuis la création du CHD de Rousserolle verderolle, de Tichodrome échelette et d'Alouette haussecol (avec un hivernage complet sur l'île d'Yeu).

L'année 2008 apporte la première mention de Goéland pontique pour la Vendée, la troisième donnée d'Alouette haussecol et la quatrième donnée de Pipit à gorge rousse (première donnée pour l'île d'Yeu).

LISTE SYSTÉMATIQUE DES DONNÉES ACCEPTÉES

Les données sont présentées comme suit :

1. Noms français et scientifique.
2. Entre parenthèses : les deux premiers chiffres indiquent respectivement le nombre total de données homologuées depuis la création du CHD85 et celui des individus correspondants, à l'exception des années 2006 à 2008. Les six suivants représentent le nombre de données homologuées et le nombre d'individus correspondants pour chaque année (2006, 2007 et 2008).
3. Présentation des données par ordre chronologique d'observation.
4. Localité, effectif (si non précisé : se réfère à un seul individu), âge et sexe si connus.
5. Précision si l'oiseau a été tué, trouvé mort ou capturé par un bagueur.
6. Précision si l'oiseau a été photographié (phot.), filmé (vidéo) ou enregistré sur bande audio (enr.).
7. Date(s) d'observation.
8. Nom(s) du (des) observateur(s) ayant rédigé une fiche et/ou fourni une photo (classés par ordre alphabétique). La mention "*et al.*" indique que d'autres observateurs ont vu le ou les oiseau(x) en question ; en cas de pluralité d'observateurs, le premier nom mentionné est celui du découvreur (ayant rédigé une fiche et/ou fourni une photo).
9. Distribution générale de l'espèce et son statut en Vendée (entre parenthèses), puis commentaire.

La séquence taxonomique est celle de la liste du Comité de l'Avifaune Française (CAF 2007).

Les données concernant les races sont mentionnées comme "présentant les caractéristiques" de la race concernée.

Les données présentées sont la propriété entière du ou des observateurs. Elles doivent être citées comme telles dans la littérature, par exemple : Venturon montagnard - 1 mâle adulte le 26 octobre 2006, L'île-d'Yeu, Vendée (X. Hindermeyer *et al.*, in Portier & le CHD 85, 2014).

* Espèce soumise au CHD hors de certaines zones géographiques.

** Espèce soumise au CHD en dehors des sites de nidification.

*** Espèce soumise au CHD pour une/des date(s) d'observation exceptionnelle(s).

Erratum à apporter au précédent rapport (Portier et al. 2009) :

PUFFIN CENDRÉ *Calonectris diomedea*

2005 - pointe de L'Herbaudière, Noirmoutier-en-l'Île, 17 octobre (E. Gas).

Cette donnée n'a pas été acceptée (description trop légère). Elle doit être placée dans la liste des données non homologuées.

PUFFIN MAJEUR *Puffinus gravis*

(5/51) (0/0 ; 1/1 ; 1/1)

2007 - phare de l'Armandèche, Les Sables-d'Olonne, 20 août (M. Bibard).

2008 - en mer depuis le Kifanlo, 2 ind., 4 septembre (M. Bibard, O. Penard *et al.*).

2002 - pointe de Grosse Terre, Saint-Hilaire-de-Riez, env. 20 ind., 2 au 9 août (G. Besseau).

(Niche dans quelques îles de l'Atlantique Sud : Inaccessibles, Nightingale, Tristan da Cunha et Gough. Migrateur très rare au large des côtes vendéennes).

Seulement deux données pour la période, et une donnée antérieure parvenue tardivement, qui s'ajoute aux observations remarquables faites depuis la côte au cours de l'été 2002.

OCÉANITE CULBLANC *Oceanodroma leucorhoa*

(7/8) (10/41 ; 0/0 ; 0/0)

2006 - plages des Bossilles et de la Borgne, L'île-d'Yeu, 24 octobre (X. Hindermeyer, F. Portier) ; pointe des Corbeaux, L'île-d'Yeu, 24 octobre (X. Hindermeyer, F. Portier) ; pointe de la Gournaise, L'île-d'Yeu, 3 ind., 25 octobre (X. Hindermeyer, F. Portier) ; pointe du Château Maugarni, L'île-d'Yeu,

2 ind. minimum, 25 octobre (X. Hindermeier, O. Penard, F. Portier) ; plage de la Cantine, La Guérinière, 13 ind. minimum, phot., 5 décembre (D. Desmots, M. Vaslin *et al.*), 9 ind. minimum, phot., 7 décembre (D. Desmots) ; pointe de l'Herbaudière, Noirmoutier-en-l'Île, phot., 8 décembre (D. Desmots, M. Vaslin) ; pointe du Devin, L'Épine, ind. épuisé, 8 décembre (D. Desmots, M. Vaslin) ; l'Armandèche, Les Sables-d'Olonne, 4 ind., 8 et 11 décembre (M. Bibard, B. Perrotin, T. You) ; plages d'Olonne-sur-Mer, 7 ind. trouvés morts sur 1,5 km, phot., 10 décembre (D. Desmots, A. Desmots, E. Loizeau).

(Atlantique Nord. Migrateur et hivernant rare au large des côtes vendéennes, surtout observé lors de coups de vent).

Deux belles séries de données à l'automne 2006 qui font suite aux tempêtes ayant sévi sur la côte Atlantique (dernière décade d'octobre et première décade de décembre). Pas de donnée en revanche pour 2007 et 2008.

CORMORAN HUPPÉ *Phalacrocorax aristotelis** (6/6)

2005 - pointe de Grosse Terre, Saint-Hilaire-de-Riez, imm., 11 novembre (G. Besseau).

(Atlantique. Niche occasionnellement en Vendée. Migrateur et hivernant rare, excepté autour des îles d'Yeu et de Noirmoutier où il est régulier).

Une deuxième donnée parvenue tardivement pour l'année 2005. Cette espèce n'est plus soumise à homologation départementale depuis le 1^{er} janvier 2006.

CRABIER CHEVELU *Ardeola ralloides* (4/4) (1/1 ; 0/0 ; 1/6)

2006 - les Petits Relais, Champagné-les-Marais, 15 mai (Y. Gaugris *et al.*).

2008 - la Petite Boissière, Chaillé-les-Marais, 6 ind. (3 ad. et 3 juv.), phot., 1^{er} juillet au 3 octobre (Y. Gaugris *et al.*).

(Bassin méditerranéen, Dombes, Brenne, Grand-Lieu. Migrateur rare en Vendée, hiverne en Afrique).

À nouveau deux données en Marais poitevin pour cette espèce qui n'avait pas été notée en Vendée depuis 2002 !

CYGNE CHANTEUR *Cygnus cygnus* (3/7) (0/0 ; 0/0 ; 0/0)

2002 - le Pas Opton, Notre-Dame-de-Riez, 5 ind. (2 ad., 3 juv.), phot., 27 octobre au 9 novembre (G. Besseau).

(Islande, Scandinavie, Sibérie. Hiverne en Grande-Bretagne, Nord et Centre de l'Europe, Mers noire et caspienne. Hivernant rare et très irrégulier en Vendée).

Une donnée supplémentaire pour l'année 2002, qui s'inscrit dans la période d'afflux important d'oiseaux à la fin octobre



*Cygne chanteur (2 adultes et 3 juvéniles),
Notre-Dame-de-Riez, 2002
Photo © G. Besseau*

2002 sur les côtes Bretonnes et la façade Atlantique, faisant suite à de forts vents de nord-ouest (Zucca & le CMR 2005).

BERNACHE CRAVANT *Branta bernicla* (10/15) (1/1 ; 5/5 ; 1/1)

Individus présentant les caractéristiques de la sous espèce hrota, appelée "Bernache à ventre pâle".

2006 - Cailla, polder de Sébastopol, Barbâtre, ad., phot., 16 novembre au 9 janvier (M. Vaslin, D. Desmots, F. Le Gallo).

2007 - le Luzan, Noirmoutier-en-l'Île, ad., phot., 23 juillet au 21 septembre (D. Desmots, J.-M. Porteau *et al.*), juv., phot., 12 au 16 novembre (D. Desmots), ad., phot., 16 novembre (D. Desmots) ; baie des Sables, Les Sables-d'Olonne, ad., 11 décembre (M. Bibard) ; havre du Payré, Talmont-Saint-Hilaire, ad., 13 décembre (M. Bibard).

2008 - le Luzan, Noirmoutier-en-l'Île, ad., phot., 25 mars (D. Desmots).

(Groënland, Spitzberg. Hiverne en petit nombre en Grande-Bretagne et du Danemark à la côte Normande. Sous-espèce hivernant de plus en plus régulièrement en petit nombre en Vendée).

L'île de Noirmoutier reste le site le plus attractif pour cette sous-espèce en hiver.

BERNACHE CRAVANT *Branta bernicla* (0/0) (3/3 ; 4/4 ; 2/2)

Individus présentant les caractéristiques de la sous espèce nigricans, appelée "Bernache du Pacifique".

2006 - le Luzan, Noirmoutier-en-l'Île, la Berche, La Guérinière, Cailla, polder de Sébastopol, Barbâtre, 3 ad. minimum, phot., 28 octobre au 19 janvier (M. Vaslin, D. Desmots, F. Le Gallo *et al.*).

2007 - le Luzan, Noirmoutier-en-l'Île, ad., phot., 15 et 16 novembre (D. Desmots) ; la Berche, La

Guérinière, ad., phot., 19 novembre et 10 décembre (D. Desmots), phot., 21 décembre (M. Vaslin) ; Cailla, Barbâtre, phot., 21 décembre (M. Vaslin).

2008 - le Luzan, Noirmoutier-en-l'Île, phot., 3 janvier (M. Vaslin) ; le Goulet, Saint-Vincent-sur-Jard, phot., 10 décembre (J.-C. Croisé, F. Salmon *et al.*).

(Amérique arctique, Sibérie orientale. Sous-espèce hivernant régulièrement ces dernières années en petit nombre dans notre département).

L'île de Noirmoutier demeure le site le plus favorable pour observer cette sous-espèce en hiver.

FULIGULE À BEC CERCLÉ *Aythya collaris*

(0/0) (2/2 ; 1/1 ; 0/0)

2006 - étang des Cosses, Saint-Martin-des-Noyers, mâle, 7 janvier, puis 4 novembre au 10 mars (M. Bibard, A. Briffaud) ; carrière de Luzay, Noirmoutier-en-l'Île, mâle ad., 20 au 25 mai (E. Gas, D. Desmots, M. Vaslin).

2007 - étang des Cosses, Saint-Martin-des-Noyers, fem. imm., 22 octobre et 3 novembre (M. Bibard).

(Amérique du Nord. Migrateur et hivernant occasionnel et irrégulier en Vendée).

Seules trois données en 2006-2007, dont deux sur un étang privé dans le bocage. Pas de donnée en 2008.

FULIGULE NYROCA *Aythya nyroca*

(5/5) (0/0 ; 1/1 ; 0/0)

2007 - étang du Parc Soubise, Mouchamps, mâle ad., 29 décembre et 12 janvier (M. Bibard).

(Niche en Europe de l'Est, au Moyen-Orient et de façon localisée en Espagne. Migrateur et hivernant occasionnel en Vendée).

Une seule donnée pour ces trois années sur un site inhabituel.

VAUTOUR FAUVE *Gyps fulvus*

(0/0) (1/1 ; 0/0 ; 0/0)

2006 - polder de la Prise, Beauvoir-sur-Mer, imm., phot., 9 au 12 juin (M. Vaslin, J.-Y. Fémont *et al.*).

(Europe, Afrique du Nord, Moyen-Orient, Ouest de l'Asie).

L'année 2006 apporte la première mention de cette espèce pour le département depuis la création du CHD.

AIGLE BOTTÉ *Hieraetus pennatus*

(1/2) (2/3 ; 3/4 ; 1/2)

2006 - localité tenue secrète, mâle et fem., 11 juin au 23 septembre (M. Bibard) ; La Tranche-sur-Mer, 16 octobre (J. & P. Adams).

2007 - localité tenue secrète, mâle et fem., 2 juin au 12 août (M. Bibard) ; marais de la Guerche,

L'Île-d'Yeu, ind. de forme claire, 31 août (X. Hindermeier) ; Marais Salé, L'Île-d'Yeu, ind. de forme sombre, 16 septembre (X. Hindermeier).

2008 - localité tenue secrète, mâle et fem., 11 mai au 6 septembre (M. Bibard).

(Europe, Afrique du Nord, jusqu'en Asie Centrale. Migrateur rare en Vendée. Nidification non encore prouvée).

Toujours un couple cantonné à l'intérieur des terres, noté durant ces trois années, sans que la reproduction soit pour autant certifiée.

FAUCON KOBEZ *Falco vespertinus*

(2/3) (2/2 ; 1/1 ; 5/5)

2006 - Froidfond, mâle 2^e année, 17 mai (L. Grillet, P. Dulac) ; les Petits Relais, Champagné-les-Marais, fem. ou juv., 30 juin au 10 juillet (Y. Gaugris).

2007 - pointe des Sableaux, Noirmoutier-en-l'Île, mâle imm., 5 juin (D. Desmots).

2008 - Beauséjour, Saint-Urbain, fem. ad., 10 mai (M. Vaslin) ; dune de la Grande Conche, L'Île-d'Yeu, 19 septembre (X. Hindermeier, F. Portier) ; marais du Plumet, Jard-sur-Mer, juv., 20 septembre (F. Salmon, J. Cloutour) ; dune du Petit Rocher, Brétignolles-sur-Mer, 1 à 2 juv., phot., 21 et 22 septembre (G. Besseau).

2005 - Bellevue, Angles, mâle ad. probable, 8 septembre (G. Besseau, P. Rouillier).

(Niche de la Hongrie aux environs du fleuve Lena, en Russie, vers 120° Est. A niché avec succès en Vendée en 1993. Migrateur occasionnel aux deux passages).

Avec une à deux observations par an, l'espèce reste occasionnelle en Vendée aux deux passages, exception faite de l'année 2008 qui cumule 5 données pour 5 oiseaux dont 4 du 19 au 22 septembre !



Falcon kobez, Brétignolles-sur-Mer, 2008

Photo © G. Besseau

MARQUETTE PONCTUÉE *Porzana porzana*

(17/19) (1/1 ; 0/0 ; 1/1)

2006 - polder de Sébastopol, Barbâtre, 1^{er} hiv., 23 septembre (M. Vaslin).

2008 - marais de la Guerche, L'Île-d'Yeu, 28 octobre (X. et M.-P. Hindermeier, F. Portier).

(Europe et Russie. Nicheuse rare en Vendée. Migratrice rare mais régulière observée surtout lors du passage post-nuptial).

Seulement deux données rapportées pour la période à des dates classiques, mais loin de refléter le passage postnuptial de cette espèce discrète qui mérite d'être recherchée plus intensément dans le département.

GLARÉOLE SP *Glareola sp.*

(0/0) (0/0 ; 0/0 ; 1/1)

2008 - péage de l'A83, Boufféré, 4 juillet (P. Yésou).

Ce genre a été proposé à l'examen du CHD. On peut penser que l'observateur pensait plus à la Glaréole à collier...

PLUVIER GUIGNARD *Charadrius morinellus*

(7/9) (1/1 ; 3/3 ; 0/0)

2006 - polder de la Parisienne, Bouin, ad., phot., 19 novembre (W. Maillard *et al.*).

2007 - la Paracou, Les Sables-d'Olonne, 23 août (F. Portier) ; dune du Petit Rocher, Brétignolles-sur-Mer, juv., phot., 19 septembre (G. Besseau) ; marais des Loirs, L'Île-d'Olonne, 30 septembre (C. Chaigne).

2002 - dune du Petit Rocher, Brétignolles-sur-Mer, 3 ind. (2 juv. et 1 ad.), phot., 1^{er} septembre (G. Besseau).

(Écosse, Scandinavie, Sibérie. Nicheur rare et localisé en France. Migrateur rare et irrégulier en Vendée aux deux passages).

Cette espèce reste rare aux deux passages en Vendée. La donnée de l'année 2006 est particulièrement tardive.

BÉCASSEAU DE TEMMINCK *Calidris temminckii*

(20/32) (1/1 ; 2/7 ; 1/1)

2006 - marais de la Croix, L'Île-d'Yeu, ad., 23 août (X. Hindermeier).

2007 - le Luzan, Noirmoutier-en-l'Île, phot., 10 avril (D. Desmots) ; la Guittière, Talmont-Saint-Hilaire, 6 ad., phot., 3 au 22 avril (F. Portier, F. Salmon).

2008 - marais Montporteau, Les Sables-d'Olonne, ad., 13 avril (F. Portier).

(Écosse, Scandinavie et Sibérie. Migrateur rare et irrégulier en Vendée, le plus souvent en petit nombre, aux deux passages).

Première donnée pour l'île d'Yeu en 2006. Le printemps 2007 apporte 7 données dont un bel effectif sur un site très



Bécasseau de Temminck,

La Guittière, Talmont-Saint-Hilaire, 2007

Photo © F. Portier

favorable. Malgré tout, cette espèce reste d'occurrence irrégulière et discrète dans notre département.

BÉCASSEAU TACHETÉ *Calidris melanotos*

(0/0) (3/4 ; 0/0 ; 0/0)

2006 - Réserve Naturelle des Marais de Müllembourg, Noirmoutier-en-l'Île, juv., phot., 11 septembre (D. Desmots *et al.*) ; lac de Maché, Apremont, juv., phot., 15 au 19 septembre (F. Portier) ; le Grand Marais, Saint-Hilaire-de-Riez, 2 ind. (juv. et ad.), phot., 26 au 29 septembre (G. Besseau).

(Amérique du Nord, Sibérie. Rare et irrégulier aux deux passages en Vendée, particulièrement au printemps ; plus régulier à l'automne).

Belle série de données en septembre 2006 qui contraste avec l'absence de données en 2007 et 2008 (pourtant deux années très humides).



Bécasseau tacheté, Lac de Maché, 2006

Photo © F. Portier

CHEVALIER STAGNATILE *Tringa stagnatilis*

(8/8) (1/1 ; 4/4 ; 3/3)

2006 - Réserve Naturelle des Marais de Müllembourg, Noirmoutier-en-l'Île, ad., phot., 17 juillet au 25 septembre (M. Vaslin, D. Desmots).

2007 - la Guittière, Talmont-Saint-Hilaire, ad., 2 avril (F. Salmon) ; Réserve Naturelle des Marais de Müllembourg, Noirmoutier-en-l'Île, ad., 25 avril (J. Pitois, N. Dufresne), ad., phot., 27 juillet au 18 septembre (D. Desmots, J.-M. Porteau *et al.*) ; vallée de la Vertonne, Olonne-sur-Mer, 12 août (D. Desmots, A. Barzic).

2008 - la Couvée, Beauvoir-sur-Mer, ad., phot., 15 au 26 juillet (M. Vaslin, J.-Y. Frémont *et al.*) ; Réserve Naturelle des Marais de Müllembourg, Noirmoutier-en-l'Île, ad., 13 août au 10 septembre (D. Desmots, M. Vaslin *et al.*) ; l'Ouche, La Barre-de-Monts, 20 août (P. Dulac).

(Europe de l'Est, Russie. Migrateur rare mais régulier en Vendée aux deux passages, de préférence dans les marais littoraux saumâtres ou salés).

Les années 2007 et 2008 sont un bon cru pour cette espèce rare dans notre département.

PHALAROPE À BEC ÉTROIT *Phalaropus lobatus*

(4/4) (0/0 ; 0/0 ; 1/1)

2008 - marais salants, Olonne-sur-Mer, juv., phot., 28 septembre (R. Bussière *et al.*).

(Irlande, Écosse, Islande, Scandinavie, Sibérie. Migrateur occasionnel sur la côte Atlantique, plus commun en Méditerranée. Migrateur rare et irrégulier en Vendée, surtout au passage post-nuptial).

Avec une seule donnée en trois ans, cette espèce reste toujours aussi rare en Vendée.

LABBE À LONGUE QUEUE

Stercorarius longicaudus

(0/0) (1/1 ; 1/1 ; 1/1)

2006 - plage des Bossilles, L'Île-d'Yeu, juv., 15 septembre (F. Portier, X. Hindermeier).

2007 - pointe de l'Herbaudière, Noirmoutier-en-l'Île, ad., 25 avril (J. Pitois).

2008 - plage de la Gachère, Brétignolles-sur-Mer, 4 septembre (P. Yésou).

(Circumboréal. Migrateur très rare au large des côtes vendéennes).

Avec une donnée par an, ce labbe reste d'occurrence très rare sur les îles et le littoral vendéen.

GOÉLAND RAILLEUR *Larus genei*

(0/0) (1/1 ; 1/1 ; 1/1)

2006 - Réserve Naturelle des Marais de Müllembourg et Luzan, Noirmoutier-en-l'Île ;

polder de Sébastopol, Barbâtre, ad., phot., 1^{er} janvier au 31 décembre (M. Vaslin, D. Desmots, R. Marty *et al.*).

2007 - Réserve Naturelle des Marais de Müllembourg et Luzan, Noirmoutier-en-l'Île ; polder de Sébastopol, Barbâtre, ad., phot., 1^{er} janvier au 31 décembre (D. Desmots, M. Vaslin, J.-M. Porteau, J. Pitois *et al.*).

2008 - Réserve Naturelle des Marais de Müllembourg et Luzan, Noirmoutier-en-l'Île ; polder de Sébastopol, Barbâtre, ad., phot., 7 janvier au 29 décembre (D. Desmots *et al.*).

(Europe méridionale, Proche et Moyen-Orient, Asie du Sud-Ouest, Nord et Ouest de l'Afrique. Très rare en Vendée).

Il s'agit toujours du même individu, paradant avec les mouettes rieuses au printemps et présent sur cette île depuis le 14 avril 2003.

GOÉLAND À BEC CERCLÉ *Larus delawarensis*

(0/0) (3/3 ; 2/2 ; 5/5)

2006 - base de loisirs des Guifettes, Luçon, ad., 6 janvier (A. Thomas, A. Texier) ; Réserve Naturelle des Marais de Müllembourg et Luzan, Noirmoutier-en-l'Île, ad., phot., 1^{er} janvier au 11 avril, puis 6 novembre au 29 janvier (M. Vaslin, D. Desmots *et al.*) ; anse du Gois et station de lagunage, Barbâtre, ad., phot., 1^{er} au 30 janvier puis 19 septembre au 3 novembre (D. Desmots, M. Vaslin *et al.*).

2007 - station de lagunage, Beauvoir-sur-Mer, ad., 10 décembre (M. Vaslin) ; plage de la Borgne, L'Île-d'Yeu, ad., 29 décembre (X. & M.-P. Hindermeier).

2008 - plage de Ker Châlon, L'Île-d'Yeu, ad., phot., 25 janvier (F. Portier) ; le Marais Girard, Brétignolles-sur-Mer, ad., phot., 29 février et 1^{er} mars (F. Portier) ; anse du Gois, Barbâtre, 3^e année, phot., 20 juin au 24 juillet (M. Vaslin), 1^{er} été, 3 août (M. Bibard) ; Réserve Naturelle des



Goéland à bec cerclé, Brétignolles-sur-Mer, 2008

Photo © F. Portier

Marais de Müllembourg, Noirmoutier-en-l'Île, ad., phot., 29 décembre au 30 mars (D. Desmots).

(Amérique du Nord. Migrateur et hivernant rare, mais régulier en Vendée).

L'île de Noirmoutier reste le site de Vendée où cette espèce est le plus régulièrement observée. L'île d'Yeu l'accueille pour la première fois au cours de l'hiver 2007-2008 et à deux reprises (même individu).

GOÉLAND PONTIQUE *Larus cachinnans*
(0/0) (0/0 ; 0/0 ; 1/1)

2008 - station de lagunage, La Barre-de-Monts, 1^{er} hiv., phot., 12 janvier (M. Vaslin).

(Niche de la mer Noire au Kazakhstan. S'est installé récemment près de Moscou ainsi qu'en Pologne et en Allemagne. Hivérne dans le golfe Persique, en mer Rouge et en effectif moindre dans le Centre, le Nord et l'Ouest de l'Europe).

Première donnée vendéenne homologuée par le CHD.

GOÉLAND BOURGMESTRE *Larus hyperboreus*
(10/11) (2/2 ; 0/0 ; 2/2)

2006 - port de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, 1^{er} hiv., phot., 24 février au 19 mars (F. Portier, B. Isaac, G. Besseau) ; l'Armandèche, Les Sables-d'Olonne, imm., 13 avril (M. Bibard).

2008 - baie des Sables-d'Olonne, 1^{er} hiv., 31 janvier (M. Bibard) ; baie de Sion, Saint-Hilaire-de-Riez, 1^{er} hiv., 1^{er} mars (G. Besseau).

2004 - pointe de Grosse Terre, Saint-Hilaire-de-Riez, 2^e année, 30 avril (G. Besseau).

2005 - plage du Petit Rocher, Brétignolles-sur-Mer, 1^{er} hiv., phot., 23 janvier (G. Besseau).

(Arctique. Hivérne en Islande, Grande-Bretagne et Scandinavie. Hivernant assez régulier en Vendée).

Sites et dates classiques. Curieusement, pas de donnée en 2007.

STERNE HANSEL *Sterna nilotica*
(10/12) (1/1 ; 1/1 ; 1/1)

2006 - marais de l'Ecluse, Olonne-sur-Mer, ad., 5 juin (M. Bibard).

2007 - pointe de l'Aiguillon, L'Aiguillon-sur-Mer, ad., 15 avril (M. Bibard).

2008 - polder de Sébastopol, Barbâtre, ad., phot., 6 et 11 mai (M. Vaslin).

(Méditerranée et Danemark. Migratrice rare mais régulière en Vendée).

Une seule donnée par an et à chaque fois au printemps, sur des sites classiques.

STERNE DE DOUGALL *Sterna dougallii*
(8/9) (4/11 ; 4/4 ; 1/1)

2006 - Marais Monporteau, Les Sables-d'Olonne, phot., 18 mai (A. Barzic) ; l'Armandèche, Les Sables-d'Olonne, 1 à 8 ind., 18 au 23 mai (M. Bibard) ; polder de Sébastopol, Barbâtre, 2 ad., phot., 22 et 23 mai (D. Desmots) ; polder de Sébastopol, Barbâtre, ad., phot., 11 juillet (M. Vaslin, D. Desmots *et al.*).

2007 - baie de Sion, Saint-Hilaire-de-Riez, ad., phot., 30 mai (G. Besseau) ; Réserve Naturelle des Marais de Müllembourg, Noirmoutier-en-l'île, ad., phot., 30 mai (D. Desmots) ; polder de Sébastopol, Barbâtre, ad., phot., 5 juin (D. Desmots, B. Helsens *et al.*) ; estuaire de l'Auzance, Brétignolles-sur-Mer, ad., 9 juin (D. Desmots).

2008 - pointe des Corbeaux, L'Île-d'Yeu, ad., 16 août (X. et M.-P. Hindermeier).

2002 - baie de Sion, Saint-Hilaire-de-Riez, ad., 6 juillet (G. Besseau).

(Grande-Bretagne et Bretagne. Migrateur rare en Vendée).

Belle série de données sur le littoral et l'île de Noirmoutier en 2006 et même en 2007.



Sterne de Dougall,
baie de Sion, Saint-Hilaire-de-Riez, 2007
Photo © G. Besseau

GUIFETTE LEUCOPTÈRE *Chlidonias leucopterus*
(4/4) (1/1 ; 0/0 ; 1/1)

2006 - lagune de la Belle Henriette, La Faute-sur-Mer, ad., phot., 21 au 23 août (F. Portier, P. Yésou *et al.*).

2008 - station de lagunage, La Tranche-sur-Mer, juv., 31 août (F. Portier).

(Europe de l'Est, Moyen-Orient, Russie. Migrateur occasionnel en Vendée).

Seulement 2 données en 3 ans, obtenues sur des sites classiques.

MERGULE NAIN *Alle alle*

(4/4) (1/1 ; 4/4 ; 1/1)

2006 - Jard-sur-Mer, trouvé mort, phot., 28 octobre (A. Briffaud).

2007 - plage des Sabias, L'Île-d'Yeu, ad., 14 janvier (D. Etienney) ; plage Belebas, Saint-Vincent-sur-Jard, phot., 12 février (A. Briffaud) ; plage de la Madeleine, Noirmoutier-en-l'île, phot., 6 décembre (D. Desmots) ; plage de la Tourette, L'Île-d'Yeu, 11 décembre au 2 janvier (F. Portier, X. et M.-P. Hindermeier).

2008 - Les Sables-d'Olonne, récupéré épuisé, 12 novembre (A. Barzic).

(Arctique, migrateur rare sur les côtes françaises. Occasionnel en Vendée).

Une belle série d'observations, surtout en 2007, pour une espèce qui n'est pas annuelle dans le département.

COUCOU GEAI *Clamator glandarius*

(3/3) (2/2 ; 0/0 ; 0/0)

2006 - le Querry Sellier, Notre-Dame-de-Monts, 1^{er} été, phot., 2 avril (M. Vaslin, F. Signoret *et al.*) ; cimetière de Boufféré, 1^{er} été, 20 juin (P. Grange).

(Méditerranée. Migrateur occasionnel en Vendée).

Avec seulement 2 données obtenues en 2006, cette espèce reste d'occurrence rare dans notre département.

TORCOL FOURMILIER *Jynx torquilla****

2007 - les Champs Pierreux, Noirmoutier-en-l'Île, 8 février (D. Desmots)

(La sous-espèce nominale se reproduit de la péninsule Ibérique à l'Oural. Migrateur régulier en Vendée ; un seul cas de nidification certaine rapporté (Dulac 2009)).

Date exceptionnelle, laissant penser à un hivernage possible de l'espèce dans notre département.

PIC MAR *Dendrocopos minor*

(3/3) (0/0 ; 0/0 ; 2/2)

2008 - la Bironnière, Saint-Martin-Lars-en-Sainte-Hermine, mâle chanteur, 3 mai (M. Bibard) ; la Jambrière, Mervent, mâle chanteur, 4 mai (M. Bibard).

(Europe et Moyen-Orient. Nicheur rare et localisé en Vendée).

À nouveau 2 données en période de reproduction pour cette espèce qui n'avait pas fait l'objet de mention dans le département depuis 2003 (forêt de Mervent). Une prospection systématique au printemps dans les boisements encore favorables permettrait d'affiner le statut de cette espèce en déclin.

ALOUETTE HAUSSECOL *Eremophila alpestris*

(1/1) (0/0 ; 1/1 ; 2/2)

2007 - côte sauvage, L'Île-d'Yeu, phot., 30 octobre au 4 avril (F. Portier, X. et M.-P. Hindermeier, L. Spanneut *et al.*).

2008 - la Paracou, Les Sables-d'Olonne, mâle ad., 2 février (F. Portier).

(Scandinavie, Sibérie. Hiverné dans la partie nord de l'Europe. Très rare et irrégulier en automne-hiver en Vendée).

Deuxième et troisième données depuis la création du CHD (la première donnée homologuée date de novembre 2001). Noter l'hivernage complet de l'espèce sur l'île d'Yeu.

PIPIT DE RICHARD *Anthus richardi*

(0/0) (1/1 ; 2/2 ; 0/0)

2006 - communal des Magnils-Reigniers, 12 décembre (A. Thomas).

2007 - pointe des Sableaux, Noirmoutier-en-l'Île, ad., phot., 23 avril (D. Desmots, J.-N. Pitaut *et al.*) ; Réserve Naturelle des Marais de Müllembourg, Noirmoutier-en-l'Île, 7 septembre (D. Desmots, J.-P. Magniette).

(Sibérie occidentale, à l'est jusqu'en Mongolie. Migrateur et hivernant rare en Vendée).

Trois données seulement pour la période, pour une espèce qui passe le plus souvent inaperçue en Vendée, eu égard à la grande étendue de ses lieux de prédilection.

PIPIT À GORGE ROUSSE *Anthus cervinus*

(3/3) (0/0 ; 0/0 ; 1/1)

2008 - marais de la Guerche, L'Île-d'Yeu, 22 octobre (J.-M. Guilpain, B. Isaac, A. Troffigué).

(Scandinavie et Sibérie. Migrateur rare sur la façade Atlantique, surtout à l'automne ; espèce occasionnelle en Vendée).

Quatrième donnée homologuée par le CHD85 et première mention pour l'île d'Yeu.

PHRAGMITE AQUATIQUE *Acrocephalus paludicola*

(14/45) (1/3 ; 2/7 ; 2/16)

2006 - le Braud, Grues, 3 ind., capt., phot., 20 au 23 août (F. Salmon, L. Chaillot).

2007 - la Belle Henriette, La Faute-sur-Mer, 2 ind. (ad. et juv.), 14 juillet (F. Portier) ; le Braud, Grues, 5 ind., capt., phot., 23 au 26 août (F. Salmon).

2008 - le Braud, Grues, 15 ind., capt., phot., 9 au 28 août (F. Salmon, L. Chaillot *et al.*) ; marais Montportreau, Les Sables-d'Olonne, juv. probable, 21 août (M. Bibard).

(Pologne, Hongrie, Biélorussie, Russie. Migrateur régulier au passage post-nuptial, mais en faible effectif dans l'Ouest de la France dont la Vendée).

La roselière du Braud est décidément très attractive pour l'espèce. Toujours aussi peu d'observations en dehors des campagnes de baguage. Noter la date précoce pour 2 oiseaux en juillet sur le site de la Belle Henriette.

ROUSSEROLLE VERDEROLLE

Acrocephalus palustris

(1/1) (0/0 ; 1/1 ; 0/0)

2007 - les Agaures, Les Sables-d'Olonne, ad., 4 septembre (M. Bibard).

(Niche du Nord-Ouest de la France à la Caspienne et l'Est de l'Oural. Migrateur occasionnel en Vendée).

Deuxième mention homologuée par le CHD après l'oiseau de 2005 à Barbâtre.

HYPOLAÏS ICTÉRINE *Hippolais icterina*

(4/5) (1/1 ; 1/1 ; 1/1)

2006 - pointe de L'Aiguillon, L'Aiguillon-sur-Mer, 28 au 31 août (S. Chambris, J.-Y. Barnagaud).

2007 - marais de la Guerche, L'Île-d'Yeu, juv., 30 août (X. Hindermeier).

2008 - la Bironnière, Saint-Martin-Lars-en-Sainte-Hermine, ad., 14 juillet (M. Bibard).

(Europe centrale et de l'Est, Russie. Nicheur localisé dans le Nord-Est de la France, migre vers l'Est, rare dans l'Ouest de l'Europe. Migrateur rare en Vendée, contacté essentiellement au passage post-nuptial (août-septembre)).

Avec une seule donnée par an, cette espèce demeure rare en Vendée.

FAUVETTE BABILLARDE *Sylvia curruca*

(3/3) (2/2 ; 0/0 ; 0/0)

2006 - dune de la Gachère, Brétignolles-sur-Mer, 1^{er} Hiv., 10 octobre (F. Portier) ; Bergerie, L'Île-d'Yeu, 23 octobre (X. Hindermeier, F. Portier).

(Nord et Est de l'Europe, Russie et Moyen-Orient. Migrateur rare en Vendée, contacté surtout en automne (octobre)).

Seulement deux données obtenues en octobre 2006 sur des sites classiques, puis rien en 2007 et 2008 !

POUILLOT À GRANDS SOURCILS

Phylloscopus inornatus

(0/0) (6/6 ; 6/6 ; 8/9)

2006 - Cailla, Barbâtre, 17 octobre (D. Desmots) ; impasse de la Borgne, L'Île-d'Yeu, 24 au 26 octobre (F. Portier, X. Hindermeier), 30 octobre (X. Hindermeier) ; dépression de la dune de la Grande Conche, L'Île-d'Yeu, 26 octobre (F. Portier, X. Hindermeier, O. Penard) ; saulaie des Poupounes, L'Île-d'Yeu, phot., 26 au 28 octobre (F. Portier, X. Hindermeier, O. Penard) ; Réserve Naturelle des Marais de Müllembourg, Noirmoutier-en-l'Île, 27 octobre (D. Desmots, M. Vaslin).

2007 - bois du Midi, Barbâtre, 7 octobre (J.-P. Darras) ; les Agaures, Les Sables d'Olonne, 9 au 11 octobre (A. Barzic, M. Bibard) ; le Morin, Noirmoutier-en-l'Île, 10 octobre (D. Desmots, J.-M. Porteau, J.-P. Darras) ; les Agaures, Les Sables d'Olonne, 17 octobre (P.-P. Evrard), 2 novembre (P.-P. Evrard) ; STEP, Noirmoutier-en-l'Île, 1^{er} hiv., 21 décembre (J.-N. Pitaud, D. Desmots, M. Vaslin).

2008 - camping, L'Île-d'Yeu, 2 ind., 20 et 22 octobre (J.-M. Guilpain, B. Isaac, A. Troffigué) ; dépression de la dune de la Grande Conche, L'Île-d'Yeu, 24 octobre (J.-M. Guilpain, B. Isaac, A. Troffigué) ; saulaie des Sabias, L'Île-d'Yeu, 31 octobre (F. Portier, O. Laluque) ; jardins de Ker Châlon, L'Île-d'Yeu, 1^{er} novembre (X. et M.-P. Hindermeier) ; dune de la Tresson, La Guérinière, 7 au 12 novembre (D. Desmots, J.-M. Porteau, M. Vaslin) ; Les Agaures, Les Sables-d'Olonne, 13 au 16 novembre, (A. Barzic, P.-P. Evrard *et al.*), 15 et 16 novembre (A. Barzic, J.-M. Lepage, M. Bibard), Saint-Nicolas-de-Brem, Brem-sur-Mer, 16 novembre (F. Portier).

(Sibérie septentrionale et orientale, Asie centrale. Migrateur rare mais régulier à l'automne en Vendée, particulièrement contacté sur le littoral et les îles).

Avec 20 données pour 21 oiseaux pour la période, cette espèce emblématique reste bien régulière à l'automne en Vendée. La donnée de décembre 2007 sur l'île de Noirmoutier est remarquable.

POUILLOT DE BONELLI *Phylloscopus bonelli* **

(4/20) (0/0 ; 1/1 ; 0/0)

2007 - marais de la Guerche, L'Île-d'Yeu, juv. probable, 30 août (X. Hindermeier).

(Sud de l'Europe, Turquie, Afrique du Nord. Migrateur assez rare et nicheur irrégulier et très localisé en Vendée).

Une seule donnée en période post-nuptiale.

POUILLOT VÉLOCE *Phylloscopus collybita*

Individus de type sibérien (à savoir présentant les caractéristiques de la sous-espèce tristis mais non chanteurs et non capturés)

(0/0) (1/1 ; 1/1 ; 1/1)

2006 - dépression de la dune de la Grande Conche, L'Île-d'Yeu, phot., 26 octobre (X. Hindermeier, O. Penard, F. Portier).

2007 - la Paracou, Les Sables-d'Olonne, 7 et 8 novembre (M. Bibard).

2008 - port du Bonhomme, La Guérinière, 8 janvier (D. Desmots).

(Sibérie. Rare et irrégulier à l'automne en Vendée).

Trois données pour la période, homologuées sur la base d'une bonne description avec cri de ce taxon très délicat.

TICHODROME ÉCHELETTE *Tichodroma muraria*

(0/0) (1/1 ; 1/1 ; 0/0)

2006 - quartier Notre Dame, La Roche-sur-Yon, ad. probable, phot., 31 octobre au 26 mars (F. Portier, L. Boudeau, X. Daniaud *et al.*).

2007 - quartier de la cité administrative, La Roche-sur-Yon, 10 novembre (J.-P. Emeriau), 30 janvier (M. Billot).

(Niche dans les montagnes du Sud de l'Europe, du Nord de l'Espagne à la Bulgarie, ainsi que dans le Nord à l'Ouest de l'Iran. En hiver, peut être observé n'importe où en France (bâtiments, barrages, monuments...). Hivernant très rare et très irrégulier en Vendée).

Premières données depuis la création du CHD 85 avec en prime un hivernage complet dans un quartier de La Roche-sur-Yon en 2006. L'oiseau de 2007 a sans doute également hiverné mais le secteur de jardins avec murs était bien plus difficile d'accès. Cette espèce est à rechercher en hiver dans tous les sites propices du département (anciens monuments, carrières, grands barrages, etc).

PIE-GRIÈCHE GRISE *Lanius excubitor*

(4/4) (1/1 ; 1/1 ; 0/0)

2006 - marais mouillés, Rosnay, 20 octobre au 14 novembre (J. & P. Adams).

2007 - la Paracou, Les Sables-d'Olonne, ad., 19 octobre (M. Bibard).

(Nord et Centre de l'Europe pour la sous-espèce nominale. Très rare en migration ou en hivernage en Vendée).

Deux nouvelles données à l'automne qui s'ajoutent aux quatre données homologuées depuis la création du CHD 85. Pas de donnée en hiver pour la période.

GRAND CORBEAU *Corvus corax*

(0/0) (0/0 ; 1/1 ; 1/1)

2007 - Carrière puis Bergerie, L'Île d'Yeu, imm., phot., 11 mars au 15 février (X. Hindermeier, F. Portier, M.-P. Hindermeier).

2008 - la Davière, Venansault, 28 septembre (F. Portier).

(Niche en France principalement dans la moitié Sud-Est du pays, à l'est d'une ligne virtuelle allant des Pyrénées-Atlantiques au Bas-Rhin. Toutefois, une petite population nicheuse subsiste dans l'Ouest de la France (Bretagne et Normandie). Très rare en Vendée).

Premières données depuis la création du CHD 85 et troisième et quatrième mentions pour la Vendée. Le séjour prolongé de l'espèce sur l'île d'Yeu est remarquable (Hindermeier, 2009) ; quant à l'oiseau de Venansault, il était en migration dans un groupe de choucas des tours.

ÉTOURNEAU UNICOLERE *Sturnus unicolor*

(0/0) (1/1 ; 0/0 ; 0/0)

2006 - L'Épine, mâle ad., phot., du 16 janvier au 27 mai (M. Vaslin, D. Desmots *et al.*).

(Corse, Sicile, Sardaigne, Espagne, Afrique du Nord. Très rare en Vendée).

Deuxième mention vendéenne. Peut-être le même oiseau que celui trouvé le 15 décembre 2004 et observé jusqu'au 17 janvier 2005 (donnée acceptée par le CHN ; Frémont *et al.*, 2006).

VENTURON MONTAGNARD *Serinus citrinella*

(0/0) (1/1 ; 0/0 ; 0/0)

2006 - dépression de la dune de la Grande Conche, L'Île-d'Yeu, mâle ad., phot., 26 octobre (X. Hindermeier, O. Penard, F. Portier).

(Niche dans les montagnes du centre de la péninsule ibérique à la Forêt Noire et à l'Autriche. En France, présent dans les Pyrénées, les Alpes, le Massif central, les Vosges et le Jura).

Première donnée vendéenne de cette espèce montagnarde, qui plus est sur l'île d'Yeu ! (Hindermeier *et al.*, 2012).

SIZERIN FLAMMÉ *Carduelis flammea*

(3/3) (1/2 ; 1/1 ; 1/1)

2006 - la Garlière, Olonne-sur-Mer, 2 ind., 27 janvier (A. Barzic).

2007 - Réserve Naturelle des Marais de Müllembourg, Noirmoutier-en-l'Île, 22 octobre (D. Desmots).

2008 - dune de la Grande Conche, L'Île-d'Yeu, 2 novembre (O. Laluque).

(Massif alpin, Nord de l'Europe, Scandinavie et Sibérie pour *flammea* ; Grande-Bretagne pour *cabaret*. Migrateur et hivernant rare en Vendée).

Avec une seule donnée par an pour la période, cette espèce reste rare en Vendée.

BRUANT LAPON *Calcarius lapponicus*

(4/6) (1/1 ; 1/1 ; 1/1)

2006 - polder de Sébastopol, Barbâtre, 1^{er} hiver, phot., 5 au 11 octobre (M. Vaslin, D. Desmots, F. Le Gallo *et al.*).

2007 - pointe du Château Maugarni, L'Île d'Yeu, 28 septembre (F. Portier).

2008 - anse des Broches, L'Île d'Yeu, 26 octobre (O. Laluque).

(Scandinavie, Sibérie. Migrateur et hivernant occasionnel en Vendée).

Une seule donnée par an, toutes obtenues à l'automne. À rechercher dans les bandes d'alouettes en hiver.

BRUANT ORTOLAN *Emberiza hortulana*
(14/21) (2/2 ; 4/14 ; 2/3)

2006 - pointe de l'Aiguillon, L'Aiguillon-sur-Mer, juv., 31 août (S. Chambris, J.-Y. Barnagaud) ; Pelfrey, Barbâtre, phot., 18 septembre (E. Gas).

2007 - dune de la Grande Conche, L'Île-d'Yeu, 3 ad., 28 avril (X. Hindermeyer), ad., 29 avril (X. Hindermeyer, C. Lanzani) ; Fort Larron, Noirmoutier-en-l'Île, 1^{er} hiv., phot., 22 août (D. Desmots, J. Huteau *et al.*) ; Ker Viroux et la Bergerie, L'Île-d'Yeu, 9 ind., phot., 14 au 17 septembre (X. Hindermeyer, F. Portier).

2008 - plage des Bossilles, L'Île-d'Yeu, ad. probable, 17 août (X. Hindermeyer) ; STEP, La Tranche-sur-Mer, 2 ind. (ad. et juv.), phot., 30 août (F. Portier).

(Europe, Russie. Migrateur rare en Vendée).

L'île d'Yeu demeure le site où cette espèce est le plus régulièrement contactée aux deux passages.



Bruant ortolan, la Tranche-sur-Mer, 2008

Photo © F. Portier

Annexe 1 - Espèces dont l'origine naturelle n'est pas établie

FLAMANT ROSE *Phoenicopterus ruber*
(0/0) (0/0 ; 1/2 ; 0/0)

2007 - marais d'Olonne, Olonne-sur-Mer, 2 ad., phot., 14 juillet au 19 septembre (A. Barzic, F. Portier *et al.*).

(Sud de l'Europe, Sud-Ouest de l'Asie, Afrique. Rare en dehors du littoral Méditerranéen).

Première donnée homologuée depuis la création du CHD 85. Le fait que ces individus soient sauvages ne peut être exclu.

TADORNE CASARCA *Tadorna ferruginea*
(7/5) (0/0 ; 1/3 ; 1/3)

2007 - le Giraubeau, Beauvoir-sur-Mer, 3 ind. (2 ad. et 1 imm.), phot., 21 janvier (M. Vaslin, A. Servain, A. Geraudel).

2008 - le Petit Rocher, Puyravault, 3 ad. (2 mâles et 1 femelle), phot., 31 décembre au 17 janvier (Y. Gaugris, J.-C. Croisé).

(Niche ponctuellement en Afrique du Nord, et de la Grèce à l'Asie centrale, la Mongolie, le Nord de la Chine, en Sibérie au nord jusqu'au lac Baïkal. Apparitions automnales irrégulières en Vendée).

Deux données hivernales en 2007 et 2008 de trois individus, ce qui est plutôt inhabituel.

LISTE DES DONNÉES NON HOMOLOGUÉES

Le CHD rappelle que les données figurant dans cette liste n'ont pu être homologuées en raison du doute qui persiste quant à l'identification de l'espèce proposée. Bien souvent, ceci est dû à une description trop succincte ou à une observation trop brève. Il est donc conseillé d'établir des fiches d'homologation avec le plus d'informations possible, même si, à priori, l'identification de l'espèce proposée semble aisée. Pour la plupart des données, les raisons ayant entraîné la non-homologation sont succinctement indiquées entre parenthèses.

2006

AIGLE BOTTÉ *Hieraetus pennatus* : le Chaffaud, Chambretaud, 7 avril (description insuffisante).

VAUTOUR FAUVE *Gyps fulvus* : la Pelissonnière, Le Boupère, 15 et 16 juin (description trop succincte qui ne permet pas de trancher complètement en faveur de cette espèce).

PLUVIER GUIGNARD *Charadrius morinellus* : baie de l'Aiguillon, 27 août (description trop succincte).

PHRAGMITE AQUATIQUE *Acrocephalus paludicola* : la Belle Henriette, La Faute-sur-Mer, 28 août puis 31 août (descriptions trop succinctes).

ROUSSEROLLE VERDEROLLE *Acrocephalus palustris* : pointe de l'Aiguillon, L'Aiguillon-sur-Mer, 27 au 28 août ; la Belle Henriette, La Faute-sur-Mer, 1 à 2 ind., 25 au 28 août (descriptions trop succinctes).

POUILLOT VÉLOCE de type sibérien *Phylloscopus collybita* : plage de la Tourette, L'Île-d'Yeu, 6 décembre (le cri évoqué ne correspond pas et absence de photos ; la sous espèce *abietinus* n'est pas à exclure).

2007

AIGLE BOTTÉ *Hieraaetus pennatus* : étang des Boucheries, Les Landes-Génusson, 24 novembre (description non convaincante d'un oiseau sombre à une date tardive).

GOÉLAND PONTIQUE *Larus cachinnans* : lagunage de Jard-sur-Mer, 25 décembre (jizz et pattern des ailes ne correspondent pas à l'espèce proposée).

STERNE DE DOUGALL *Sterne dougallii* : Réserve Naturelle des Marais de Müllembourg, Noirmoutier-en-l'Île, 21 juillet (description insuffisant, ne permettant pas de trancher en faveur de l'espèce).

TADORNE CASARCA *Tadorna ferruginea* : le Bout de Sac, Beauvoir-sur-Mer, 23 février ; polder de Sébastopol, Barbâtre, 31 août (descriptions trop succinctes).

2008

OCÉANITE CULBLANC *Oceanodroma leucorhoa* : pointe des Corbeaux, L'Île-d'Yeu, 30 avril (description ne permettant pas d'écarter une autre espèce d'océanite proche (O. de Castro), surtout à une date atypique pour l'O. culblanc).

GOÉLAND BOURGMESTRE *Larus hyperboreus* : plage de Luzeronde, L'Épine, 3 octobre (éléments diagnostiques non décrit, taille ne plaidant pas en faveur de l'espèce).

REMERCIEMENTS

Le CHD Vendée tient à remercier :

- Marie-Paule Hindermeier pour la relecture et la mise en page ;
- la Ligue pour la Protection des Oiseaux Vendée (LPO 85), particulièrement Perrine Dulac, pour la mise en ligne sur faune-vendee.org ;
- l'ensemble des ornithologues, dessinateurs et photographes sans qui le CHD 85 ne fonctionnerait pas.

BIBLIOGRAPHIE

Commission de l'Avifaune Française (CAF), 2007. Liste officielle des oiseaux de France (catégories A, B et C). *Ornithos*, 14(4) : 234-246.

Crouzier P. & le CHN, 2006. Modification de la liste des espèces soumises à homologation en France. *Ornithos*, 13(3) : 145.

Dubois P.-J., Le Maréchal P., Oliosio G., Yésou P., 2000. *Inventaire des Oiseaux de France. Avifaune de la France métropolitaine*. Nathan/HER, Paris, 400 pages.

Dulac P., 2009. Nidification certaine du Torcol fourmilier *Jynx torquilla* en Vendée en 2007. *La Gorgebleue*, 23 : 17-18.

Hindermeier X., 2009. Séjour prolongé d'un grand corbeau *Corvus corax* sur l'île d'Yeu. *La Gorgebleue*, 23 : 11-15.

Hindermeier X., Penard O., Portier F., 2012. Observation d'un Venturon montagnard *Serinus citronella* à l'île d'Yeu : première donnée vendéenne. *La Gorgebleue 2.0*, 001-FV2012, 2p. www.faune-vendee.org

Frémont J.-Y., Duquet M. & le CHN, 2006. Les oiseaux rares en France en 2004. 23^e rapport du Comité d'Homologation National. *Ornithos*, 13(2) : 73-113.

Portier F., Desmots D. & le CHD 85, 2009. Les oiseaux rares et accidentels en Vendée en 2004 et 2005. Troisième rapport du Comité d'Homologation Départemental Vendéen. *La Gorgebleue*, 23 : 45-57.

Zucca M. & le CMR, 2005. Les observations d'oiseaux migrateurs rares en France. 2^{ème} rapport du CMR (janvier 2001 - décembre 2002). *Ornithos*, 12(5) : 233-260.

Frédéric PORTIER
114 rue Georges Clémenceau
85 190 VENANSAULT
frederic-nadege.portier@orange.fr

ANNEXE

Liste des espèces soumises à homologation départementale à compter du 01/01/2006

rèbe jougris	<i>Podiceps grisegena</i>	Petit-duc scops (2)	<i>Otus scops</i>
Puffin majeur	<i>Puffinus gravis</i>	Chouette de Tengmalm	<i>Aegolius funereus</i>
Puffin yelkouan	<i>Puffinus yelkouan</i>	Martinet à ventre blanc	<i>Apus melba</i>
Océanite culblanc	<i>Oceanodroma leucorhoa</i>	Martinet pâle	<i>Apus pallidus</i>
Blongios nain (1)	<i>Ixobrychus minutus</i>	Rollier d'Europe	<i>Coracias garrulus</i>
Crabier chevelu	<i>Ardeola ralloides</i>	Pic cendré	<i>Picus canus</i>
Ibis falcinelle	<i>Plegadis falcinellus</i>	Pic mar	<i>Dendrocopos medius</i>
Cygne de Bewick	<i>Cygnus columbianus</i>	Alouette calandre	<i>Melanocorypha calandra</i>
Cygne chanteur	<i>Cygnus cygnus</i>	Alouette haussecol	<i>Eremophila alpestris</i>
Oie des moissons	<i>Anser fabalis</i>	Hirondelle de rochers	<i>Hirundo rupestris</i>
Fuligule à bec cerclé	<i>Aythya collaris</i>	Hirondelle rousseline	<i>Hirundo daurica</i>
Fuligule nyroca	<i>Aythya nyroca</i>	Pipit de Richard	<i>Anthus richardi</i>
Pygargue à queue blanche	<i>Haliaeetus albicilla</i>	Pipit à gorge rousse	<i>Anthus cervinus</i>
Gypaète barbu	<i>Gypaetus barbatus</i>	Jaseur boréal	<i>Bombicilla garrulus</i>
Vautour percnoptère	<i>Neophron percnopterus</i>	Cinle plongeur	<i>Cinclus cinclus</i>
Vautour fauve	<i>Gyps fulvus</i>	Accenteur alpin	<i>Prunella collaris</i>
Aigle royal	<i>Aquila chrysaetos</i>	Traquet oreillard	<i>Oenanthe hispanica hispanica</i>
Aigle botté	<i>Hieraetus pennatus</i>	Monticole de roche	<i>Monticola saxatalis</i>
Aigle de Bonelli	<i>Hieraetus fasciatus</i>	Monticole bleu	<i>Monticola solitarius</i>
Faucon crécerellette	<i>Falco naumanni</i>	Locustelle lusciniioïde (1)	<i>Locustella luscinioides</i>
Faucon kobez	<i>Falco vespertinus</i>	Lusciniolle à moustaches	<i>Acrocephalus melanopogon</i>
Faucon d'Eléonore	<i>Falco eleonora</i>	Phragmite aquatique	<i>Acrocephalus paludicola</i>
Marouette ponctuée	<i>Porzana porzana</i>	Rousserolle verderolle	<i>Acrocephalus palustris</i>
Marouette poussin	<i>Porzana parva</i>	Hypolaïs icterine	<i>Hippolaïs icterina</i>
Râle des genêts (1)	<i>Crex crex</i>	Fauvette à lunettes	<i>Sylvia conspicillata</i>
Talève sultane	<i>Porphyryo porphyryo</i>	Fauvette passerinette	<i>Sylvia cantillans</i>
Outarde canepetière (1)	<i>Tetrax tetrax</i>	Fauvette mélanocéphale	<i>Sylvia melanocephala</i>
Glaréole à collier	<i>Glareola pratincola</i>	Fauvette orphée	<i>Sylvia hortensis</i>
Pluvier guignard	<i>Charadrius morinellus</i>	Fauvette babillarde	<i>Sylvia curruca</i>
Bécasseau de Temminck	<i>Calidris temminckii</i>	Pouillot à grands sourcils	<i>Phylloscopus inornatus</i>
Bécasseau tacheté	<i>Calidris melanotos</i>	Pouillot de Bonelli (1)	<i>Phylloscopus bonelli</i>
Chevalier stagnatilis	<i>Tringa stagnatilis</i>	Pouillot siffleur (1)	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>
Phalarope à bec étroit	<i>Phalaropus lobatus</i>	Gobemouche nain	<i>Ficedula parva</i>
Labbe à longue queue	<i>Stercorarius longicaudus</i>	Gobemouche à collier	<i>Ficedula albicollis</i>
Goéland railleur	<i>Larus genei</i>	Mésange boréale	<i>Parus montanus</i>
Goéland d'Audouin	<i>Larus audouinii</i>	Tichodrome échelette	<i>Tichodroma muraria</i>
Goéland à bec cerclé	<i>Larus delawarensis</i>	Grimpereau des bois	<i>Certhia familiaris</i>
Goéland pontique	<i>Larus cachinnans</i>	Pie-grièche à poitrine rose	<i>Lanius minor</i>
Goéland bourgmestre	<i>Larus hyperboreus</i>	Pie-grièche grise	<i>Lanius excubitor</i>
Sterne hansel	<i>Sterna nilotica</i>	Pie-grièche méridionale	<i>Lanius meridionalis</i>
Sterne de Dougall	<i>Sterna dougallii</i>	Cassenoix moucheté	<i>Nucifraga caryocatactes</i>
Guifette leucoptère	<i>Chlidonias leucopterus</i>	Chocard à bec jaune	<i>Pyrrhocorax graculus</i>
Mergule nain	<i>Alle alle</i>	Crave à bec rouge	<i>Pyrrhocorax pyrrhocorax</i>
Macareux moine	<i>Fratercula arctica</i>	Grand Corbeau	<i>Corvus corax</i>
Coucou geai	<i>Clamator glandarius</i>	Etourneau unicolore	<i>Sturnus inicolor</i>

Niverolle alpine	<i>Montifringilla nivalis</i>
Venturon montagnard	<i>Serinus citrinella</i>
Linotte à bec jaune	<i>Carduelis flavirostris</i>
Sizerin flammé	<i>Carduelis flammea</i>
Bruant lapon	<i>Calcarius lapponicus</i>
Bruant fou	<i>Emberiza cia</i>
Bruant ortolan	<i>Emberiza hortulana</i>

(1) hors sites de nidification

(2) hors Noirmoutier

Sous-espèces soumises à homologation

Bernache cravant à ventre pâle	<i>Branta bernicla hrota</i>
Bernache cravant du Pacifique	<i>Branta bernicla nigricans</i>
Gorgebleue à miroir roux	<i>Luscinia svecica svecica</i>
Traquet motteux du Groenland (3)	<i>Oenanthe oenanthe leucorhoa</i>
Pouillot (véloce) de Sibérie (et Pouillot véloce de type sibérien)	<i>Phylloscopus collybita tristi</i>
Choucas des tours	<i>Corvus monedula somerenghi</i>
Choucas des tours	<i>Corvus monedula monedula</i>
Corneille mantelée	<i>Corvus corone cornix</i>

(3) uniquement capturé et mesuré

Espèces dont l'origine naturelle n'est pas établie

Flamant rose	<i>Phoenicopterus ruber</i>
Tadorne casarca	<i>Tadorna ferruginea</i>

► Plus toutes les espèces plus rares qui ne figurent pas dans la liste des oiseaux soumis à homologation nationale ainsi que les espèces observées à une date inhabituelle.