



La Gorgebleue 2.0

Les articles et notes de
www.faune-vendee.org

Référence : 005-FV2014

Les oiseaux rares et accidentels en Vendée en 2009

Cinquième rapport du Comité d'Homologation Départemental Vendéen

Frédéric PORTIER, Frédéric LE GALLO, Bertrand ISAAC & le CHD 85

Citation : PORTIER F., LE GALLO F., ISAAC B. & le CHD 85, 2014. Les oiseaux rares et accidentels en Vendée en 2009. Cinquième rapport du Comité d'Homologation Départemental Vendéen. *La Gorgebleue 2.0*, 005-FV2014, 11 p. www.faune-vendee.org

INTRODUCTION

Ce cinquième rapport du Comité d'Homologation Départemental Vendéen (CHD 85) porte sur l'année 2009.

C'est le dernier rapport publié par ce comité. En effet, à partir du 1^{er} janvier 2010, le Comité d'Homologation est devenu interdépartemental et rassemble désormais des ornithologues de Vendée et de Loire-Atlantique (CH44-85), chargés d'examiner les fiches de ces deux départements.

L'examen des fiches est désormais réalisé à partir d'un module en ligne. Ainsi, toutes les fiches reçues en 2009 ont été examinées début 2010 sur le nouveau module dédié au CH44-85, et ce uniquement par les membres vendéens du nouveau comité interdépartemental, à savoir : Bertrand ISAAC, Didier DESMOTS, Pierre-Paul EVRARD et Frédéric PORTIER (secrétaire).

Le nombre de fiches examinées est de 72 avec un taux d'acceptation de 93 %.

Il faut y ajouter la vérification des données d'Océanite culblanc saisies sur la base faune-Vendée dans la période du 14 novembre au 29 décembre 2009.

Liste des espèces soumises à homologation départementale

La liste des espèces soumises à homologation départementale à compter du 01/01/2006 et jusqu'au 31/12/2009 figure en annexe du présent article.

Rappels sur les fiches d'homologation

Face aux importantes difficultés rencontrées pour juger les fiches auditives, à partir du 1^{er} janvier 2006, le CHD a décidé de ne plus homologuer les fiches seulement auditives (oiseau non vu). Le critère auditif est cependant toujours important pour juger de la validité d'une observation.

Il a également été décidé de ne plus homologuer les fiches sans description, c'est à dire fondées uniquement sur une ou plusieurs photos.

Le comité remercie l'ensemble des observateurs qui ont transmis leurs fiches.

FAITS MARQUANTS

L'année 2009 apporte les premières mentions homologuées de Gobemouche à collier,



AGIR pour la
BIODIVERSITÉ
VENDEE

La LPO Vendée fait partie du réseau VisioNature.

Grâce aux technologies Internet, débutants, amateurs et professionnels naturalistes, peuvent partager en temps réel leur découverte et ainsi améliorer la connaissance et la protection de la faune.



la première mention vendéenne de Grimpereau des bois avec un individu capturé en milieu bocager en plein hiver, les deuxièmes mentions départementales de Goéland d'Audouin et de Martinet pâle.

Noter également la nidification confirmée du Coucou geai dans le Sud du département et un afflux extraordinaire d'océanites culblancs avec un effectif record de presque 1 800 individus entre le 14 novembre et le 29 décembre.

LISTE SYSTÉMATIQUE DES DONNÉES ACCEPTÉES

Les données sont présentées comme suit :

1. Noms français et scientifique.
2. Entre parenthèses : les deux premiers chiffres indiquent respectivement le nombre total de données homologuées depuis la création du CHD et celui des individus correspondants, à l'exception de l'année 2009. Les deux suivants représentent le nombre de données homologuées et le nombre d'individus correspondants pour l'année 2009.
3. Présentation des données par ordre chronologique d'observation.
4. Localité, effectif (si non précisé : se réfère à un seul individu), âge et sexe si connus.
5. Précision si l'oiseau a été tué, trouvé mort ou capturé par un bagueur.
6. Précision si l'oiseau a été photographié (phot.), filmé en vidéo (vidéo) ou enregistré sur bande audio (enr.).
7. Date(s) d'observation.
8. Nom(s) du (ou des) observateur(s) ayant rédigé une fiche et/ou fourni une photo (classés par ordre alphabétique). La mention "*et al.*" indique que d'autres observateurs ont vu le ou les oiseau(x) en question ; en cas de pluralité d'observateurs, le premier nom mentionné est celui du découvreur (ayant rédigé une fiche et/ou fourni une photo).
9. Distribution générale de l'espèce et son statut en Vendée (entre parenthèses), puis commentaire.

La séquence taxonomique est celle de la liste du Comité de l'Avifaune Française (CAF 2007). Les données concernant les races sont mentionnées comme "présentant les caractéristiques" de la race concernée.

Les données présentées sont la propriété entière du ou des observateurs. Elles doivent être citées comme telles dans la littérature, par exemple : **Grimpereau des bois** – 1 ind. de 1^{er} hiver le 17 janvier à Poiroux, Vendée, (F. Salmon, L. Chaillot, *in* Portier *et al.* 2014).

* Espèce soumise au CHD hors de certaines zones géographiques.

** Espèce soumise au CHD en dehors des sites de nidification.

*** Espèce soumise au CHD pour une/des date(s) d'observation exceptionnelle(s).

Océanite culblanc *Oceanodroma leucorhoa* (17/49) (77/>1 787)

2009

Plage de Sion-sur-l'Océan, Saint-Hilaire-de-Riez, 14 novembre (G. Besseau), 1 à 6 ind., 28 novembre (G. Besseau, M. Blé), >40 ind., 29 novembre (C. Dupé, J. Sudraud), env. 10 ind., 2 décembre (C. Dupé) ;

Phare de l'Armandèche, Les Sables-d'Olonne, 22 novembre (M. Bibard), >35 ind., 28 novembre (A. Barzic), >50 à >55 ind., 29 novembre (A. Barzic, J.-C. Croisé, C. Chaigne), 2 ind., 2 décembre (A. Barzic), >641 ind., 5 décembre (F. Le Gallo, J.-C. Croisé), 8 ind., 6 décembre (L. Chaillot), 7 décembre (M. Bibard) ;

Pointe de l'Aiguillon, L'Aiguillon-sur-Mer, env. 50 ind., 24 novembre (E. Blottières *et al.*), >25 ind., 28 novembre (B. Liégeois), 190 ind., 29 novembre (A. Thomas, B. Liégeois), 30 novembre (A. Guégnard) ;

Plage de la Belle Henriette, L'Aiguillon-sur-Mer, 24 novembre (E. Blottières *et al.*), 2 ind., 26 novembre (E. Blottières *et al.*), ind. trouvé mort, 8 décembre (A. Thomas) ;

Plan d'eau de la base de voile, L'Aiguillon-sur-Mer, 28 novembre (B. Liégeois) ;

Parc ostréicole de la Pointe, L'Aiguillon-sur-Mer, 28 novembre (B. Liégeois) ;

La Prise Torse, L'Aiguillon-sur-Mer, 28 novembre (B. Liégeois) ;

La Belle Henriette, partie Sud, La Faute-sur-Mer, 2 ind., 28 novembre (B. Liégeois) ;

Réserve Naturelle Michel Brosselin, Saint-Denis-du-Payré, 5 ind., 28 novembre (Réserve Naturelle) ;

Estuaire de la Vie, Saint-Gilles-Croix-de-Vie, 28

novembre (G. Besseau), env. 15 ind., 28 novembre (M. Blé), >20 ind., 2 décembre (C. Dupé, X. Rozec) ;
Jetée, Saint-Gilles-Croix-de-Vie, env. 250 ind., 28 novembre (G. Besseau, C. Dupé) ;
Quai Gorin, Saint-Gilles-Croix-de-Vie, 28 novembre (M. Blé) ;
Zone Industrielle de la Bégauillère, Saint-Gilles-Croix-de-Vie, 28 novembre (G. Besseau) ;
Pointe de Grosse Terre, Saint-Hilaire-de-Riez, env. 80 ind., 28 novembre (G. Besseau), >3 ind., 29 novembre (F. Portier), 22 ind., 5 décembre (F. Portier) ;
La Dive, Saint-Michel-en-l'Herm, 28 novembre (B. Liégeois) ;
Observatoire, Saint-Michel-en-l'Herm, 4 ind., 28 novembre (B. Liégeois) ;
Plage de la Grière, La Tranche-sur-Mer, 28 novembre (A.-M. Hervouet) ;
Estuaire du Lay, L'Aiguillon-sur-Mer, 43 ind., 29 novembre (A. Thomas) ;
Belle-Vue, Boufféré, ind. trouvé mort, 29 novembre (A. Gérard) ;
Le Parracaud, Bouin, 2 ind., 29 novembre (M. Hubaut) ;
Phare du port du Bec, Bouin, >50 ind., 29 novembre (J.-G. Robin) ;
Plage de la Sauzaie, Brétignolles-sur-Mer, >14 ind., 29 novembre (F. Portier) ;
Rocher de Sainte Véronique, Brétignolles-sur-Mer, 3 ind., 29 novembre (F. Portier) ;
Plage de la Parée, Brétignolles-sur-Mer, >7 ind., 29 novembre 2009 (F. Portier) ;
Plage du Marais Girard, Brétignolles-sur-Mer, >10 ind., 29 novembre 2009 (F. Portier) ;
Le Marais Girard, Brétignolles-sur-Mer, 29 novembre 2009 (F. Portier) ;
Les Conches Arrochaudes, Brétignolles-sur-Mer, 29 novembre (F. Portier) ;
Havre de la Gachère, Brétignolles-sur-Mer, 3 ind., 29 novembre (F. Portier) ;
Plage de la Gachère, Brétignolles-sur-Mer, >15 ind., 29 novembre (F. Portier) ;
Pointe du Devin, L'Épine, >25 ind., 29 novembre (D. Robard) ;
Pointe d'Arcay, La Faute-sur-Mer, 3 ind., 29 novembre (A. Pineau) ;
Plage de la Barrique, La Faute-sur-Mer, 29 novembre (A. Pineau) ;
Plage de la pointe d'Arcay, La Faute-sur-Mer, 6 ind., 29 novembre (A. Pineau) ;
Grande Plage, La Faute-sur-Mer, 5 ind., 29 novembre (A. Thomas) ;
Etang des Boucheries, Les Landes-Génusson, 29

novembre (S. Rapin, L. Chaillot, G. Besseau) ;
Bourg, Maillezais, 29 novembre (F. Halligon *et al.*) ;
Pointe de l'Herbaudière, Noirmoutier-en-l'Île, >20 ind., 29 novembre (D. Robard) ;
Plage de Boisvinet, Saint-Gilles-Croix-de-Vie, >15 ind., 29 novembre (J. Pelloquin) ;
Pill'Hours, Saint-Hilaire-de-Riez, >3 ind., 29 novembre (C. Dupé, J. Sudraud) ;
Sion-sur-l'Océan, Saint-Hilaire-de-Riez, 4 ind., 29 novembre (J. Pelloquin) ;
Place de l'Europe, Saint-Jean-de-Monts, 29 novembre (B. Isaac) ;
Pingaud, Xanton-Chassenon, 29 novembre (F. Halligon *et al.*) ;
Plage de la Pointe, L'Aiguillon-sur-Mer, 13 ind. trouvés morts, 30 novembre (J.-C. Croisé) ;
Le Payré, Jard-sur-Mer, 30 novembre (F. Grolier) ;
Mizottes de Puyravault, Puyravault, 6 ind. plus 2 ind. trouvés morts, 30 novembre (A.-M. Hervouet) ;
Château de la Butière, Mormaison, ind. trouvé mort, 1^{er} décembre (F. Guilloton, T. Laurent) ;
Le Corps de Garde, La Tranche-sur-Mer, 2 ind. trouvés morts, 1^{er} décembre (J. et P. Adams) ;
Pointe du Vieux Moulin, Château-d'Olonne, 2 ind., 2 décembre (J.-C. Croisé) ;
Pont de Godrand, Maché, 2 décembre (C. Dupé) ;
Plage de la Tresson, La Guérinière, 5 décembre (D. Robard) ;
Dune de La Paracou, Les Sables-d'Olonne, >32 ind., 5 décembre (P.-P. Evrard) ;
Le Trou du Diable, Saint-Hilaire-de-Riez, 2 ind., 5 décembre (F. Portier) ;
Plage du Veillon, Talmont-Saint-Hilaire, ind. trouvé mort, 6 décembre (L. Chaillot) ;
Plage de la Tonnelle, Saint-Jean-de-Monts, 2 ind. trouvés morts, 13 décembre (J. Pelloquin) ;
Les Mizottes, Triaize, trouvé mort, 13 décembre (A. Thomas) ;
Port des Brochets, Bouin, trouvé mort, 14 décembre (M. Cosson) ;
La Case du Dely, Beauvoir-sur-Mer, trouvé mort, 29 décembre (P. Dulac).

(Atlantique Nord. Migrateur et hivernant rare au large des côtes vendéennes, surtout observé lors de coups de vent).

Afflux extraordinaire avec un minimum de 1 787 individus observés sur tout le littoral vendéen et même à l'intérieur des terres entre mi-novembre et fin décembre.

Rappel : lors de la séance plénière du 5 décembre 2009 le CHD 85 a décidé d'homologuer d'office l'ensemble des données d'Océanite culblanc saisies sur la base faune-vendee.org, pendant la période d'afflux exceptionnel de l'automne 2009 (14/11/09

au 29/12/09).

CRABIER CHEVELU *Ardeola ralloides*

(6/11) (2/2)

2009 - le Plessis, Saint-Hilaire-de-Riez, ad., 23 avril (G. Besseau, J.-C. Croisé) ; les Grainetières, Champagné-les-Marais, ad. probable, phot., du 26 mai au 9 juillet (J. Sudraud *et al.*).

(Bassin méditerranéen, Dombes, Brenne, Grand-Lieu. Migrateur rare en Vendée, hiverne en Afrique).

Cet ardéidé reste d'occurrence rare dans notre département. La nidification de cette espèce reste à confirmer en Marais poitevin.



Crabier chevelu, Champagné-les-Marais, 2009

Photo © F. Portier

IBIS FALCINELLE *Plegadis falcinellus*

(2/7) (1/4)

2009 - le Daviaud, La-Barre-de-Monts, 4 ind. (3 ad. et 1 juv.), 17 septembre (J. Pelloquin).

(La sous-espèce nominale *P. f. falcinellus* se reproduit sporadiquement dans le Sud de l'Europe, mais aussi en Afrique du Nord, Asie centrale, Amérique du Nord et Grandes Antilles. Espèce occasionnelle en Vendée).

Une nouvelle donnée vendéenne avec un effectif remarquable de 4 oiseaux en Marais breton de cet Ibis d'occurrence croissante dans notre département ces dernières années.

CYGNE CHANTEUR *Cygnus cygnus*

(4/12) (1/1)

2009- plan d'eau des Vallées, Saint-Hilaire-de-Riez, ad., phot., 8 février (G. Besseau).

(Islande, Scandinavie, Sibérie. Hiverne en Grande-Bretagne, Nord et Centre de l'Europe, mers Noire et Caspienne. Hivernant rare et très irrégulier en Vendée).

À nouveau une donnée de ce Cygne rare en Vendée, à une date plutôt précoce.



Cygne chanteur, Saint-Hilaire-de-Riez, 2009

Photo © G. Besseau

BERNACHE CRAVANT *Branta bernicla*

(17/22) (3/3)

Individus présentant les caractéristiques de la sous-espèce hrota, appelée Bernache à ventre pâle.

2009 - Réserve Naturelle des Marais de Müllembourg, Noirmoutier-en-l'Île, ad., phot., 3 février au 9 mars (D. Desmots) ; le Luzan, Noirmoutier-en-l'Île, ad., phot., 10 septembre (D. Desmots) ; le Luzan et Réserve Naturelle des Marais de Müllembourg, Noirmoutier-en-l'Île, ad., phot., 10 au 24 novembre (D. Desmots).

(Groënland, Spitzberg. Hiverne en petit nombre en Grande-Bretagne et du Danemark à la côte Normande. Sous-espèce hivernant de plus en plus régulièrement en petit nombre en Vendée).

Uniquement des données en provenance de l'île de Noirmoutier, à des périodes classiques.

BERNACHE CRAVANT *Branta bernicla*

(9/9) (1/1)

Individus présentant les caractéristiques de la sous-espèce nigricans, appelée Bernache du Pacifique.

2009 - le Luzan et anse des Brémauds, Noirmoutier-en-l'Île, ad., 9 au 23 novembre (D. Desmots).

(Amérique arctique, Sibérie orientale. Sous-espèce hivernant de plus en plus régulièrement ces dernières années dans notre département, en petit nombre).

Une seule donnée pour 2009, ce qui est maigre pour cette sous-espèce sur un site pourtant très favorable.

FULIGULE NYROCA *Aythya nyroca*

(6/6) (2/2)

2009 - la Braconnière, La Barre-de-Monts, 18 novembre 2009 (P. Dulac) ; lagunage de Jard, Jard-

sur-Mer, mâle ad., phot., 19 décembre 2009 (F. Portier, J.-C. Croisé).

(Niche en Europe de l'Est, au Moyen-Orient et de façon localisée en Espagne. Migrateur et hivernant occasionnel en Vendée).

Bon cru 2009 pour ce fuligule rarissime en hiver en Vendée.

AIGLE BOTTÉ *Hieraaetus pennatus*

(7/11) (1/1)

2009 - le Landreau, Les Herbiers, 31 août (A. Gérard).

(Europe, Afrique du Nord, jusqu'en Asie centrale. Migrateur rare en Vendée. Nidification non encore prouvée).

Une seule donnée post-nuptiale pour 2009. Pas de donnée en période de reproduction.

FAUCON KOBEZ *Falco vespertinus*

(10/11) (2/3)

2009 - la Boissellerie, Beauvoir-sur-Mer, 2 fem., phot., 17 mai (L. Bauza, J.-L. Trimoreau et F. Carrié) ; grand phare, L'Île d'Yeu, fem. 2^e année, 20 mai (F. Portier).

(Niche de la Hongrie aux environs du fleuve Lena, en Russie, vers 120° Est. A niché avec succès en Vendée en 1993. Migrateur occasionnel aux deux passages).

Bonne année 2009 avec 3 individus observés. Noter la troisième mention de l'espèce pour l'île d'Yeu.

MARQUETTE PONCTUÉE *Porzana porzana*

(19/21) (1/1)

2009 - la Belle Henriette, partie Nord, La Faute-sur-Mer, ad., 12 juillet (M. Bibard).

(Europe et Russie. Nicheuse rare en Vendée. Migratrice rare mais régulière, observée surtout lors du passage post-nuptial).

Cette unique donnée rapportée ne reflète pas la réalité de son statut dans notre département.

PLUVIER GUIGNARD *Charadrius morinellus*

(12/16) (2/2)

2009 - pointe de la Fosse, Barbâtre, juv., phot., 18 au 20 août (D. Robard) ; aérodrome, L'Île-d'Yeu, 12 septembre (X. et M.-P. Hindermeier).

(Écosse, Scandinavie, Sibérie. Nicheur rare et localisé en France. Migrateur rare et irrégulier en Vendée aux deux passages).

Deux données postnuptiales, uniquement sur nos îles !

BÉCASSEAU TACHETÉ *Calidris melanotos*

(3/4) (1/1)

2009 - lac de Maché, Maché, ad., phot., 20 au 23 août 2009 (F. Portier *et al.*).

(Amérique du Nord, Sibérie. Rare et irrégulier aux deux

passages en Vendée, particulièrement au printemps ; plus régulier à l'automne).

Nouvelle donnée sur un site classique à une date classique.

CHEVALIER STAGNATILE *Tringa stagnatilis*

(16/16) (1/1)

2009 - Réserve Naturelle des Marais de Müllembourg, Noirmoutier-en-l'Île, 21 août (D. Grandière).

(Europe de l'Est, Russie. Migrateur rare mais régulier en Vendée aux deux passages, de préférence dans les marais littoraux saumâtres ou salés).

Site et date classiques.

LABBE À LONGUE QUEUE

Stercorarius longicaudus

(3/3) (1/1)

2009 - pointe du But, L'Île-d'Yeu, juv., 20 septembre (F. Caloin).

(Circumboréal. Migrateur très rare au large des côtes vendéennes).

Avec une donnée par an, ce labbe reste d'occurrence très rare sur les îles et le littoral vendéens.

GOÉLAND RAILLEUR *Larus genei*

(3/3) (1/1)

2009 - Réserve Naturelle des Marais de Müllembourg et le Luzan, Noirmoutier-en-l'Île, ad., phot., 1^{er} janvier au 15 décembre (D. Desmots *et al.*).

(Europe méridionale, Proche et Moyen-Orient, Asie du Sud-Ouest, Nord et Ouest de l'Afrique. Très rare en Vendée).

Il s'agit toujours du même individu, paradant avec les mouettes rieuses au printemps et présent sur cette île depuis le 14 avril 2003 !

GOÉLAND D'AUDOUIN *Larus audouinii*

(0/0) (1/1)

2009 - plage des Granges, Olonne-sur-Mer, probable 4^e année, phot., 12 mai (Ph. Rouillier, J.-P. Rouillier)

(Méditerranée. Très rare et très irrégulier au printemps en vendée).

Première donnée homologuée par le CHD 85 et deuxième mention départementale (la première étant un adulte vu le 19/04/89 à L'Île-d'Olonne - donnée homologuée par le 8^e CHN (Dubois et le CHN, 1990). Cette espèce est à rechercher au printemps sur le littoral et les îles.

GOÉLAND PONTIQUE *Larus cachinnans*

(1/1) (1/1)

2009 - estuaire du Payré, Talmont-Saint-Hilaire, 3^e hiv., phot., 18 février (F. Portier).

(Niche de la mer Noire jusqu'au Kazakhstan. S'est installé

récemment près de Moscou ainsi qu'en Pologne et en Allemagne. Hivernent dans le golfe Persique, en mer Rouge et en effectif moindre dans le Centre, le Nord et l'Ouest de l'Europe).

Deuxième donnée vendéenne homologuée par le CHD 85.

Note du comité : cette espèce étant d'identification délicate, les fiches reçues sont soumises pour confirmation aux membres du CHN.

GOÉLAND BOURGMESTRE *Larus hyperboreus* (14/15) (12/12)

2009 - l'Herbaudière, Noirmoutier-en-l'Île, 1^{er} hiv., phot., 23 et 24 janvier (B. Isaac); pointe du Devin, L'Épine, 2^e hiv., phot., 23 au 27 janvier (D. Robard, D. Desmots, M. Vaslin) ; plage du Boisvinet, Saint-Gilles-Croix-de-Vie, 2^e hiv., phot., 31 janvier au 2 février (G. Besseau) ; Pierre des Amporelles, L'Île-d'Yeu, 1^{er} hiv., 1^{er} février (X. Hindermeyer) ; Planche à Puare, L'Île-d'Yeu, 1^{er} hiver, 1^{er} février (X. Hindermeyer) ; le Tanchet, Les Sables-d'Olonne, 1^{er} hiv., 9 février (M. Bibard) ; les Marines, Saint-Hilaire-de-Riez, ad., phot., 12 février (G. Besseau) ; plage des Boucholeurs, Barbâtre, 2 ind. de 2^e hiv., phot., 15 au 25 février (O. Sigaud, E. Gas *et al.*) ; plage et lac du Tanchet, Les Sables-d'Olonne, 3^e hiv., phot., 15 au 21 février (B. et F. Duchenne, A. Barzic) ; le Luzan, Noirmoutier-en-l'Île, 2^e hiv., phot., 26 février (M. Vaslin, D. Desmots) ; estuaire du Payré, Talmont-Saint-Hilaire, 3^e hiv., phot., 28 février (F. Portier) ; baie de Sion, Saint-Hilaire-de-Riez, 1^{er} hiv., 8 mars (G. Besseau).

(Arctique. Hivernent en Islande, Grande-Bretagne et Scandinavie. Hivernent assez régulier en Vendée).

Afflux remarquable en janvier-février 2009, à mettre en relation avec l'arrivée massive de laridés arctiques sur la façade Atlantique à la faveur d'une dépression hivernale



Goéland bourgmestre, Talmont-Saint-Hilaire, 2009

Photo © F. Portier

(goélands à ailes blanches, goélands de Kumlien, mouette blanche...).

GUIFETTE LEUCOPTÈRE *Chlidonias leucopterus* (6/6) (2/2)

2009 - baie de Sion, Saint-Hilaire-de-Riez, ad., phot., 19 avril (G. Besseau) ; STEP, La Tranche-sur-Mer, juv., phot., 14 septembre (F. Portier, A. Guégnard, J.-C. Croisé).

(Europe de l'Est, Moyen-Orient, Russie. Migrateur occasionnel en Vendée).

Toujours aussi rare dans notre département. L'année 2009 apporte deux données supplémentaires dont une en baie de Sion, ce qui est plutôt inhabituel.



Guifette leucoptère,

Baie de Sion, Saint-Hilaire-de-Riez, 2009

Photo © G. Besseau

MERGULE NAIN *Alle alle* (10/10) (3/3)

2009 - Port-Joinville, L'Île-d'Yeu, phot., 7 novembre (H. Touzé, V. Motteau) ; pointe du But, L'Île-d'Yeu, 18 novembre (F. Portier) ; port du Morin, L'Épine, épuisé, phot., 26 novembre (D. Desmots, M. Tachlian, J.-M. Porteau).

(Arctique, migrateur rare sur les côtes françaises. Occasionnel en Vendée).

Trois données, toutes obtenues sur nos deux îles à des dates classiques.

MACAREUX MOINE *Fratercula arctica* (2/2) (1/5)

2009 - plage des Sables, Les Sables-d'Olonne, 5 cadavres, 15 novembre (A. Barzic).

(Islande, Grande-Bretagne, Scandinavie, Bretagne. Très rare et irrégulier en Vendée, surtout en automne et en hiver).

À nouveau des données d'oiseaux morts. Les dernières données homologuées de cette espèce par le CHD remontaient à 2001 (également deux cadavres en novembre).

COUCOU GEAI *Clamator glandarius*

(5/5) (2/3)

2009 - le Pont Neuf, Le Perrier, 14 avril (C. et C. König) ; les Grainetières, Champagné-les-Marais, 2 juv., phot., 27 mai au 16 juin (J. Sudraud *et al.*).

(Méditerranée. Migrateur occasionnel en Vendée).

Premier cas de nidification confirmé dans le Sud du département, avec deux jeunes à l'envol alimentés par un couple de pies bavardes.



Coucou geai, Champagné-les-Marais, 2009

Photo © J. Sudraud

MARTINET PÂLE *Apus pallidus*

(1/1) (1/1)

2009 - plage de la Borgne, L'Île-d'Yeu, 26 octobre (O. Laluque).

(Europe du Sud, surtout les côtes et les îles de la Méditerranée, et jusqu'à l'est du Pakistan. Migrateur très rare sur la façade Atlantique. Très occasionnel en Vendée à l'automne).

Deuxième donnée vendéenne et première mention pour l'île d'Yeu. Rappelons que la première donnée départementale de cette espèce avait été obtenue sur l'île de Noirmoutier fin octobre 2005, dans un contexte d'afflux dans le Nord de l'Europe.

PIPIT DE RICHARD *Anthus richardi*

(3/3) (4/8)

2009 - pointe du Châtelet, L'Île-d'Yeu, 19 septembre (F. Caloin) ; Pierre à Monsieur, L'Île-d'Yeu, 1 ad., 5 septembre (O. Penard) ; marais du Jaunay, Givrand, 2 ind., 8 novembre (G. Besseau), 4 ind., phot., 12 décembre au 13 avril (G. Besseau *et al.*).

(Sibérie occidentale, à l'est jusqu'en Mongolie. Migrateur et hivernant rare en Vendée).

Beau cru 2009 avec un hivernage complet de 4 oiseaux dans un secteur de marais rétrolittoral bien suivi.



Pipit de Richard, Givrand, 2009

Photo © G. Besseau

PHRAGMITE AQUATIQUE

Acrocephalus paludicola

(19/71) (3/3)

2009 - la Belle Henriette, partie Sud, La Faute-sur-Mer, juv., phot., 9 août (M. & M. Pirio) ; la Belle Henriette, partie centrale, La Faute-sur-Mer, juv., 9 août (F. Portier) ; STEP de Bourgenay, Talmont-Saint-Hilaire, 8 septembre (M. Bibard).

(Pologne, Hongrie, Biélorussie, Russie. Migrateur régulier dans l'Ouest de la France, dont le littoral vendéen, au passage post-nuptial).

Trois données sur des sites et dates classiques. Cette espèce reste très difficile à observer *in natura* en dehors des opérations de baguage.



Phragmite aquatique, La Belle Henriette, 2009

Photo © M. et M. Pirio

FAUVETTE BABILLARDE *Sylvia curruca*

(5/5) (2/2)

2009 - dune de la Grande Conche, L'Île-d'Yeu, ad., 20 mai (F. Portier) ; Réserve Naturelle des Marais de Müllembourg, Noirmoutier-en-l'Île, 21 septembre (D. Desmots, J.-M. Porteau).

(Nord et Est de l'Europe, Russie et Moyen-Orient. Migrateur rare en Vendée, contacté surtout en automne (octobre)).

Deux données islaies dont une au printemps, ce qui est bien rare chez nous.

POUILLOT À GRANDS SOURCILS

Phylloscopus inornatus

(20/21) (6/6)

2009 - camping, L'Île-d'Yeu, 27 octobre (X. et M.-P. Hindermeyer, O. Lалуque) ; vallon de l'aérodrome, L'Île-d'Yeu, 30 octobre (X. et M.-P. Hindermeyer) ; mare des Agaures, Les Sables-d'Olonne, 7 et 8 novembre (F. Portier, G. Besseau *et al.*) ; dépression de la dune de la Grande Conche, L'Île-d'Yeu, 30 octobre (X. et M.-P. Hindermeyer) ; Saint Nicolas de Brem, Brem-sur-Mer, 31 octobre (G. Besseau) ; mare des Agaures, Les Sables-d'Olonne, 24 au 28 novembre (M. Bibard, A. Barzic).

(Sibérie septentrionale et orientale, Asie centrale. Migrateur rare mais régulier à l'automne en Vendée, particulièrement contacté sur le littoral et les îles).

Six données pour la période sur des sites et des dates classiques. Noter l'absence de données rapportées sur l'île de Noirmoutier.

POUILLOT SIFFLEUR *Phylloscopus sibilatrix* **

(11/14) (1/1)

2009 - Grand Bois du Pailly, Chantonay, mâle ad., 25 avril (D. Godreau).

(Europe. Migrateur et nicheur irrégulier en Vendée).

Une seule donnée en période pré-nuptiale de ce pouillot devenu nicheur très irrégulier dans notre département.

POUILLOT VÉLOCE *Phylloscopus collybita*

Individus de type sibérien (à savoir présentant les caractéristiques de la sous-espèce tristis mais non chanteurs et non capturés).

(3/3) (2/2)

2009 - aérodrome, L'Île-d'Yeu, 30 octobre (O. Lалуque) ; mare des Agaures, Les Sables-d'Olonne, 8 novembre (M. Bibard).

(Sibérie. Rare et irrégulier à l'automne en Vendée).

Deux données pour la période à des dates classiques.

GOBEMOUCHE À COLLIER *Ficedula albicollis*

(0/0) (1/1)

2009 - polder de Sébastopol, Barbâtre, juv., 19 septembre (L. Chaillot).

(De l'Est de la France à l'Oural d'ouest en est). Migrateur très rare, surtout à l'automne en Vendée).

Première donnée homologuée par le CHD 85. À rechercher en septembre sur le littoral lors des stationnements importants de gobemouches noirs.

GRIMPEREAU DES BOIS *Certhia familiaris*

(0/0) (1/1)

2009 - la Fignouzière, Poiroux, 1^{er} hiv., capturé, phot., 17 janvier (F. Salmon, L. Chaillot).

(La sous-espèce *macroactyla* niche dans l'Ouest de l'Europe continentale jusqu'au fleuve Oder, à la République tchèque, la Hongrie, le Nord-Ouest de l'ex-République yougoslave).

Première donnée vendéenne d'un oiseau capturé en plein hiver en milieu bocager, ce qui laisse supposer que cette espèce passe complètement inaperçue dans notre département. Cet individu a été rapatrié au MNHN pour tenter de découvrir l'appartenance sub-spécifique.

SIZERIN FLAMMÉ *Carduelis flammea*

(6/7) (2/2)

2009 - quartier de la CPAM, La Roche-sur-Yon, 6 janvier (M. Piriou) ; pointe des Corbeaux, L'Île-d'Yeu, fem. 1^{er} hiv., type *cabaret*, 24 novembre (S. Reeber).

(Massif alpin, Nord de l'Europe, Scandinavie et Sibérie pour *flammea* ; Grande-Bretagne pour *cabaret*. Migrateur et hivernant rare en Vendée).

Avec deux données pour la période, cette espèce reste rare en Vendée.

BRUANT LAPON *Calcarius lapponicus*

(7/9) (2/2)

2009 - les Mizottes, Triaize, ad., 13 février (E. Joyeux) ; pointe du Châtelet, L'Île-d'Yeu, phot., 19 septembre (F. Caloin).

(Scandinavie, Sibérie. Migrateur et hivernant occasionnel en Vendée).

Deux données de cette espèce d'occurrence irrégulière dans notre département.

BRUANT ORTOLAN *Emberiza hortulana*

(22/40) (2/4)

2009 - marais de la Guerche, L'Île-d'Yeu, 2 ind., dune de la Grande Conche, L'Île-d'Yeu, 2 ind., 13 septembre (X. et M.-P. Hindermeyer).

(Europe, Russie. Migrateur rare en Vendée).

L'île d'Yeu demeure le site où cette espèce est le plus régulièrement contactée aux deux passages.

LISTE DES DONNÉES NON HOMOLOGUÉES

Le CHD rappelle que les données figurant dans cette liste n'ont pu être homologuées en raison du doute qui persiste quant à l'identification de l'espèce proposée. Bien souvent, ceci est dû à une description trop succincte ou à une observation trop brève. Il est

donc conseillé d'établir des fiches d'homologation avec le plus d'informations possible, même si, à priori, l'identification de l'espèce proposée semble aisée. Pour la plupart des données, les raisons ayant entraîné la non-homologation sont succinctement indiquées entre parenthèses.

2009

IBIS FALCINELLE *Plegadis falcinellus* : Réserve Naturelle des Marais de Müllembourg, Noirmoutier-en-l'Île, 13 octobre (description insuffisante ne permettant pas d'écarter d'autres espèces d'Ibis exotiques).

CYGNE CHANTEUR *Cygnus cygnus* : étang de Badiolle, La-Roche-sur-Yon, 1^{er} hiv., 25 décembre (description ne permettant pas d'écarter le Cygne de Bewick).

GOÉLAND PONTIQUE *Larus cachinnans* : plage Clémenceau, Saint-Vincent-sur-Jard, ad., 27 janvier ; plages de la Tourette et du Marais Salé, L'Île-d'Yeu, 1^{er} au 16 février.

Pour cette espèce, le CHD 85 a décidé de solliciter le Comité d'Homologation National pour l'ensemble des fiches proposées à l'examen en 2009 afin de collecter l'avis de personnes expérimentées aux pièges d'identification. Les deux fiches ont été refusées par le CHN même si des critères évoquent sans aucun doute le Goéland pontique, il ne s'agit très vraisemblablement pas d'oiseaux "purs" (peut-être des hybrides avec le Goéland argenté). Sans autres éléments, il est difficile d'exclure des hybrides potentiels (phénomène de plus en plus fréquent au sein du groupe *argentatus-cachinnans-michahellis*). Par conséquent, le comité a décidé de se conformer à la décision du CHN et de ne pas valider ces deux données en tant que Goéland pontique "pur".

POUILLOT À GRANDS SOURCILS *Phylloscopus inornatus* : port de la Guittière, Talmont-Saint-Hilaire, 18 octobre (description insuffisante ne permettant pas de trancher en faveur de l'espèce)

REMERCIEMENTS

Le CHD Vendée tient à remercier :

- Fred Le Gallo et Bertrand Isaac pour l'aide à la rédaction de ce rapport ;
- Marie-Paule Hindermeyer pour la relecture et la mise en page ;
- la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Vendée, particulièrement Perrine Dulac, pour la

relecture critique du rapport et sa mise en ligne sur faune-vendee ;

- l'ensemble des ornithologues, dessinateurs et photographes sans qui le CHD85 ne fonctionnerait pas.

BIBLIOGRAPHIE

Commission de l'Avifaune Française (CAF), 2007. Liste officielle des oiseaux de France (catégories A, B et C). *Ornithos*, 14(4) : 234-246.

Dubois P. et le CHN, 1990. Les observations d'espèces soumises à homologation en France en 1989. *Alauda*, 58 (4) : 245-266.

Frédéric PORTIER

114 rue Georges Clémenceau

85 190 VENANSAULT

frederic-nadege.portier@orange.fr

ANNEXE

Espèces soumises à homologation départementale en Vendée à compter du 01/01/2006 au 31/12/2009

Grèbe jougris	<i>Podiceps grisegena</i>	Petit-duc scops (2)	<i>Otus scops</i>
Puffin majeur	<i>Puffinus gravis</i>	Chouette de Tengmalm	<i>Aegolius funereus</i>
Puffin yelkouan	<i>Puffinus yelkouan</i>	Martinet à ventre blanc	<i>Apus melba</i>
Océanite culblanc	<i>Oceanodroma leucorhoa</i>	Martinet pâle	<i>Apus pallidus</i>
Blongios nain (1)	<i>Ixobrychus minutus</i>	Rollier d'Europe	<i>Coracias garrulus</i>
Crabier chevelu	<i>Ardeola ralloides</i>	Pic cendré	<i>Picus canus</i>
Ibis falcinelle	<i>Plegadis falcinellus</i>	Pic mar	<i>Dendrocopos medius</i>
Cygne de Bewick	<i>Cygnus columbianus</i>	Alouette calandre	<i>Melanocorypha calandra</i>
Cygne chanteur	<i>Cygnus cygnus</i>	Alouette haussecol	<i>Eremophila alpestris</i>
Oie des moissons	<i>Anser fabalis</i>	Hirondelle de rochers	<i>Hirundo rupestris</i>
Fuligule à bec cerclé	<i>Aythya collaris</i>	Hirondelle rousseline	<i>Hirundo daurica</i>
Fuligule nyroca	<i>Aythya nyroca</i>	Pipit de Richard	<i>Anthus richardi</i>
Pygargue à queue blanche	<i>Haliaeetus albicilla</i>	Pipit à gorge rousse	<i>Anthus cervinus</i>
Gypaète barbu	<i>Gypaetus barbatus</i>	Jaseur boréal	<i>Bombicilla garrulus</i>
Vautour percnoptère	<i>Neophron percnopterus</i>	Cinacle plongeur	<i>Cinclus cinclus</i>
Vautour fauve	<i>Gyps fulvus</i>	Accenteur alpin	<i>Prunella collaris</i>
Aigle royal	<i>Aquila chrysaetos</i>	Traquet oreillard	<i>Oenanthe hispanica hispanica</i>
Aigle botté	<i>Hieraetus pennatus</i>	Monticole de roche	<i>Monticola saxatilis</i>
Aigle de Bonelli	<i>Hieraetus fasciatus</i>	Monticole bleu	<i>Monticola solitarius</i>
Faucon crécerellette	<i>Falco naumanni</i>	Locustelle lusciniotide (1)	<i>Locustella luscinioides</i>
Faucon kobez	<i>Falco vespertinus</i>	Lusciniote à moustaches	<i>Acrocephalus melanopogon</i>
Faucon d'Eléonore	<i>Falco eleonora</i>	Phragmite aquatique	<i>Acrocephalus paludicola</i>
Marouette ponctuée	<i>Porzana porzana</i>	Rousserolle verderolle	<i>Acrocephalus palustris</i>
Marouette poussin	<i>Porzana parva</i>	Hypolaïs ictérine	<i>Hippolaïs icterina</i>
Râle des genêts (1)	<i>Crex crex</i>	Fauvette à lunettes	<i>Sylvia conspicillata</i>
Talève sultane	<i>Porphyrio porphyrio</i>	Fauvette passerinette	<i>Sylvia cantillans</i>
Outarde canepetière (1)	<i>Tetrax tetrax</i>	Fauvette mélanocéphale	<i>Sylvia melanocephala</i>
Glaréole à collier	<i>Glareola pratincola</i>	Fauvette orphée	<i>Sylvia hortensis</i>
Pluvier guignard	<i>Charadrius morinellus</i>	Fauvette babillarde	<i>Sylvia curruca</i>
Bécasseau de Temminck	<i>Calidris temminckii</i>	Pouillot à grands sourcils	<i>Phylloscopus inornatus</i>
Bécasseau tacheté	<i>Calidris melanotos</i>	Pouillot de Bonelli (1)	<i>Phylloscopus bonelli</i>
Chevalier stagnatille	<i>Tringa stagnatilis</i>	Pouillot siffleur (1)	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>
Phalarope à bec étroit	<i>Phalaropus lobatus</i>	Gobemouche nain	<i>Ficedula parva</i>
Labbe à longue queue	<i>Stercorarius longicaudus</i>	Gobemouche à collier	<i>Ficedula albicollis</i>
Goéland railleur	<i>Larus genei</i>	Mésange boréale	<i>Parus montanus</i>
Goéland d'Audouin	<i>Larus audouinii</i>	Tichodrome échelette	<i>Tichodroma muraria</i>
Goéland à bec cerclé	<i>Larus delawarensis</i>	Grimpereau des bois	<i>Certhia familiaris</i>
Goéland pontique	<i>Larus cachinnans</i>	Pie-grièche à poitrine rose	<i>Lanius minor</i>
Goéland bourgmestre	<i>Larus hyperboreus</i>	Pie-grièche grise	<i>Lanius excubitor</i>
Sterne hansel	<i>Sterna nilotica</i>	Pie-grièche méridionale	<i>Lanius meridionalis</i>
Sterne de Dougall	<i>Sterna dougallii</i>	Cassenoix moucheté	<i>Nucifraga caryocatactes</i>
Guifette leucoptère	<i>Chlidonias leucopterus</i>	Chocard à bec jaune	<i>Pyrrhocorax graculus</i>
Mergule nain	<i>Alle alle</i>	Crave à bec rouge	<i>Pyrrhocorax pyrrhocorax</i>
Macareux moine	<i>Fratercula arctica</i>	Grand Corbeau	<i>Corvus corax</i>
Coucou geai	<i>Clamator glandarius</i>	Etourneau unicolore	<i>Sturnus inicolor</i>

Niverolle alpine	<i>Montifringilla nivalis</i>
Venturon montagnard	<i>Serinus citrinella</i>
Linotte à bec jaune	<i>Carduelis flavirostris</i>
Sizerin flammé	<i>Carduelis flammea</i>
Bruant lapon	<i>Calcarius lapponicus</i>
Bruant fou	<i>Emberiza cia</i>
Bruant ortolan	<i>Emberiza hortulana</i>

(1) hors sites de nidification

(2) hors Noirmoutier

Sous-espèces soumises à homologation

Bernache cravant à ventre pâle	<i>Branta bernicla hrota</i>
Bernache cravant du Pacifique	<i>Branta bernicla nigricans</i>
Gorgebleue à miroir roux	<i>Luscinia svecica svecica</i>
Traquet motteux du Groenland (3)	<i>Oenanthe oenanthe leucorhoa</i>
Pouillot (véloce) de Sibérie (et Pouillot véloce de type sibérien)	<i>Phylloscopus collybita tristi</i>
Choucas des tours	<i>Corvus monedula somerenghi</i>
Choucas des tours	<i>Corvus monedula monedula</i>
Corneille mantelée	<i>Corvus corone cornix</i>

(3) uniquement capturé et mesuré

Espèces dont l'origine naturelle n'est pas établie

Flamant rose	<i>Phoenicopterus ruber</i>
Tadorne casarca	<i>Tadorna ferruginea</i>

► Plus toutes les espèces plus rares qui ne figurent pas dans la liste des oiseaux soumis à homologation nationale ainsi que les espèces observées à une date inhabituelle.