

La Gorgebleue 2.0

Les articles et notes de
www.faune-vendee.org

Référence : 008-FV2015

LES OISEAUX RARES EN LOIRE-ATLANTIQUE ET VENDÉE EN 2010

Premier rapport du comité d'homologation interdépartemental
de Loire-Atlantique et Vendée

Frédéric PORTIER, Willy RAITIÈRE et le CH44-85

Citation : PORTIER F., RAITIÈRE W. et le CH44-85, 2015. Les oiseaux rares en Loire-Atlantique et en Vendée en 2010. La Gorgebleue 2.0, 008-FV2015, 13 p., www.faune-vendee.org.

Voici le premier rapport des données homologuées en 2010 par le nouveau comité interdépartemental de Loire-Atlantique et Vendée. Ce comité, né de la fusion du CHD44 et du CHD85, a pris ses fonctions le 1^{er} janvier 2010 et rassemble donc des ornithologues de Loire-Atlantique et de Vendée, chargés d'examiner les fiches concernant ces deux départements.

Trois associations sont désormais partenaires et soutiennent le CH44-85 : les LPO Loire-Atlantique et Vendée ainsi que le Groupe Naturaliste de Loire-Atlantique (GNLA).

En 2010, ce comité, composé des membres suivants : Didier Desmots, Pierre-Paul Evrard, Bertrand Isaac, Willy Maillard, Julien Mérot, Frédéric Portier et Willy Raitière (secrétaires respectivement pour la Vendée et pour la Loire-Atlantique), a examiné 154 fiches dont 141 ont été validées et 13 ont été rejetées, soit un taux d'acceptation de 91,5 %.

Nous rappelons que seules les données homologuées sont présentées dans les rapports du CH44-85 et du CMR et invitons les

observateurs qui ne l'auraient pas encore fait à transmettre leurs fiches à l'adresse suivante : ch44_85@yahoo.fr, même si les données sont antérieures à 2010.

FAITS MARQUANTS :

L'année 2010 est un très bon cru car elle apporte les premières données départementales pour les espèces suivantes :

- le Puffin de Macaronésie pour la Vendée ;
- la Bergeronnette citrine pour la Loire-Atlantique ;
- le Robin à flancs roux pour la Vendée ;
- l'Hypolaïs rama pour la Vendée ;
- la Fauvette passerinette pour la Vendée ;
- le Pouillot ibérique pour les deux départements.

À noter également un afflux important de bruants lapons avec pas moins de 16 oiseaux différents observés entre le 18 septembre et le 26 octobre 2010, principalement sur l'île d'Yeu (Vendée).



AGIR pour la
BIODIVERSITÉ
VENDEE

La LPO Vendée fait partie du réseau VisioNature.

Grâce aux technologies Internet, débutants, amateurs et professionnels naturalistes, peuvent partager en temps réel leur découverte et ainsi améliorer la connaissance et la protection de la faune.



LISTE SYSTÉMATIQUE DES DONNÉES ACCEPTÉES

Les données sont présentées comme suit :

1. Noms français et scientifique.
2. Entre parenthèses : les deux premiers chiffres indiquent respectivement le nombre total de données homologuées depuis la création du CH44-85 (soit 0/0 pour cette première année) et celui des individus correspondant, à l'exception de l'année 2010. Les deux suivants représentent, par département et pour l'année 2010, le nombre de données homologuées et le nombre d'individus correspondant.
3. Présentation des données par ordre chronologique d'observation (département, effectif, localité et date). Concernant le(s) nom(s) de (ou des) l'observateur(s) ayant rédigé une fiche et/ou fourni une photo (classés par ordre alphabétique), la mention et al. indique que d'autres observateurs ont vu le ou les oiseau(x) en question ; en cas de pluralité d'observateurs, le premier nom mentionné au rapport du CH est celui de la personne ayant découvert l'oiseau et rédigé une fiche et/ou fourni une photo.
4. Distribution générale de l'espèce (entre parenthèses) et statut dans les départements, puis commentaire.

La séquence taxonomique est celle de la liste du Comité de l'Avifaune Française (CAF, 2007).

Les données concernant les races sont mentionnées comme "présentant les caractéristiques" de la sous-espèce concernée.

Les données présentées sont la propriété entière de (ou des) l'observateur(s). Elles doivent être citées comme telles dans la littérature, par exemple : **Cygne de Bewick** - 1 individu le 26/02/2010, Saint-Joachim, Loire-Atlantique (J.L. Dourin *et al.*, in Portier *et al.* 2015).

* Espèce soumise au CH44-85 hors de certaines zones géographiques.

** Espèce soumise au CH44-85 pour une/des date(s) d'observation exceptionnelle(s).

CYGNE DE BEWICK *Cygnus colombianus*

(0/0) (44 : 1/1 ; 85 : 0/0)

Loire-Atlantique : 1 le 26/02 à la Bosse Verte / Saint-Joachim (Jean-Luc Dourin, Alain Troffigué).

(Se reproduit en Sibérie arctique à l'est de la péninsule de Kola ; hiverne dans les îles Britanniques, du nord de la France au nord-est de l'Allemagne, et ponctuellement plus au sud). Hivernant rare en Loire-Atlantique, très rare et très irrégulier en Vendée, la dernière donnée remontant à 2003. Le site, la date et l'effectif de la donnée 2010 sont classiques pour cette espèce en Loire-Atlantique.

OIE DES MOISSONS *Anser fabalis*

Individus présentant les caractéristiques de la sous espèce *rossicus*, appelée Oie de Toundra (0/0) (44 : 3/5 ; 85 : 1/1)

Loire-Atlantique : 1 ad. le 22/12 sur l'île de Pierre Rouge / Lavau-sur-Loire (Hugo Touzé) ; 1 ad. le 25/12 sur le lac de Grand-Lieu (Sébastien Reeber) ; 2 ad. et 1 juv. le 26/12 sur la vasière de Corsept (Dominique Tavenon).

Vendée : 1 du 10/01 au 15/02 à la Réserve Naturelle de Saint-Denis-du-Payré (Luc Chaillot, Jean Cloutour).

(Scandinavie, Sibérie). Migratrice et hivernante rare, surtout en Vendée. À rechercher l'hiver dans le sud de ce département.

BERNACHE CRAVANT *Branta bernicla*

Individus présentant les caractéristiques de la sous espèce *hrota*, appelée Bernache à ventre pâle.

(0/0) (44 : 1/1 ; 85 : 2/2)



Bernache cravant à ventre pâle Branta bernicla hrota

Batz-sur-Mer, mars 2010

Photo © F. Halligon

Loire-Atlantique : 1 ad. le 13/03 au pont du Yoro / Batz-sur-Mer (François Halligon).

Vendée : 1 ad. le 09/12 sur le polder de Sébastopol / Barbâtre (Dominique Robard) et 1 oiseau de 1^{er} hiver du 09/12 au 29/01/11 au même endroit (Dominique Robard et Frédéric Portier).

(Canada arctique, Groenland, Spitzberg, Terre François-Joseph). Ce taxon est observé très régulièrement dans les deux départements. Certains secteurs accueillent le taxon chaque année comme les traicts de Mesquer et du Croisic en Loire-Atlantique et l'île de Noirmoutier, la baie de Bourgneuf ainsi que la baie de Jard-sur-Mer en Vendée.


BERNACHE CRAVANT *Branta bernicla*

Individus présentant les caractéristiques de la sous espèce *nigricans*, appelée Bernache du Pacifique.

(0/0) (44 : 3/3 ; 85 : 0/0)

Loire-Atlantique : 1 ad. le 01/02 dans la baie de Saint-Goustan / Le Croisic (Olivier Marié) ; 1 mâle ad. du 12/11 au 06/02/11 depuis la butte du Pô / Guérande (Hugo Touzé) et 1 mâle probable ad. du 06/11 au 15/01/11 à Pen Bé / Assérac (Alain Gentric, Philippe Della Valle, Antoine Gergaud, Hugo Touzé).

(Amérique arctique, Sibérie orientale). Hivernant rare mais très régulier dans les deux départements. Pour la Loire-Atlantique, il s'agit sans doute d'oiseaux revenant chaque année dans les traicts du Croisic et la baie de Pen Bé. Les données vendéennes ne sont pas encore parvenues au comité.



Fuligule à bec cerclé Aythya collaris, mâle adulte
Fégréac, janvier 2010
Photo © H. Touzé

FULIGULE À BEC CERCLÉ *Aythya collaris*

(0/0) (44 : 3/2 ; 85 : 0/0)

Loire-Atlantique : 1 mâle ad. du 07 au 10/01 sur l'étang Aumée / Fégréac (Willy Raitière) ; 2 mâles ad. du 10 au 17/01 sur le lac de Grand-Lieu (Sébastien Reeber).

(Amérique du Nord. S'égare régulièrement en Europe de l'Ouest, principalement dans les îles Britanniques). Hivernant rare et irrégulier dans les deux départements. Avec 3 oiseaux différents, 2010 est un bon cru pour l'espèce en Loire-Atlantique.

FULIGULE NYROCA *Aythya nyroca*

(0/0) (44 : 4/4 ; 85 : 1/1)

Loire-Atlantique : le lac de Grand-Lieu est le seul site ayant accueilli l'espèce avec 1 fem. le 10/01 (Sébastien Reeber), 1 mâle ad. du 14/05 au 02/06 (Hugo Touzé, Sébastien Reeber), 1 mâle ad. le 15/10 (Sébastien Reeber) et 1 mâle ad. le 27/12 (Sébastien Reeber).

Vendée : 1 mâle ad. sur la station d'épuration de la Salaisière à Noirmoutier-en-l'Île du 11 au 17/01 (Dominique Robard, Emmanuel Gas).

(Niche des Balkans et de l'Europe centrale jusqu'à l'Asie centrale, occasionnellement plus à l'ouest). Migrateur et hivernant occasionnel en Vendée ; sans doute plus régulier en Loire-Atlantique. Sites et dates classiques pour ces 5 données.

ÉRISMATURE ROUSSE *Oxyura jamaicensis* *

(0/0) (44 : 11/19 ; 85 : 1/23)

Loire-Atlantique : en dehors du lac de Grand-Lieu, 2 mâles et 1 fem. le 07/08 sur l'étang de la Blisière / Soudan (David Grandière, Paul-Emmanuel Chauveau) ; 1 mâle ad. le 03/12 aux Grands Perrets / Corsept (Willy Maillard) ; 1 fem. le 03/12 à l'étang de Gâtineaux / Saint-Michel-Chef-Chef (Willy Maillard) ; 1 fem. le 08/11 sur l'étang de Beaumont / Issé (Willy Raitière) ; 1 fem. du 04 au 10/12, 2 fem. du 15 au 25/12, 2 fem. et 1 mâle de 1^{ère} année du 29/12 au 12/01/11, 2 fem. du 17 au 28/01/11 puis 1 fem. et 1 mâle de 2^e année le 11/02/11 sur l'étang de Beaumont / Issé (Willy Raitière et al.) ; 2 fem. les 03 et 04/12 sur le réservoir de Vioreau / Joué-sur-Erdre (Julien Mérot et al.) ; 1 fem. le 12/12 depuis l'île de Mazerolles / Sucé-sur-Erdre (Olivier Poisson).

Vendée : l'étang des Boucheries / Les Landes-Génusson rassemble la totalité des données

avec un maximum de 17 adultes et 6 poussins le 28/08. L'espèce est présente sur le site de manière quasi-continue entre le 18 juin et le 14 novembre (Luc Chaillot, Gérald et Antoine Reboul).

(Amérique du Nord, introduite en Grande-Bretagne depuis 1960). Espèce surtout notée en automne et en hiver dans les deux départements sur les plans d'eau et lagunes de l'intérieur des terres. Plus rare sur le littoral.

La fin de l'année 2010 concentre un nombre inhabituel d'érismatures rousses dans les deux départements.

Note du comité : la qualité des fiches concernant cette espèce étant régulièrement insuffisante pour exclure l'Érismature à tête blanche *Oxyura leucocephala*, le CH44-85 diffusera prochainement un document d'aide à l'identification, à destination des observateurs.

GRÈBE JOUGRIS *Podiceps grisegena*

(0/0) (44 : 3/3 ; 85 : 4/6)

Loire-Atlantique : 1 le 14/03 sur lac de Grand-Lieu (Sébastien Reeber) ; 1 le 04/04 dans la rade du Croisic / La Turballe (Willy Raitière) et 1 le 19/04 sur le lac de Grand-Lieu (Sébastien Reeber).

Vendée : 1 ad. le 04/02 plage de la Petite Conche / L'Île-d'Yeu (Frédéric Portier) ; 3 du 22 au 25/02 plages des Iliaux et des Ovaies / L'Île-d'Yeu (Xavier Hindermeier) ; 1 le 26/02 à la pointe de l'Aiguillon / L'Aiguillon-sur-Mer (Jacques Pellerin) ; 1 passe en vol devant le phare de l'Armandèche / Les Sables-d'Olonne le 30/10 (Frédéric Le Gallo).

(Dans le Paléarctique occidental, la population reproductrice s'étend de la Russie à l'Allemagne à l'ouest et à la Turquie au sud. Hivernent principalement le long des côtes du nord de l'Europe, de la mer Noire et de l'Adriatique). Migrateur et hivernant rare et irrégulier dans les deux départements. Avec 6 oiseaux, l'année 2010 est un bon crû pour l'espèce en Vendée.

PUFFIN MAJEUR *Puffinus gravis*

(0/0) (44 : 0/0 ; 85 : 1/1)

Vendée : 1 observé le 21/08 lors d'une sortie sur le bateau de pêche Le Filo au large des Sables-d'Olonne (Thomas Perrier).

(Niche dans quelques îles de l'Atlantique Sud : Inaccessible, Nightingale, Tristan da Cunha et Gough). Migrateur très rare et très irrégulier, observé le plus souvent au large de nos côtes.



Puffin majeur Puffinus gravis
Les Sables-d'Olonne, août 2010
Photo © T. Perrier

IBIS FALCINELLE *Plegadis falcinellus*

(0/0) (44 : 11/15 ; 85 : 2/5)

Loire-Atlantique : 2 ad. le 01/01 à Lyarne / les Moutiers-en-Retz (Franck Latraube) ; 1 oiseau navigue le 11/01 et le 16/03 entre les marais de Pompas / Herbignac et le dortoir du Rosay / Mesquer (Olivier et Louise Briand, Christian Kerihuel *et al.*) ; 1 ad. du 07/02 au 05/03 fréquentant le dortoir de Lyarne et le port du Collet / Les Moutiers-en-Retz (Raphaël Chaussis) ; 1 le 29/04 au Fondreau / Bourgneuf-en-Retz (Michel Hubaut) ; en Brière, 1 le 06/04 au Millaud / Saint-Joachim (Didier Montfort) ; du côté de Grand-Lieu, 1 ad. le 03/05 à Passay / La Chevrolière, 1 oiseau de 2^e année entre le 15/05 et le 14/08 en divers endroits du lac, rejoint par 1 autre oiseau de 2^e année entre le 09/07 et le 14/08 puis par 1 ad. entre le 05 et le 14/08 (Sébastien Reeber, André Doucet, Hugo Touzé, Yves Duault) ; 4 ad. le 17/08 à proximité du carrefour entre les routes du Grand Marais et du Petit-Fresnes / Bourgneuf-en-Retz (Jean-Yves Frémont), oiseaux déjà observés quelques jours auparavant dans le même secteur mais du côté vendéen (cf. ci-dessous) ; 1 le 17/09 au port du Collet / Les Moutiers-en-Retz (Willy Raitière).

Vendée : 4 les 15 et 16/08 puis 1 le 29/08 à la Nue / Bouin (Guy Perruchas, Frédéric Portier).

(Se reproduit, en Europe, essentiellement dans l'est et le sud du continent. La plupart des oiseaux européens hivernent en Afrique tropicale ou à l'est de la Méditerranée. En France, l'espèce niche depuis 2006 en Camargue). L'espèce devient de plus en plus régulière en Loire-Atlantique notamment, où elle s'est reproduite sur le lac de Grand-Lieu en 2011 (Reeber, 2011). Demeure rare et irrégulière en Vendée.

Note du comité : La qualité des fiches reçues concernant cette espèce étant régulièrement insuffisante pour exclure les autres espèces d'ibis de type « falcinelle » (Ibis de la Puna *Plegadis ridgwayi* et Ibis à face blanche *Plegadis chihi*) échappées de captivité, le CH44-85 diffusera très prochainement un document d'aide à l'identification, à destination des observateurs.

VAUTOUR FAUVE *Gyps fulvus*

(0/0) (44 : 1/1 ; 85 : 1/4)

Loire-Atlantique : 1 le 12/06 aux Cassières / Saint-Herblon, à proximité du marais de Grée (Hugo Touzé).

Vendée : 4 le 12/06 à la Brétinière / La Roche-sur-Yon (Tim Autin).

(Europe, Afrique du Nord, Moyen-Orient, ouest de l'Asie). Migrateur très rare, mais de plus en plus régulier ces dernières années en juin dans nos départements. A rechercher donc en fin de printemps et début d'été particulièrement.

AIGLE BOTTÉ *Aquila pennata*

(0/0) (44 : 2/2 ; 85 : 2/3)

Loire-Atlantique : 1 oiseau de forme claire le 02/05 au port de Saint-Lumine-de-Coutais (Brice Normand *et al.*) ; 1 oiseau de forme claire le 14/05 à la Chaussée Neuve / Saint-André-des-Eaux (Alexandre, Françoise et Guillaume Corbeau).

Vendée : 1 du 23/05 au 08/08 puis 1 couple (1 individu clair et l'autre sombre) du 21/08 au 05/09 dans le bocage vendéen (localité tenue secrète ; Michel Bibard).

(Europe, Afrique du nord, Asie centrale). Migrateur rare dans les deux départements. La nidification n'a toujours pas été prouvée en Vendée. Avec deux oiseaux notés au cours du printemps en Loire-Atlantique, c'est une bonne année pour l'espèce et pour ce département.

FAUCON KOBEZ *Falco vespertinus*

(0/0) (44 : 0/0 ; 85 : 1/1)

Vendée : 1 fem. de 2^e année le 21/05 à la Chèvrerie / L'Île-d'Yeu (Frédéric Portier).

(Se reproduit essentiellement de la Hongrie au fleuve Léna en Russie. Hiverne en Afrique australe). A niché avec succès en Vendée en 1993. Migrateur occasionnel lors des deux passages dans les deux départements. Il s'agit de la troisième mention de l'espèce pour l'île d'Yeu.

PLUVIER GUIGNARD *Charadrius morinellus* (0/0) (44 : 1/1 ; 85 : 2/2)

Loire-Atlantique : 1 de 2^e année le 23/05 dans le Traict de Rostu / Mesquer (Alain Gentric).

Vendée : 1 ad. du 08 au 11/03 probable sur le polder de Saint-Cérans / Bouin (André Doucet, Olivier Penard *et al.*) ; 1 mâle de 2^e année du 23 au 25/04 plage de la Grande Côte / La Barre-de-Monts (Frédéric Portier, Paul-Emmanuel Chauveau *et al.*).

(Niche en Écosse et de la Scandinavie au sud-est de la Russie, à la Mongolie et à la Sibérie orientale. Hiverne des contreforts de l'Atlas marocain jusqu'à l'Iran en passant par tout le Maghreb, et sporadiquement dans le sud de l'Europe). Migrateur rare et irrégulier dans les deux départements aux deux passages.



Pluvier guignard Charadrius morinellus

Bouin, mars 2010

Photo © O. Penard

BÉCASSEAU TACHETÉ *Calidris melanotos*

(0/0) (44 : 7/7 ; 85 : 2/2)

Loire-Atlantique : toutes les données se rapportent au lac de Grand-Lieu avec seulement des oiseaux de 1^{ère} année : 1 du 07 au 09/09, 1 le 09/09, 1 du 12 au 17/09, 1 du 14 au 17/09, 1 du 15 au 16/09, 1 du 02 au 08/10 et 1 le 03/10 (Sébastien Reeber).

Vendée : 1 oiseau de 1^{ère} année du 08 au 09/09 sur le lac de Maché-Apremont / Maché (Frédéric Portier) ; 1 oiseau de 1^{ère} année du 18 au 19/09 dans les marais de la Guerche / L'Île-d'Yeu (Xavier Hindermeyer, Renaud Baeta *et al.*).

(Niche dans l'Arctique nord-américain, de l'ouest de la baie d'Hudson à l'Alaska et en Sibérie, à l'ouest jusqu'à la péninsule de Yamal. Hiverne en Amérique du Sud, dans le sud-est de l'Australie, en Tasmanie et en Nouvelle-Zélande). Rare et irrégulier lors des deux passages, particulièrement au printemps ; plus régulier à l'automne.

Avec 7 oiseaux en la Loire-Atlantique et 2 en la Vendée, 2010 est une année plutôt "productive" pour l'espèce. Le lac de Grand-Lieu et celui de Maché-Apremont sont des sites classiques pour ce bécasseau néarctique en août et septembre. En revanche, il s'agit de la première mention de l'espèce à l'île d'Yeu.

GOÉLAND À BEC CERCLE *Larus delawarensis*

(0/0) (44 : 1/1 ; 85 : 1/1)

Loire-Atlantique : 1 ad. le 03/02 au lac de Grand-Lieu (Sébastien Reeber).

Vendée : 1 oiseau de 2^e année le 13/05 dans l'anse du Gois / Barbâtre (Didier Desmots et André Barzic).

(Niche dans le centre, le sud-ouest et l'est de l'Amérique du Nord. Hivernant et migrateur néarctique rare fréquentant surtout les zones côtières. Très occasionnel dans les terres). Hivernant et migrateur rare et irrégulier dans les deux départements. Certains secteurs vendéens comme l'île de Noirmoutier accueillent tout de même l'espèce annuellement.

GOÉLAND PONTIQUE *Larus cachinnans*

(0/0) (44 : 1/1 ; 85 : 1/1)

Loire-Atlantique : 1 oiseau de 2^e année le 14/02 au marais de Grée / Saint-Herblon (Hugo Touzé).

Vendée : 1 oiseau de 1^{ère} année le 17/12 sur la plage des Présidents / Les Sables-d'Olonne (Jean-Claude Croisé).

(Niche de la mer Noire au Kazakhstan. S'est installé récemment près de Moscou ainsi qu'en Pologne et en Allemagne. Hiverné dans le golfe Persique, en mer Rouge et en effectif moindre dans le centre, le nord et l'ouest de l'Europe). Très rare dans les deux départements. À rechercher en hiver, dans les bandes de laridés, sur le littoral ou dans les décharges.

Note du comité : les connaissances croissantes sur l'identification de cette espèce laissent espérer de plus nombreuses observations dans le futur. Attention cependant, certains plumages sont assez difficiles à identifier et la présence d'oiseaux hybrides n'est pas à sous-estimer, même si les oiseaux sont bagués.

GOÉLAND BOURGMESTRE *Larus hyperboreus*

(0/0) (44 : 1/1 ; 85 : 2/2)

Loire-Atlantique : 1 oiseau de 2^e année le

26/02 sur l'étang de la Provostière / Riaillé (Paul Lenrume, Pierre Leroy).

Vendée : 1 oiseau de 1^{ère} année le 12/11 à la pointe de l'Herbaudière / Noirmoutier-en-l'Île (Dominique Robard) ; 1 oiseau de 1^{ère} année le 01/12 sur le lac du Tanchet / Les Sables-d'Olonne (André Barzic).

(Niche au Groenland et en Islande puis de l'île Jan Mayern et du Spitzberg jusqu'en Sibérie. Hiverné surtout dans le nord de l'Atlantique jusqu'en Grande-Bretagne ; effectifs réduits plus au sud, présence occasionnelle en Suisse, en mer Caspienne et en Méditerranée). Hivernant rare et irrégulier en Loire-Atlantique, assez régulier en Vendée. La localisation est plutôt originale pour l'oiseau de Loire-Atlantique.



Goéland bourgmestre Larus glaucoideus
Noirmoutier-en-l'Île, novembre 2010
Photo © D. Robard

STERNE HANSEL *Gelochelidon nilotica*

(0/0) (44 : 0/0 ; 85 : 1/2)

Vendée : 2 oiseaux de 2^e année le 01/07 à la Réserve Naturelle Nationale / Saint-Denis-du-Payré (Théophile You).

(Du sud de l'Europe au Kazakhstan, au sous-continent Indien et au nord-est de la Chine ; également en petit nombre en Allemagne et au Danemark). Migratrice rare et irrégulière dans les deux départements. La date précoce plaide pour de jeunes oiseaux non nicheurs en erratisme.

STERNE DE DOUGALL *Sterna dougallii*

(0/0) (44 : 2/4 ; 85 : 0/0)

Loire-Atlantique : 3 ad. le 31/08 à la pointe du Croisic / Le Croisic (Anthony Guérard) ; 1 ad. le 04/09 à la pointe de Saint-Gildas / Préfailles (Aymeric Mousseau).

(Des côtes est de l'Amérique du Nord et des Antilles au nord du Vénézuéla, aux Açores et dans le nord-ouest de l'Europe). Migrateur occasionnel dans les deux départements. Le secteur baie de Bourgneuf / île de Noirmoutier confirme son attractivité pour l'espèce.

L'espèce est à rechercher sur le littoral, dans les regroupements de sternes, surtout à la fin de l'été.

GUIFETTE LEUCOPTÈRE *Chlidonias leucopterus*

(0/0) (44 : 10/22 ; 85 : 2/2)

Loire-Atlantique : à Grand-Lieu tout d'abord avec 4 ad. les 26 et 27/04, 1 ad. du 28/04 au 02/05, 2 ad. le 03/05, 3 ad. les 04 et 05/05, 4 ad. du 08 au 15/05, 2 ad. du 16 au 19/05, 2 ad. le 22/06, 1 oiseau de 1^{ère} année le 07/09 (Sébastien Reeber) ; 1 ad. le 07/05 aux Raimons / Guérande (Gabriel Couroussé) ; 1 couple ad. le 13/06 à la Chaussée Neuve / Saint-André-des-Eaux (Gabriel Couroussé *et al.*).

Vendée : 1 ad. du 22 au 24/04 à la station d'épuration de La Tranche-sur-Mer (Mickaël Faucher) et 1 oiseau de 1^{ère} année le 05/09 au même endroit (Frédéric Portier).

(Niche de l'Europe de l'Est à la Sibérie orientale (région de l'Amour). Hivernent principalement en Afrique tropicale). En Loire-Atlantique, l'espèce tente de se reproduire chaque année depuis l'installation d'un couple en Brière en 2009 (Dourin *et al.*, 2008). En revanche l'espèce reste rare et irrégulière en Vendée lors des deux passages.

MERGULE NAIN *Alle alle*

(0/0) (44 : 0/0 ; 85 : 2/2)

Vendée : 1 le 12/11 devant le phare de l'Armandèche / Les Sables-d'Olonne (Luc Chaillot *et al.*) ; 1 trouvé mort le 21/11 sur la plage du Veillon / Talmont-Saint-Hilaire (Luc Chaillot).

(Niche depuis le haut Arctique canadien et le nord du Groenland jusqu'au Spitzberg et à la Nouvelle-Zemble). Occasionnel en hiver dans les deux départements.

COUCOU GEAI *Clamator glandarius*

(0/0) (44 : 1/1 ; 85 : 4/4)

Loire-Atlantique : 1 ad. du 20 au 24/04 à Penmont / Saint-Molf (Olivier Marié).

Vendée : 1 oiseau de 2^e année le 16/04 à l'Île Chauvet / Bois-de-Céné (Alain Gérard) ; 1 oiseau de 2^e année le 24/04 dans les marais salants de L'Île-d'Olonne (Mickaël Dia) ; 1 ad. les 24 et 25/04 dans le marais du Jaunay / Givrand (Gérard Besseau) ; 1 oiseau de 2^e année le 14/05 entre l'Aubraie et Montportreau / Les Sables-d'Olonne (Michel Bibard).

(Europe méridionale, Moyen-Orient, Afrique du nord). Migrateur rare mais de plus en plus régulier au printemps. A déjà niché en Vendée à deux reprises.

MARTINET À VENTRE BLANC *Apus melba*

(0/0) (44 : 1/1 ; 85 : 1/1)

Loire-Atlantique : 1 le 16/07 sur le lac de Grand-Lieu (Sébastien Reeber).

Vendée : 1 le 24/10 à la pointe de la Gournaise / L'Île-d'Yeu (Hugo Touzé).

(Sud de l'Europe, Asie mineure et Afrique du Nord). Migrateur rare dans les deux départements. L'année 2010 apporte les premières mentions pour le lac de Grand-Lieu et pour l'île d'Yeu.



Martinet à ventre blanc Apus melba

île d'Yeu, octobre 2010

Photo © H. Touzé

PIPIT DE RICHARD *Anthus richardi*

(0/0) (44 : 0/0 ; 85 : 1/6)

Vendée : 2 ad. et 4 imm. du 17/10 au 01/03/11 dans le marais du Jaunay / Givrand (Gérard Besseau *et al.*).

(La sous-espèce type niche de la Sibérie occidentale à la Mongolie et hivernent principalement au Pakistan, en Inde, Chine et Asie du Sud-Est, mais aussi assez régulièrement très à l'ouest de ces quartiers habituels : Espagne, Afrique du Nord... Migrateur et hivernant rare et irrégulier dans les deux départements. Le premier cas d'hivernage complet de 6 oiseaux dans un secteur de marais rétro-littoral de type prairial en Vendée laisse présager le nombre d'oiseaux passant inaperçus !

PIPIT ROUSSELIN *Anthus campestris* *

(0/0) (44 : 2/3 ; 85 : espèce non soumise à homologation)

Loire-Atlantique : 2 ad. le 06/05 à la Grande Falaise / La Turballe puis 1 mâle seul du 07/05 au 29/08 (Aymeric Mousseau *et al.*).

(De l'Europe de l'Ouest à l'Iran, la Sibérie et le nord-ouest du Kazakhstan). Encore des données recueillies sur la dune de Pen Bron à La Turballe, site ayant vu la reproduction de l'espèce en 2009 (Mérot & Raitière, 2010). À compter du 1^{er} janvier 2012, l'espèce ne sera plus soumise à homologation en Loire-Atlantique.

PIPIT À GORGE ROUSSE *Anthus cervinus*

(0/0) (44 : 0/0 ; 85 : 3/3)

Vendée : 1 ad. le 20/04 aux Pierres jumelles du Château / L'Île-d'Yeu (Frédéric Portier *et al.*) ; 1 ad. le 22/04 à la Pierre des Amporelles / L'Île-d'Yeu (Xavier et Marie-Paule Hindermeyer, Frédéric Portier) ; 1 le 09/10 au Vieux Château / L'Île-d'Yeu (Georges Oliosio).

(Se reproduit dans la Toundra arctique ; les populations occidentales migrent surtout par la Méditerranée centrale et hivernent en Afrique dans la zone sahélienne ; quelques individus atteignent les îles Canaries). Très occasionnel dans les deux départements. Année exceptionnelle pour la Vendée avec 3 données et toutes sur l'île d'Yeu !



Pipit à gorge rousse Anthus cervinus
Île d'Yeu, avril 2010
Photo © F. Portier

BERGERONNETTE PRINTANIÈRE *Motacilla flava*

Individus présentant les caractéristiques de la sous-espèce *cinereocapilla*, appelée Bergeronnette d'Italie
(0/0) (44 : 1/1 ; 85 : 0/0)

Loire-Atlantique : 1 mâle ad. le 12/06 à Lanhio / Guérande (Anthony Oates).
(Italie, nord-ouest de la Yougoslavie). Migrateur rare et irrégulier dans les deux départements.

JASEUR BORÉAL *Bombycilla garrulus*

(0/0) (44 : 0/0 ; 85 : 1/1)

Vendée : 1 du 27 au 29/12 sur le parking de la

gendarmerie / Saint-Jean-de-Monts (Charlie Robin).

(La sous-espèce type niche de la Scandinavie à la Sibérie occidentale. Lors de migrations partielles ou d'invasions, l'espèce atteint le sud de la Scandinavie, le Benelux ou l'ensemble de l'Europe centrale). Hivernant très rare dans les deux départements. Les observations de Jaseur boréal dépendent de phénomènes invasifs réguliers chez cette espèce, cependant l'Ouest de la France est rarement concerné par ce type d'évènement.

PHRAGMITE AQUATIQUE *Acrocephalus paludicola*

(0/0) (44 : 2/2 ; 85 : 1/1)

Rappel : espèce soumise à homologation uniquement en dehors des opérations de baguage.

Loire-Atlantique : 1 le 12/09 à Rostu / Mesquer (Alain Gentric) et 1 oiseau de 1^{ère} année le 28/08 dans la roselière de Donges-Est (Julien Mérot *et al.*).

Vendée : 1 le 26/08 à la Belle-Henriette / La Faute-sur-Mer (Thomas Perrier).

(Niche dans les états Baltes, en Biélorussie et en Russie, ainsi qu'en Pologne, en Hongrie et en Allemagne. Hivernent en Afrique de l'Ouest, au moins dans le delta du Sénégal). Seules les données d'oiseaux non capturés sont traitées dans ce rapport. Les opérations de baguage menées dans les deux départements montrent que l'espèce est de passage très fréquent durant le mois d'août dans les principales zones humides littorales. En 2010, 285 individus ont été bagués en Loire-Atlantique sur les différents camps de baguage du département (Le Nevé *et al.*, 2013). Ainsi les observations visuelles de cette espèce discrète ne reflètent pas du tout la réalité du passage.

ROUSSEROLLE VERDEROLLE *Acrocephalus palustris*

(0/0) (44 : 1/1 ; 85 : 0/0)

Loire-Atlantique : 1 de 1^{ère} année capturé le 24/08 dans la roselière de Donges-Est puis contrôlé au même endroit le lendemain (Julien Foucher *et al.*).

(Nord-ouest de la France jusqu'à la mer Caspienne et l'est de l'Oural). Très rare dans les deux départements. Cette observation constitue la troisième mention de l'espèce en Loire-Atlantique. Les deux précédentes données concernaient l'observation d'un mâle chanteur le 30/05/04 au lac de Murin / Massérac et la capture d'un oiseau de première année le 07/08/04 au Massereau / Frossay.



Rousserolle verderolle *Acrocephalus palustris*, 1^{re} année

Donges, août 2010

Photo © ACROLA

FAUVETTE PASSERINETTE *Sylvia cantillans*

(0/0) (44 : 1/1 ; 85 : 1/1)

Loire-Atlantique : 1 mâle le 28/04 à l'Angle Essort / Saint-Julien-de-Concelles (Vincent Tanqueray).

Vendée : 1 mâle du 18 au 22/04 au polder de Sébastopol / Barbâtre (Dominique Robard, Luc Chataigner).

(Europe méditerranéenne). La donnée vendéenne constitue la première observation de l'espèce pour le département tandis que la donnée de Loire-Atlantique est seulement la deuxième depuis la capture d'un mâle le 30/03/1965 sur l'île Dumet (Recorbet, 1992).

FAUVETTE BABILLARDE *Sylvia curruca*

(0/0) (44 : 0/0 ; 85 : 2/2)

Vendée : 1 le 13/10 dans la dune de la Grande Conche / L'Île-d'Yeu (Georges Olios) et 1 le 24/10 dans la vallée de l'Ecours / Brem-sur-Mer (Gérard Besseau, Philippe Rouillier).

(Nord et est de l'Europe, Russie et Moyen-Orient). Migrateur rare dans les deux départements. L'espèce est peut-être plus régulière en Vendée qu'en Loire-Atlantique surtout à l'automne.

POUILLOT À GRANDS SOURCILS *Phylloscopus inornatus*

(0/0) (44 : 0/0 ; 85 : 4/4)

Vendée : 1 le 24/08 dans le bois des Sapins / L'Île-d'Yeu (Xavier Hindermeier) ; 1 le 02/10 à Saint-Nicolas-de-Brem / Brem-sur-Mer (Frédéric Portier) ; 1 le 09/10 aux Loges / L'Île-d'Yeu (Georges Olios) et 1 le 10/10 à la Bergerie / L'Île-d'Yeu (Frédéric Portier).

(Niche dans le nord de la Russie, de la Petchora et de l'Oural à l'ouest, jusqu'à l'Anadyr et la mer d'Orkhotsk à l'est et au sud jusqu'à la Mongolie et au nord-est de la Chine. Hiverné dans le sud-est de l'Asie). Espèce emblématique rare mais régulière chaque automne en Vendée, curieusement plus exceptionnel en Loire-Atlantique (manque de prospection ?). Le littoral rassemble la majorité des observations. La donnée du 24/08 sur l'île d'Yeu est exceptionnellement précoce pour cette espèce qui est principalement observée à partir de début octobre. Curieusement aucune donnée en provenance du site des Agaures (Les Sables-d'Olonne), qui a pourtant déjà accueilli l'espèce à des dizaines de reprises.

POUILLOT DE BONELLI *Phylloscopus bonelli*

(0/0) (44 : 0/0 ; 85 : 4/5)

Vendée : 1 mâle le 28/04 à la Grissonnière / Vouvant (Mickaël Faucher) ; 1 mâle probable le 29/04 en forêt de Graslas / La Copechagnière (Frédéric Le Gallo) ; 2 mâles le 24/05 dans le bois des Gâts / Saligny (Luc Chaillot) ; 1 le 28/08 au camping / L'Île-d'Yeu (Xavier Hindermeier).

(Nord-ouest de l'Afrique, nord et centre de l'Europe). Migrateur devenu rare au printemps. Les données concernent principalement des oiseaux observés au printemps, cependant, les preuves de reproduction sont devenues très rares pour cette espèce qui nichait encore il n'y a pas si longtemps dans les deux départements.

POUILLOT VÉLOCE *Phylloscopus collybita*

Individus présentant les caractéristiques du groupe *abietinus* / *fluvescens* / *tristis*, appelé Pouillot véloce de type sibérien.

(0/0) (44 : 0/0 ; 85 : 1/1)

Vendée : 1 le 1^{er} janvier aux Loges / Saint-Hilaire-des-Loges (Gérard Besseau).

(Scandinavie, Sibérie). Migrateur et hivernant rare bien que régulier dans les deux départements.

À compter du 1^{er} janvier 2012, les oiseaux de ce type ne sont plus pris en compte par le comité. En effet, le plus souvent, les connaissances sur ces taxons ne permettent pas de trancher en faveur de l'un ou de l'autre.

POUILLOT IBÉRIQUE *Phylloscopus ibericus*

(0/0) (44 : 1/1 ; 85 : 1/1)

Loire-Atlantique : 1 mâle du 26/04 au 01/05 à la Rotte aux Loups / Saint-Mars-la-Jaille (Loïc Bellion *et al.*).

Vendée : 1 mâle du 13 au 17/04 à la Chapelle de Bordevert / Saint-Gervais (Alain Gérard, Frédéric Portier).

(Péninsule Ibérique, Afrique du Nord et Sud-Ouest de la France). Ces données fournissent les premières observations de cette espèce pour les deux départements.

GOBEMOUCHE À COLLIER *Ficedula albicollis*

(0/0) (44 : 0/0 ; 85 : 1/1)

Vendée: 1 fem. le 10/10 au camping / L'Île-d'Yeu (Frédéric Portier).

(De l'est de la France à l'Oura). Migrateur très rare, observé surtout à l'automne dans les deux départements. Il s'agit de la première donnée de l'espèce pour l'île d'Yeu. À rechercher en septembre sur le littoral lors des stationnements importants de gobemouches noirs *Ficedula hypoleuca*.

PIE-GRIÈCHE GRISE *Lanius excubitor*

(0/0) (44 : 1/1 ; 85 : 0/0)

Loire-Atlantique : 1 le 15/10 en forêt du Gâvre (Jean-Paul et Annick Mérot).

(Europe de l'Ouest à l'ouest de la Sibérie). Migrateur rare dans les deux départements. Hivernant occasionnel en Vendée. Site classique pour cette espèce en Loire-Atlantique.

PIE-GRIÈCHE À TÊTE ROUSSE *Lanius senator*

(0/0) (44 : 2/3 ; 85 : 5/5)

Loire-Atlantique : 1 couple de la sous-espèce nominale du 18/06 au 16/07 au Marais / Ancenis (Yann Brilland *et al.*) ; 1 mâle le 18/06 sur les Prés Couronnés / Bouée (Jean-Luc Chil *et al.*).

Vendée : seulement des observations de l'île d'Yeu : 1 fem. ad. de la sous-espèce nominale le 21/04 à la Carrière (Frédéric Portier) ; 1 oiseau de 1^{ère} année le 05/09 à la Croix (Xavier Hindermeier) ; 1 oiseau de 1^{ère} année le 11/09 à la Croix (Xavier Hindermeier) ; 1 oiseau de 1^{ère} année les 11 et 12/09 à Perdrette (Xavier Hindermeier) et 1 oiseau de 1^{ère} année le 18/09 à Perdrette (Xavier Hindermeier).

(Europe de l'Ouest et îles de la Méditerranée). Migrateur rare lors des deux passages. Nichait au siècle dernier dans les deux départements. Le couple du marais de Grée / Ancenis a sans doute tenté de se reproduire, mais malheureusement sans succès : aucun jeune n'a été

observé. L'île d'Yeu demeure le site vendéen le plus attractif pour contacter cette espèce.

BRUANT LAPON *Calcarius lapponicus*

(0/0) (44 : 1/1 ; 85 : 15/15)

Loire-Atlantique : 1 en migration active le 26/10 à Lyarne / Les Moutiers-en-Retz (Sébastien Reeber).

Vendée : arrivée groupée le 18/09 avec 1 en vol migratoire observé depuis la dune de la Tresson / La Guérinière (Frédéric Portier), 1 posé puis en vol sur la dune de la Fosse / Barbâtre (Frédéric Portier), 1 en vol à la Pierre à Monsieur / L'Île-d'Yeu (Marie-Paule et Xavier Hindermeier) et 2 posés à la Pierre des Amporelles / L'Île-d'Yeu (Renaud Baeta *et al.*) ; 1 ad. le 02/10 à la pointe de l'Herbaudière / Noirmoutier-en-l'Île (Dominique Robard) ; 1 le 09/10 à Roche Biron / Brétignolles-sur-Mer (Gérard Besseau) ; 1 le 07/10 aux Tchinettes / L'Île-d'Yeu (Georges Olios) ; 1 le 13/10 à la pointe des Corbeaux / L'Île-d'Yeu (Georges Olios) ; 1 le 17/10 aux Terres Gâchées / Lairoux (fide Yves Gaugris) ; 2 posés le 20/10 aux Trupailles / L'Île-d'Yeu (Frédéric Portier) ; 1 en migration active le 20/10 à l'aérodrome / L'Île-d'Yeu (Frédéric Portier) ; 1 posé le 21/10 à la Pierre à Monsieur / L'Île-d'Yeu (Frédéric Portier) et 1 au même endroit le 22/10 (Frédéric Portier).

(La sous-espèce nominale niche de la Scandinavie à la Sibérie, jusqu'à la Kolyma, et hiverne en Europe de l'Ouest et en Asie centrale. La sous-espèce *subcalcaratus*, qui niche au Groenland et au Canada, est d'apparition possible en France). Migrateur automnal rare et irrégulier sur le littoral et les îles. L'automne 2010 a connu un afflux exceptionnel en Vendée, principalement sur les îles.

BRUANT FOU *Emberiza cia*

(0/0) (44 : 1/1 ; 85 : 0/0)

Loire-Atlantique : 1 mâle ad. le 23/05 aux Bruyères / Trans-sur-Erdre (Sébastien Angebaud).

(Maghreb, Sud et Centre de l'Europe). Migrateur et hivernant occasionnel dans les deux départements, plus particulièrement en Vendée. Localisation et date très originales pour une espèce plutôt observée en hiver sur les côtes abrupts des bords de la Loire.

BRUANT ORTOLAN *Emberiza hortulana*

(0/0) (44 : 1/1 ; 85 : 6/6)

Loire-Atlantique : 1 fem. le 14/04 à Loncé / Saint-Malo-de-Guersac (Benjamin Callard).

Vendée : 1 mâle ad. le 29/04 à la Planche à Puare / L'Île-d'Yeu (Frédéric Portier) ; 1 mâle ad. le 29/04 sur la dune de la Grande Conche / L'Île-d'Yeu (Frédéric Portier) ; 1 probable fem. le 24/06 à la Burguinière / Les Sables-d'Olonne (Valentin Motteau) ; 1 le 05/09 à la Croix / L'Île-d'Yeu (Xavier Hindermeier) ; 1 le 11/09 sur la dune de la Grande Conche / L'Île-d'Yeu (Xavier Hindermeier) ; 1 le 18/09 dans les marais de la Guerche/ L'Île-d'Yeu (Xavier Hindermeier).

(De l'Europe de l'Ouest à la Turquie). Migrateur peu commun dans les deux départements. L'île d'Yeu reste le site le plus favorable pour voir cette espèce en déclin.

LISTE DES DONNÉES NON HOMOLOGUÉES

Érismature rousse *Oxyura jamaicensis*

Loire-Atlantique : 2 le 05/12 à la Guillonnière / Sucé-sur-Erdre ; 1 le 21/11 sur la station d'épuration des Moutiers-en-Retz (descriptions ne permettant pas d'exclure l'Érismature à tête blanche).

Vendée : 1 femelle probable le 11/02 à Bouin (description ne permettant pas d'exclure l'Érismature à tête blanche, voire une macreuse ; de plus, le site n'est pas du tout habituel pour l'espèce).

Grèbe jougris *Podiceps grisegena*

Loire-Atlantique : 5 le 16/11 à Kercabellec / Mesquer (description trop succincte, notamment pour cet effectif inhabituel).

Vendée : 1 le 16/10 sur la lagune de la Belle Henriette / La Tranche-sur-Mer (manquent les critères diagnostiques pour cette espèce, certains éléments notés plaident pour une erreur d'identification).

Aigle botté *Aquila pennata*

Loire-Atlantique : 1 le 06/05 à la Croix Rouaud / Trans-sur-Erdre (description trop succincte, certains éléments ne correspondent pas à l'espèce proposée).

Goéland à bec cerclé *Larus delawarensis*

Vendée : 1 le 19/09 sur la station d'épuration de L'Île-d'Olonne (description trop succincte, les critères diagnostiques ne sont pas évoqués).

Goéland pontique *Larus cachinnans*

Loire-Atlantique : 1 de 2^e année le 02/09 au pont d'Ancenis (les photos jointes à la fiche montrent un Goéland leucophée).

Vendée : 1 le 06/09 à la Paracou / Les Sables-d'Olonne (oiseau non décrit, identifié sur la base de la bague qu'il portait, impossible d'exclure un hybride).

Pouillot de Bonelli *Phylloscopus bonelli*

Loire-Atlantique : 1 chanteur le 28/06 à Saint-Méen / Le Cellier (oiseau chanteur non observé et chant décrit trop succinctement).

Pouillot véloce de Sibérie *Phylloscopus collybita tristis*

Vendée : 1 le 30/11 dans le bourg de La Verrie (description incomplète, pas de description des vocalises de l'oiseau).

Gobemouche à collier *Ficedula albicollis*

Vendée : 1 le 08/09 à La Flocellière (description trop sommaire et éléments photographiques fournis prêtant à confusion).

LISTE DES DONNÉES HOMOLOGUÉES PAR LE COMITÉ D'HOMOLOGATION NATIONAL EN 2010

Les données ci-dessous sont issues du rapport 2010 du comité d'homologation national (Reeber & le CHN, 2011) et concernent les départements de la Loire-Atlantique et de la Vendée.

OIE À BEC COURT *Anser brachyrhynchus*

Loire-Atlantique : Saint-Philbert-de-Grand-Lieu : lac de Grand-Lieu, ad., du 7 au 9 février (S. Reeber *et al.*), ad., 27 décembre (S. Reeber).

Vendée : Saint-Denis-du-Payré : réserve naturelle, ad., du 12 mars au 1^{er} avril (P. Trotignon, J.-C. Croisé *et al.*).

BERNACHE À COU ROUX *Branta ruficollis*

Vendée : Bouin : lagune du Dain, 1^{er} hiver, du 7 au 21 février (F. Portier, J.-Y. Frémont *et al.*)

SARCELLE À AILES VERTES *Anas carolinensis*

Loire-Atlantique : Saint-Philbert-de-Grand-Lieu : lac de Grand-Lieu, mâle, 12 décembre (S. Reeber).

ÉRISMATURE À TÊTE BLANCHE *Oxyura leucocephala*

Loire-Atlantique : Saint-Philbert-de-Grand-Lieu : lac de Grand-Lieu, fem. 1^{er} hiver du 11 janvier au 26 mars (S. Reeber), fem. du 14 novembre au 4 mars 2011 (S. Reeber *et al.*), mâle 1^{er} hiver du 18 novembre au 4 mars 2011 (S. Reeber *et al.*).

PUFFIN DE MACARONÉSIE *Puffinus baroli*

Vendée : Les Sables-d'Olonne, 17 août (F. Le Gallo) ; L'Île d'Yeu : pointe des Corbeaux, 24 août (X. Hindermeyer).

PÉLICAN BLANC *Pelecanus onocrotalus*

Loire-Atlantique : Paimboeuf : estuaire de la Loire, ad., du 1^{er} janvier au 31 décembre (*fide* S. Reeber).

PLUVIER BRONZÉ *Pluvialis dominica*

Loire-Atlantique : Saint-Philbert-de-Grand-Lieu : lac de Grand-Lieu, ad., du 3 au 6 puis 16 septembre (S. Reeber *et al.*)

Vendée : L'Île d'Yeu : carrière, juv., 9 octobre (G. Olios).

PLUVIER FAUVE *Pluvialis fulva*

Vendée : Triaize / Saint-Denis-du-Payré : réserve naturelle, ad., du 27 juin au 17 juillet (P. Trotignon, J.-C. Croisé, M. Bibard *et al.*) ; L'Île-d'Olonne : marais d'Olonne, ad., du 24 au 26 septembre (P. Trotignon *et al.*).

BÉCASSEAU ROUSSET *Tryngites subruficollis*

Loire-Atlantique : Saint-Philbert-de-Grand-Lieu : lac de Grand-Lieu, juv., du 13 au 17 septembre (S. Reeber *et al.*).

Vendée : L'Épine : juv., 25 septembre (D. Robard).

PHALAROPE DE WILSON *Phalaropus tricolor*

Vendée : Saint-Denis-du-Payré : réserve naturelle, 20 juin (M. Laplace).

MOUETTE DE BONAPARTE *Chroicocephalus philadelphia*

Loire-Atlantique : Saint-Philbert-de-Grand-Lieu : lac de Grand-Lieu, ad., 19 avril (S. Reeber).

GOÉLAND À AILES BLANCHES *Larus glaucoides*

Vendée : Saint-Vincent-sur-Jard, 1^{er} hiver, 16 décembre (J.-C. Croisé).

STERNE ÉLÉGANTE *Sterna elegans*

Individus présentant les caractéristiques de la Sterne élégante

Vendée : Barbâtre : polder de Sébastopol, ad., 30 avril au 13 juillet. (photos sur www.faune-vendee.fr)

GUILLEMOT À MIROIR *Cephus grylle*

Vendée : L'Île d'Yeu : plage des Bossilles et pointe des Corbeaux, ad. probable, 25 octobre (M.-P. Hindermeyer, F. Portier).

BERGERONNETTE CITRINE *Motacilla citreola*

Loire-Atlantique : Saint-Philbert-de-Grand-Lieu : lac de Grand-Lieu, 1^{er} hiver, 7 et 8 septembre (S. Reeber).

Vendée : L'Île d'Yeu : Port-Joinville, dune de la Grande Conche, 1^{er} hiver, 28 août (X. et M.-P. Hindermeyer).

ROBIN À FLANCS ROUX *Tarsiger cyanurus*

Vendée : L'Île d'Yeu : marais de la Guerche, fem./1^{er} hiver, 21 octobre (F. Portier).

HYPOLAÏS RAMA *Hippolais rama*

Vendée : L'Île d'Yeu : dune de la Grande Conche, 4 septembre (X. Hindermeyer).

ÉTOURNEAU ROSELIN *Sturnus roseus*

Vendée : L'Île d'Yeu : plage de la Tourette, 2 juv./1^{er} hiver, 23 septembre (F. Portier).

BIBLIOGRAPHIE

- CAF., 2007. Liste officielle des oiseaux de France (catégories A, B et C). *Ornithos*, 14(4) : 234-246.
- Dourin J.-L., Montfort D., Reeber S., & Troffigué A., 2008. Premier cas de nidification de la Guifette leucoptère *Chlidonias leucopterus* en France. *Ornithos*, 15(6) : 394-399.
- Frémont J.-Y., Reeber S., & le CHN., 2007. Les oiseaux rares en France en 2005. *Ornithos*, 14(5) : 265-307.
- Le Nevé A., Dugué H., Latraube F., Musseau R., Provost P., & Jiguet F., 2013. *Synthèse des captures de Phragmite aquatique en France en 2010 et 2011. Plan national d'actions du "Phragmite aquatique" 2010-2014.* DREAL Bretagne, CRBPO-MNHN, Bretagne Vivante, SEPNEB, Brest. 57 p.
- Mérot J. & Raitière W., 2010. Première nidification contemporaine du Pipit rousseline *Anthus campestris* en Bretagne historique. *Ornithos*, 17(4) : 260-263.
- Recorbet B. (coord.), 1992. *Les oiseaux de Loire-Atlantique du XIX^{me} siècle à nos jours. Groupe Ornithologique de Loire-Atlantique*, Nantes, 285 p.
- Reeber S. & le CHN, 2011. Les oiseaux rares en France en 2010. *Ornithos*, 18(6) : 325-367.

Frédéric PORTIER
144, rue Georges Clémenceau
85190 VENANSAULT
(frederic-nadege.portier@orange.fr)

Willy RAITIÈRE
Rougerand
44590 SAINT-VINCENT-DES-LANDES
(wild_wild_will_2000@yahoo.fr)

– Avril 2012 –