



Traquet-pâtre
LUP 92

ACTUALITES ORNITHOLOGIQUES de Janvier 1990 à Juin 1991


par Christian GONIN

Vous remarquerez sans doute que ces actualités sont un peu plus longues que les précédentes; elles représentent 18 mois d'observations au lieu de 12. Le calendrier ornithologique couvrira désormais la période du 1er juillet au 30 juin de l'année suivante afin que l'hivernage ne soit pas coupé en deux.

Vous trouverez certains tableaux dans ces pages qui proviennent des nouvelles fiches du GOV, ces tableaux nous permettent de comprendre les cycles de présence (migration, hivernage et nidification).

Pour vous aider à déchiffrer les numéros de cartes					
1024	Noirmoutier	1126	Saint-Gilles	1427	Fontenay-le-Comte
1025	Barbâtre	1226	le Poiré-sur-Vie	1527	St-Hilaire-des-Loges
1125	Challans	1326	la Roche-sur-Yon	1228	Longeville
1225	Palluau	1426	Chantonnay	1328	Aiguillon
1325	Montaigu	1127	la Chaume	1428	Marans
1425	les Herbiers	1227	les Sables-d'Olonne	1528	Benet
1026	Ile d'Yeu	1327	Luçon		

Les 1-2,3-4,5-6,et 7-8 sont des rectangles utilisés dans l'Atlas des oiseaux nicheurs (exemple : la carte de Montaigu Ouest 1/25.000ème correspond à 1325 1-2 (Nord) et 5-6 (Sud) et Montaigu Est correspond 1325 3-4 (Nord) et 7-8 (Sud).



Liste des observateurs de janvier 90 à juin 91 :

X. Baron	X.B ou PNR	J-P. Emeriau	J-P.E	N. Pointecouteau	N.P
G. Besseau	G.B	M. Fonteneau	M.F	O. Pouvreau	O.P
P. Bonnin	P.B	C. Fregat	C.F (CORA)	D. Proust	D.P
L. Bouchereau	L.B	T. Gallais	T.G	H. Pigache	H.P
A. Brodie	A.B	E. Gas	E.G	G. Piveteau	G.P
A. Bueno	A.Bu	A. Gérard	A.G	S. Rapin	S.R
G. Bulidon	G.Bu	C. Goyaud	C.Go	J. Rautureau	J.R
CND d'Aizenay	CNDA	C. Gonin	C.Gn	B. Recorbet	B.R
J-C. Cartier	J-C.C	J. Gonin	J.Gn	Y. Rivière	Y.R
D. Casseron	D.C	Sorties du GOV	GOV	A. Robin	A.R
S. Charrier	S.C	L. Grillet	L.G	M. Rocher	M.R
G-L. Choquène	G-L.C	X. Hindermeyer	X.H	R. Rosoux	R.R ou PNR
D. Desmots	D.D	M-R. Lagacherie	M-R.L	P. Rouillier	P.R
H. Destouches	H.D	C. Launay	C.L	E. Rousseaux	E.R-ACEDEM
J. Delattre	J.De	A. Larousse (Phitiviers)	A.L	P C. Saporato-Durand	PetC.S
A. Doumeret	A.D	J-C. Luez	J-C.L	B. Teillet	B.T
S. Durand	S.D	J. Marquis	J.M	A. Thomas (Pithiviers)	A.T
J. Dupuis	J.D	P. Moteau	P.M	F. Thomas	F.T
Equipe de l'ADEV	ADEV	O. Penaud	O.Pe	T. Tournebize	T.T ou PNR
Equipe de CEBAS	CEBAS	O. Penard	O.Pn	M. Tuteau	M.T
Equipe de Chanteloup	ONC	J. Pellerin	J.P	C. Vallin	C.V
Equipe de LPO	LPO	D. Perrocheau	D.P	P. Yesou	P.Y
Equipe du Parc Nat RegPNR		B. Perrotin	B.P	T. You	T.Y

PLONGEON CATMARIN (*Gavia stellata*)

(15)

2 données d'hiver de St Gilles et de l'île de Noirmoutier et 1 donnée du printemps de l'île d'Yeu pour 89-90

1 ind Ile d'Yeu (Ker Châlon)

7/4/90 (X.H)

Hivernage à partir de décembre 90 à février 91 : 12 données du littoral de St Gilles à la Terrière

Jul	Aôu	Sep	Oct	Nov	Déc	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Jun	N°
					+							1126.7-8
					++	++						1127.3-4
						++						1127.7-8
					+	++	+					1227.5-6
					+							1228.3-4

Cycle de présence de *Gavia stellata*

28 ind Plage de Sauveterre

9/12/90 (D.P)

18 ind la Chaume (phare de l'Armandèche)

27/1/91 (D.P)

20 ind Brem-s-mer (la Gachère)

27/1/91 (D.P)

PLONGEON ARCTIQUE (*Gavia arctica*)

(6)

1 ind Ile de Noirmoutier (la Blanche)

21/1/90 (P.R)

90-91 : 2 observations en décembre 90, 1 en janvier 91, 1 en février 91 et 1 en mars 91, toutes du littoral et concernant de 1 à 3 ind

Jul	Aôu	Sep	Oct	Nov	Déc	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Jun	N°
					+	+	+					1126.7-8
					+							1127.7-8
					+							1226.7-8
								+				1328.7-8

Cycle de présence de *Gavia arctica*

3 ind la Chaume (la côte)

18/12/90 (C.F)

1 ind Parc ostréicole de l'Aiguillon

8/3/91 (J.R)

PLONGEON IMBRIN (*Gavia immer*)

(12)

2 observations d'un ind à l'île d'Yeu

de 7/4 et 12/4/90 (X.H)

Hivernage 90/91 à partir du 17 novembre jusqu'au 27 janvier : 10 données, toutes obtenues au littoral des Sables d'Olonne et concernant de 1 à 12 ind

12 ind Plage de Sauveterre

9/12/90 (D.P)

8 ind Phare de l'Armandèche

27/1/91 (D.P)

GREBE CASTAGNEUX (*Tachybaptus ruficollis*)

(77)

89-90 : Hivernage surtout noté au nord du littoral de la Vendée (maxi 20 ind le 16/1) et sur tous les étangs bocagers avec 1 à 4 ind au maxi et pas de données de nidification pour 89-90

90-91 : 2 données de présence de juvéniles au lagunage de Luçon et pas de données pour effectif important en période postnuptiale

Hivernage noté sur le nord et le centre du littoral et sur tous les étangs bocagers avec de faibles effectifs (maxi : 18 ind aux Sables le 21/1)

Nidification certaine pour : 1325.3-4, 1428.1-2 et 1527.5-6

Nidification possible pour : 1126.1-2

C'est peu pour une espèce commune et nicheuse régulière sur les étangs bocagers.

2 cples (+1 nid) Lagunage de Chaillé les Marais 19/5/91 (PNR)

2 pullis non volants Bretet (St Hilaire des Loges) 16/6/91 (G.B)

6 cples nich Etang des Boucheries 26/6/91 (L.G)

GREBE HUPPE (*Podiceps cristatus*)

(115)

89-90 : Hivernage sur tout le littoral et sur tous les étangs bocagers (maxi 37 le 21/1 à l'étang des Boucheries)

Premières parades le 15/2 sur l'étang d'Asson et 6 données de nidification sur les étangs bocagers

90-91 : Pas d'effectifs importants en période postnuptiale et hivernage sur tout le littoral (maxi: 42 ind la Gachère le 27/1) et sur les étangs bocagers (effectif maxi 14 à 20 ind)

Nidification : seulement 3 données pour 1325.3-4 (Etangs des Boucheries et de la Rairie)

Très peu si on compare avec l'atlas de 1982 pour 7 cartes

GREBE JOUGRIS (*Podiceps griseigena*)

(7)

Hivernage de 1 à 2 ind du 7 janvier au 26 février 90 aux Sables d'Olonne (6 données)

90-91 : Une seule donnée d'un ind au marais de Bouin le 12/3 (J.R)

GREBE A COU NOIR (*Podiceps nigricollis*)

(20)

1 ind Réserve de Chanteloup

2 ind Etang des Boucheries 5/8/89 (ONC)

29/4/90 (Y.R)

Automne : 6 données : de 1 à 3 ind au marais d'Olonne du 22 au 29/8, 1 ad le 5/9 au lagunage de Luçon, 1 ind le 1/10 au Moulin Papon et un autre au lac de Sigournais le 29/10

Hivernage de 1 à 2 ind du 27/11 au 22/2 aux Sables d'Olonne (6 données) et un autre à la lagune de la belle Henriette le 24/2

Pas de nidification signalée, mais 4 données de 1 à 3 ind du 23/3 au 26/6 sur l'étang des Boucheries et 1 donnée d'un ind de 6/4 au lagunage de l'Herbaudière, serait-il possible de le voir nicher en 1992 sur l'étang des Boucheries ou ailleurs? Restons vigilants pour cette espèce.

PETREL FULMAR (*Fulmarus glaciaris*)

(7)

Une seule donnée du printemps: 2 ind au large des Sables (sortie Kifanlo) 25/5/90 (D.D)
Observé uniquement en août et en septembre au large des Sables d'Olonne et de l'île d'Yeu à

l'exception de janvier 91 (2 cadavres le 1/1/91 plage des Sables (D.D))

1 observation d'un ind à l'île d'Yeu le 15/8 et 4 observations de 2 à 6 ind au large des Sables (sortie Kifanlo) du 22/8 au 23/9

PUFFIN CENDRE (*Calonectris diomedea*)

(1)

1 ind Pointe de Grosse Terre (St Gilles)

6/6/90 (G.B)

PUFFIN DES ANGLAIS (*Puffinus puffinus*)

(2)

La forme type (*puffinus puffinus*) qui niche dans les îles britanniques (la majeure partie de l'effectif mondial) est très fréquente sur notre côte mais uniquement en juillet et en août.

2 observations de 1 et 2 ind au large des Sables (sortie Kifanlo) des 25 et 27/5/90 (D.D) (les seules données du printemps au fichier)

PUFFIN DES BALEARES (*Puffinus puffinus mauretanicus*)

(3)

En automne, il va jusque dans le Nord de l'Atlantique et niche aux Baléares

2 données de passage pré-nuptial de St Gilles pour +25 ind le 6/6 et 6 ind le 12/6/90 (G.B)

1 donnée de passage pré-nuptial de St Gilles pour 5 ou 6 ind le 6/6/91 (G.B)

PUFFIN DE MEDITERRANEE (*Puffinus puffinus yelkouan*)

(19)

50 env les Sables (sortie Kifanlo)

27/5/90 (D.P)

Régulièrement observé au large des Sables d'Olonne, de St Gilles, de l'île d'Yeu et de Noirmoutier à partir du 2/7 au 13/10, l'effectif varie de 2 à 500 ind, un ou plusieurs dortoirs sont localisés entre St Gilles et les Sables.

+ 100 ind le 13/7, 350-400 ind le 22/8, 500 ind le 9/9 et 350-400 ind le 23/9 les Sables (sortie Kifanlo) (D.P)

OCEANITE TEMPETE (*Hydrobates pelagicus*)

(16)

8 observations de 1 à 20 ind de 6/6 au 24/6/90 à St Gilles (Pte de Grosse Terre) (G.B)

Il a été observé du 2/7 au 23/9 à St Gilles (3 données), à l'île d'Yeu (1 donnée) et au large des Sables (4 données)

40 contacts St Gilles (pte de Grosse Terre)

2/7/90 (G.B)

± 25-30 Ile d'Yeu

18/8/90 (X.H)

20-25 les Sables (sortie Kifanlo)

22/8/90 (D.P)

OCEANITE CULBLANC (*Oceanodroma leucorhoa*)

(1)

3 ind la Chaume (la gde Jetée)

27/10/90 (D.P)

FOU DE BASSAN (*Sula bassana*)

(40)

89-90 : 7 observations à l'île de Noirmoutier, à l'île d'Yeu et à St Gilles en passage pré-nuptial du 1/4 au 12/4 concernant un total de 34 ind. Des immatures ont été observés à partir du 25/5 souvent par groupes de 10 à 20 (maxi +35 dont 5 adultes à St Gilles le 6/6 (G.B))

90-91 : Des fous ont été observés toute l'année surtout sur le littoral du nord de la Vendée : 15 données pour St Gilles (maxi 30 ind le 12/10 G.B) et 1 donnée pour l'île d'Yeu (1 à 10), les autres données sont dues aux sorties de Kifanlo de 13/7 au 9/9 : 50-60 ind le 22/8 et 80-90 ind le 23/9, et une observation d'un ind à la Pte de l'Aiguillon le 16/9.

Seulement 3 données de printemps concernant de 1 à 20 ind toujours à St Gilles, du 29/3 au 16/5




Figure 1 Histogramme des données de *Sula bassana* sur les côtes de Vendée.

GRAND CORMORAN (*Phalacrocorax carbo*)

(201)

Observé surtout le 1er semestre 90 sur le littoral et à l'intérieur des terres et 56 ind le 8/1 à l'étang de la Sablière, 41 ind le 21/1 et 58 ind le 15/2 à l'étang des Boucheries et 37 ind à l'étang du Parc de Soubise

90-91 : Présent toute l'année sur le littoral et à l'intérieur des terres avec quelques données de grosses concentrations : 60 ind au lac de Chassenon le Bourg, + 150 ind à la Pte d'Aiguillon surtout l'hiver, 100 ind au marais de la Vie (St Hilaire) du 17/11 au 23/12 et 588 ind à la réserve de Chanteloup le 21/11.




Figure 2 Histogramme des données de *Phalacrocorax carbo* en Vendée

CORMORAN HUPPE (*Phalacrocorax aristotelis*)

(6)

89-90 : 1 donnée d'un immature à l'île de Noirmoutier le 21/1. et 3 données d'un ind à l'île d'Yeu du 7/4 au 13/5 (1 ères données du printemps pour le fichier).

90-91 : 2 données de 1 à 3 ind à l'île d'Yeu le 20/8 (X.H) (les seules données de fin d'été pour le fichier)

PELICAN GRIS AFRICAIN (*Pelecanus rufescens*)

1 ind Réserve de Chanteloup

30/4/90 (ONC Chanteloup)

PELICAN BLANC (*Pelecanus onocrotalus*)

(2)

Il ne se reproduit qu'en quelques points de Grèce, du littoral du Nord de la Mer Noire et de la Turquie et il hiverne dans le golfe persique, en Mer Rouge et dans la Vallée du Nil.

Principales périodes de migration : Mars-Avril, puis Septembre-Octobre

Le Pélican blanc peut être confondu avec le Pélican africain qui remonte en Europe de l'est et de l'ouest. On reste prudent sur l'interprétation. La synthèse sur ces deux espèces est en cours d'analyse. (com pers de P. Yésou).

1 ind Gué de Velluire le --/8/90 et 1 ind (le même) à la Faute-s-mer (Ecluse de Brault) le 24/8/90 (R.R et T.T)

L'origine de cet oiseau est incertaine (naturelle ou échappé de captivité?)

BUTOR ETOILE (*Botaurus stellaris*)

(5)

Les données de cet oiseau sont souvent situées en hiver (hivernage ? pour le cas de l'étang des Boucheries), les autres en passage pré-nuptial en Mars-Avril. Toujours pas de données de nidification (nicheur certain pour la carte de 1125 de l'atlas nicheur en 1985).

1 ind Etang des Boucheries les 14 et 21/1/90 (L.G,S.R et B.T)
4/3/90 (G.B)
1 ind Orouet (la Gde Herse) 3/3/91 (P.F)
1 ind Orouet (la Gde Herse) 24/4/91 (A.B)
1 ind Baie de Bourgneuf (Port la Roche)

(2)

BLONGIOS NAIN (*Ixobrychus minutus*)

Toujours sur le même site d'Orouet et nicheur possible (pas de précision de nidification au fichier).

1 chanteur Orouet (la Gde Herse) 15/6/90 (G.B)
1 couple Orouet (la Gde Herse) 29/5/91 (G.B)

(23)

BIHOREAU GRIS (*Nycticorax nycticorax*)

89-90 : 1 donnée d'un ind à Nalliers le 16/3/90 (PNR) et 6 données au Poiré-s-Velluire de mai à juin. Le seul site de nidification est à Chaillé les Marais (103 cples contre 86 cples en 89 E.R-ACEDEM).

90-91 : la dernière date est le 19/8/90 et la 1ère le 4/4/91. Presque tous les observations ont été faites dans les environs du Poiré-s-Velluire et de Nalliers. Une seule donnée de la réserve de Chanteloup pour 1 ind le 1/8. L'effectif nicheur en 91 est 87 cples soit 16 cples de moins qu'en 90.

(+11)

HERON GARDEBOEUF (*Bubulcus ibis*)

1 ind à la héronnière de Chaillé

90-91 : Le 1er ind a été observé le 1/4 à Ste Radégonde des Noyers et puis il y a eu de nombreuses observations de 1 à 8 ind aux alentours de Chaillé les Marais jusqu'à novembre 91. Quant à sa nidification elle n'est pas encore prouvée malgré les milieux favorables.

(126)

AIGRETTE GARZETTE (*Egretta garzetta*)

Observée tout le 1er semestre 90 sur le littoral, dans les marais salants également, dans les étangs bocagers ; toutes les observations concernent de 2 à 8 ind. Une donnée de 25 ind au marais de St Hilaire le 17/3.

Nicheuse à la colonie mixte de Chaillé-les-Marais, 73 cples en 90 contre 61 cples en 89 (E.R-ACEDEM).

90-91 : 3 sites d'importance pour le rassemblement postnuptial : la lagune de la Belle Henriette 42 ind le 24/7/90, le marais de la Vie (St Hilaire) 142 ind le 2/8/90 et le marais salant de Champagné 31 ind le 3/6/91. L'hivernage est principalement situé sur le littoral et dans les marais salants, occasionnellement sur les étangs des Boucheries et de la Sablière, concernant 1 à 10 ind au plus. 50 couples ont niché en 91 (soit 23 cples de moins qu'en 90).

GRANDE AIGRETTE (*Egretta alba*) (3)

La 1ère Grande Aigrette a été observée dans le marais salant de Champagné le 29/3/81 (L.G) et par la suite l'hivernage a été régulier chaque année, concernant souvent un seul ind ou quelquefois deux.

1 ind au communal du Poiré-s-Velluire 8/2/90 (D.C et C.Gn)
2 données d'un ind au marais salant de Champagné 25 et 27/2/91 (S.D)

HERON CENDRE (*Ardea cinerea*) (130)

Commun et très visible partout: les héronnières du Marais Poitevin ont été recensées par la Garderie départementale de la Chasse (ONC, ADEV, ACEDEM, Club Nature de Nalliers et PNR). Estimation des hérons cendrés nicheurs du Marais Poitevin:

941 en 1990, 733 en 1991

12 nids occupés Etang de la Rairie (N.P), 20 nids à St Hilaire de Riez (G.B) et 189 nids à la héronnière de Chaillé (E.R-ACEDM).

90-91 : 2 héronnières recensées: +30 nids à l'étang de la Rairie (N.P) et 145 cples à Chaillé les marais (E.R-ACEDM)

HERON POURPRE (*Ardea purpurea*) (29)

1er semestre 90:

1er oiseau observé à Nalliers le 24/3 (PNR)

12 données pour Nalliers et le Poiré-s-Velluire concernant 1 à 3 ind.

2 autres données de 1 ind à St Hilaire de Riez le 12/4 (G.B) et à Chaillé sous les Ormeaux le 15/5 (J.R).

2 données de nidification à Nalliers.

Nalliers 1-2 couples en 90 contre 21 nids en 89

Chaillé-les-marais 55 couples en 90 contre 73 nids en 89

Cette baisse d'effectif est due à la modification du milieu ou au dérangement par les travaux hydro-agricoles.

90-91:

Départ de l'oiseau à la 2ème décade de Septembre. Arrivée le 11/4.

Une seule donnée de nidification à Chaillé-les-marais pour 31 cples (soit 42 cples de moins qu'en 1989).

Estimation de la population totale de hérons pourprés nicheurs du Marais Poitevin:

89 en 1990, 65 en 1991

CIGOGNE BLANCHE (*Ciconia ciconia*) (24)

89-90 : Après la destruction par plombs de la femelle le 8 Octobre 1989 à Saint-Denis-du-

Payré, un couple a pu se reconstituer et a donné 3 jeunes.

Deux données hors de Saint-Denis-du-Payré: un ind au communal de Lairoux le 24/1/90 (Equipe du P.N.R) et 1 ind au marais d'Olonne le 30/4/90 (ONC de Chanteloup).

90-91 : Action d'EDF en faveur des cigognes blanches en implantant des plates-formes de nidification dans les marais communaux du Marais Poitevin et du Marais Breton.

2 données d'Août d'un ind à St Denis et à Morigq. Le retour à St Denis le 24/2/91 (S.D)

Stationnement printanier d'un ind au communal du Poiré-s-Velluire du 23 Mars au 8 Avril

Parades d'un couple à proximité d'une plate-forme à Sallertaine le 25/5, mais non revu (P.R)

Jul	Aoû	Sep	Oct	Nov	Déc	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Jun	N°
									+			1125.1-2
										+		1125.7-8
									+			1225.7-8
	++						+	+	++c	c	+	1328.1-2
								+	+			1328.3-4
											+	1328.5-6
								+	++			1428.1-2

Cycle de présence de *Ciconia ciconia* en Vendée
(avec indices de nidification)

2 ind Communal des Magnils-Regniers

9/4/91 (Girard-EDF)

1 ind Communal d'Angles

12/4/91 (R.R et T.T-PNR)

1 ind (vol) Bouin

14/4/91 (Sortie du GOV)

2 ind Communal de Nalliers

15/4/91 (R.R et T.T-PNR)

2 ind Palluau (la Naulière)

27 et 28/4/91 (L.G)

2 ind Communal de St Benoist et 2 autres oiseaux Communal de Lairoux

6/6/91 (P.R)

CIGOGNE NOIRE (*Ciconia nigra*) (4)

Pas de données au premier semestre 90, au fichier. Il n'y a pratiquement pas de données pour les passages pré-nuptiaux. Le site de nidification le plus proche de chez nous est la région forestière angevine.

90-91 : Passage régulier en août et en septembre

1 imm Héronnière de Chaillé les marais (arrivée crépusculaire et se pose) le 21/7 (D.D)

2 imm Orouet (la Grande Herse) les 29 et 28/8 (G.B)

1 ind (en vol) Réserve de Chanteloup le 9/9 (ONC)

IBIS SACRE (*Treskiornis aethiopicus*) (1)

Echappé de captivité?: 1 ind Marais intérieur de Noirmoutier

le 24/3 (A.B)

SPATULE BLANCHE (*Platalea leucorodia*) (70)

37 données pour la réserve de Chanteloup du 3 janvier au 14 mai !...avec l'hivernage de 1 à 2 ind à Chanteloup.

13 ad et imm le 3/3 (G.B), 11 le 6/4 ,18 le 15/4 ,10 le 14/5 à la réserve de Chanteloup (ONC)
 1 ind aux Agaures 5/5 (D.D)
 2 ind le 11/5 et 1 ind le 11/6 Réserve de St Denis du Payré (ADEV)

90-91 : Passages postnuptiaux de 19 ind à la Pte de l'Aiguillon le 15/9 (C.G et C.V), de 12 ind aux Agaures le 27/9 (D.D) et 8 données d'autres passages diffus sur les marais littoraux concernant de 1 à 5 ind, et 1 ind Etang des Boucheries le 5/11 (T.Y).
 Hivernage de 1 à 2 ind dans la région des Sables du 5 novembre au 17 janvier.
 Des passage de printemps sur les marais littoraux (9 données)




Figure 3 Histogramme des données de Platalea leucorodia en Vendée.

27 ind Réserve de Chanteloup 30/3/91 (ONC)
 5 ind Olonne (marais des Loirs) 8/5/91 (G.Bu)
 4 ind Noirmoutier (marais de l'intérieur) 8/5/91 (LPO-Anjou)
 3 ind Noirmoutier (marais de l'intérieur) 9/5/91 (T.G)
 5 ind Olonne (marais des Loirs) 10/5/91 (G.Bu)
 3 ind Olonne (marais) 1/6/91 (P.B)

FLAMANT DU CHILI (Phoenicopterus r. chilensis) (4)

Echappé de captivité,
 1 ind Réserve de Chanteloup du 25/5 au 27/5 ONC et D.D
 1 ind Marais de la Guittière 3/6 L.G

FLAMANT ROSE (Phoenicopterus ruber) (1)

1 ind au Lac du Moulin Papon le 10/9 (S.C)

CYGNE TUBERCULE (Cygnus olor) (106)

1er semestre 90: Nicheur commun dans le Marais Poitevin, aucune donnée sur les étangs bocagers.
 Rassemblements du printemps; 49 ind au canal de la Rabatelière 22/1 (PNR), 32 ind au communal de Lairoux le 20/3 (H.D), 68 ind le 11/5 et 51 ind le 11/6 réserve de St Denis du Payré (ADEV).

90-91 : Site de rassemblement traditionnel à la lagune de la Belle Henriette du 11/7 au 1/11 concernant de 11 à 36 ind (faible effectif numérique par rapport aux autres années).

CYGNE SAUVAGE OU CHANTEUR (Cygnus cygnus) (1)

1 ind Marais de Noirmoutier 1/11/90 (A.B)

OIE A BEC COURT (Anser brachyrhynchus) (1)

1 ind St Denis du Payré (réserve) 3/5/90 (H.D-ADEV)

OIE RIEUSE (Anser albifrons) (3)

1 ind Plan d'eau de Luçon 3/11 (A.T et A.L (Pithiviers))
 1 ind Baie de l'Aiguillon et 1 autre Réserve de St Denis 16/1 (ONC)

OIE CENDREE (Anser anser) (110)

Hivernage 89-90 : malheureusement, il n'y a pas de données d'hivernage concernant la baie de l'Aiguillon. L'effectif hivernant pour ce site varie d'une année à l'autre (200 à 500 ind). Un autre site d'hivernage à la réserve de St Denis du Payré pour 277 ind le 14/1 (H.D-ADEV)

38 données concernant les passages pré-nuptiaux sur tout le département :
 +100 ind (en vol) Chassenon 10/2 (G.B)
 175 ind Communal du Poiré-s-Velluire 17/2 (C.Gn)
 5-600 ind Mouzeuil-st-Martin 24/2 (J-C.L)
 106 ind St Denis du Payré (réserve) 12/4 (A.D.E.V)

Nidification : 8 oisons Réserve de St Denis du Payré en Avril 90 (H.D-ADEV)

Jul	Aoû	Sep	Oct	Nov	Déc	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Jun	N°
			+	+		+						1126.7-8
			+				+					1227.5-6
												1325.7-8
						+						1328.1-2
+++	+++	+	+	+	+	+	+++	cc+	+++	+++	+++	1328.3-4
			++	+		+	+	+				1328.7-8
			+				+					1425.5-6
				+								1426.1-2
								+				1427.1-2
							+	+				1427.3-4
							+	+				1427.5-6
			+									1427.7-8
				++			+++	+++				1428.1-2
			+				+++	++				1428.3-4
								+				1527.5-6

Cycle de présence d'Anser anser en Vendée (avec indices de nidification)

Dans ce tableau au cours de l'année 90-91, on peut constater deux passages d'automne (octobre

à novembre) et de printemps (février à mars), l'hivernage de décembre à janvier et enfin la nidification en février et en mars (réserve de St Denis du Payré).

Premier passage d'automne:	
80-100 ind l'Hermenault	22/10 (P.B)
195 ind Pointe de l'Aiguillon	23/10 (B.P)
254 ind (en 7 vols) les Sables d'Olonne	23/10 (D.D)
± 250 ind l'Ile d'Olonne	24/10 (D.D)

Hivernage :	
162 ind Baie de l'Aiguillon	16/1 (ONC)
217 ind Réserve de St Denis	16/1 (ONC)

Passage de Printemps :	
500 ind Baie de l'Aiguillon	16/2 (C. et J. Gn)
331 ind Communal du Poiré-s-Velluire	19/2 (C. Gn)
280 (3 vols) Poiré-s-Velluire	25/2 (D. C)
142 ind Vouvant	3/3 (P. B)

Nidification à la réserve de St Denis : 31 oisons pour 7 nids (ADEV)

OIE A TETE BARREE (*Anser indicus*) (5)

5 données d'un ind à la réserve de St Denis du Payré du 6 Avril au 11 juin 90. Peut-être échappée de captivité mais introduite depuis quelques années en Europe, se reproduit hors de France naturellement. Peut donc être observée en France à l'état sauvage.

BERNACHE CRAVANT (*Branta bernicla*) (31)

Principal site d'hivernage pour la Vendée : la baie de Bourgneuf

1500 ind Ile de Noirmoutier	16/1 (J.P)
-----------------------------	------------

90-91: 1ère date d'observation le 16/9 (CEBAS de Beauvoir/Niort) et la dernière le 6/4 (A.B).

Résultat du comptage BIROE en 90-91 par LPO pour la baie de Bourgneuf (secteur d'hivernage le plus important): 2250 en Octobre, 3700 en Novembre, 5450 en Janvier, 5602 en Février, 4860 en Mars.

Pour la baie de l'Aiguillon et la côte voisine qui constituent une zone d'hivernage d'importance moindre:

+ 650 ind Port de Jard-s-mer (abri de tempête)	25/12 (P.R)
450 ind Baie de l'Aiguillon	16/1 (ONC)
1500 ind Baie de l'Aiguillon	16/2 (C. Gn)
± 2000 ind Baie de l'Aiguillon	4/3 (S.D)

TADORNE CASARCA (*Tadorna ferruginea*) (4)

Espèce souvent échappée de captivité et rôdant librement ici et là, déjà observée à plusieurs reprises depuis 1988.

2 ind à l'étang des Ecluseaux (l'Ile d'Elle) les 19 et 21/8 (A.T et A.L) et 2 ind en baie de l'Aiguillon 19/9 (ONC) et 29/9 (C.V et C.Gn).

TADORNE HYBRIDE CASARCA x BELON

1 ind Pointe d'Arçay	14/3 (ONC)
----------------------	------------

TADORNE DE BELON (*Tadorna tadorna*) (43)

Hivernage important et régulier dans les baies de Bourgneuf et de l'Aiguillon : 1670 ind pour la baie de Bourgneuf (LPO) en Janvier.

3 données d'intérieur concernant 1 à 2 ind au communal du Poiré-s-Velluire de 26/2 au 11/3 (C.Gn, D.C et PNR).

Nidification certaine pour la lagune de la Belle Henriette (1 à 3 cples) C.Gn et H.D et St Michel en l'Herm (2 à 4 cples) C.Gn.

En 1990-91 :	
245 ind Réserve de Chanteloup	27/11 (ONC)
5070 ind Baie de l'Aiguillon	16/1 (ONC)
591 ind Baie de Bourgneuf	19/1 (C.Gn)
± 1000 ind Baie de l'Aiguillon	23/2 (S.D)
+ 500 ind Baie de l'Aiguillon	9/3 (S.D)

11 données d'intérieur : 2 ind au communal du Poiré-s-Velluire du 17/2 au 28/3 (C.Gn, P.B, et D.C), 1 ind au communal de Lairoux le 2/3 (P.R), 1 mâle Etang des Boucheries le 30/3 et 1 couple au lagunage de Chaillé les marais le 30/4 (PNR).

Pas de données de nidification en 91, il se peut que les tadornes nichaient encore dans les sites habituels: Lagune de la Belle Henriette, St Michel en l'Herm et aussi à la Guittière (?).

AIX CAROLIN (*Aix sponsa*) (1)

Espèce échappée de captivité	
1 mâle St Gilles (marais du Pisset)	3/9 (G.B)

AIX MANDARIN (*Aix mandarin*) (2)

Encore une espèce échappée de captivité (la Vendée, c'est la Terre d'accueil !...)	
1 mâle Etang du Parc Soubise	19/10 et 26/10 (T. Y)

CANARD SIFFLEUR (*Anas penelope*) (44)

Hivernage sur tout le littoral, les étangs et également les marais communaux non chassés comme St Denis et le Poiré-s-Velluire.

74 ind le 7/1 (C. Gn), 170 ind le 17/2 et 106 ind le 14/3 (ADEV) Réserve de St Denis.
5 à 10 ind du 21/1 au 15/2 (B.T, N.P et Y.R) et 1 fem le 9/4 Etang des Boucheries (N.P).

90-91 :	
Baie de l'Aiguillon : 250 le 16/1 (ONC) et 250 le 16/2 (C. Gn).	
Réserve de St Denis : 684 le 18/12, 106 le 16/1, 264 le 15/3, 38 le 17/4 et 2 le 14/6 (ADEV et ONC).	
Etang des Boucheries : 2 à 7 ind du 3/2 au 30/3.	
Communal du Poiré-s-Velluire : 2 à 5 ind du 17/2 au 21/3	

CANARD CHIPEAU (*Anas strepera*)

(52)

Hivernage concernant de 1 à 6 ind dans les étangs bocagers et la réserve de St Denis.
Passages pré-nuptiaux, toujours avec faible effectif (maxi 13 ind Réserve de St Denis le 14/3 ADEV) sur tous les plans d'eau.
Pas d'indices de reproduction, malgré la présence de 1 ind Réserve de St Denis le 11/5 (ADEV) et 1 mâle au lagunage de l'Epine le 20/5 (A.B).

90-91 : Hivernage en faible effectif sur tout le littoral et les plans d'eau :
16 ind Baie de Bourgneuf le 19/1 (C.Gn), 10 ind Croix de Vie le 9/2 (G.B).
Passages pré-nuptiaux : 6 ind au communal des Magnils le 22/2 (P.M), 10 ind au communal du Poiré le 23/2 (C.Gn), 6 à 14 ind Etang des Boucheries du 27/2 au 30/3 P.B et L.G, et 27 ind Réserve de St Denis le 15/3 ADEV.

Pas d'indices de reproduction, mais l'espèce est présente à l'Etang des Boucheries (2 ind le 28/4 et 1 fem le 9/6 L.G) et à la réserve de St Denis (3 ind le 16/5 et 2 ind le 14/6 ADEV).

SARCELLE D'HIVER (*Anas crecca*)

(117)

Principaux sites d'hivernage: la baie de Bourgneuf, de l'Aiguillon et la réserve de St Denis du Payré (670 ind le 17/1/90 ADEV).

Hiver 90-91 : Baie de l'Aiguillon (860 ind) et réserve de St Denis (654 ind) en Janvier.
Nicheur isolé localisé dans les marais, et les étangs, malgré l'absence d'indices de reproduction. Il n'y a pas de reproduction pour la réserve de St Denis en 1991 (ADEV).

CANARD COLVERT (*Anas platyrhynchos*)

(239)

Hivernage en effectif important sur le littoral non chassé. Le dénombrement BIRROE en janvier 90 donne 5072 ind (sans la baie de l'Aiguillon ni la Pointe d'Arçay) dont 4220 ind Baie de Bourgneuf (LPO) et 852 ind pour les étangs du bocage.

Pour l'hiver 90-91, le résultat du comptage donne 5870 ind (sans la baie de Bourgneuf) dont 2280 pour la baie de l'Aiguillon (ONC) et 249 ind pour les étangs du bocage.

Rassemblement post-nuptial important :

Réserve de St Denis : 340 ind le 20/7, et 400 le 10/8 (ADEV)

± 250 ind Etang des Ecluseaux le 19/8 (A.T et A.L)

± 500 Etang de Soubise le 5/9 (T.Y)

± 450 Etang Neuf le 29/9 (T.Y)

310 ind au lac de Mervent le 10/10 (P.B).

Nidification surtout notée au voisinage des étangs bocagers et dans le Marais Poitevin.

CANARD PILET (*Anas acuta*)

(59)

Rassemblements pré-nuptiaux

1er semestre 90 : 73 ind réserve de St Denis le 17/2 (ADEV), 120 ind marais d'Olonne le 27/2 (G.Bu), 57 ind communal de Lairoux le 10/3 (C.Gn).

En 1991 : 158 ind marais de Champagné les marais le 24/2 (C.Gn), ± 400 communal de Lairoux le 2/3 (P.Rouillier), 2820 ind réserve de St Denis le 15/3 (ADEV).

Aucune donnée de nidification pour les deux années.

Hiver 90-91 : 200 ind réserve d'Olonne le 22/12 (G.B), 525 ind baie de l'Aiguillon le 16/1 (ONC) et ± 1500 ind baie de l'Aiguillon le 16/2 (C.Gn).

SARCELLE D'ETE (*Anas querquedula*)

(87)

En 1990, les lères notées (73 ind) à la réserve de St Denis du Payré le 17/2 (ADEV) et les passages de Printemps : 120 ind au marais d'Olonne le 27/2 (G.Bu) et 57 ind au communal de Lairoux le 10/3 (C.Gn).

En 1991, les lères notées (10 ind) à l'étang de la Rainsandière le 11/2 (B.P) et 4 ind à la réserve de St Denis le 21/2 (C.V).

Sur les marais et les étangs, les passages de printemps concernant de petits effectifs variant de 2 à 15 ind sont souvent notés en Mars, Avril et Mai.

Jul	Aoû	Sep	Oct	Nov	Déc	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Jun	N°
									+			1124.5-6
								+				1124.7-8
									+			1125.1-2
									+			1125.7-8
+								+	+	++	c	1126.1-2
								+	+++	++	ppp	1126.3-4
	+									++	+	1226.1-2
								+		++	+	1325.3-4
								++	+	+++	++	1328.3-4
											+	1328.5-6
								+	+	+++	+	1428.1-2
	+											1428.5-6

Cycle de présence d'*Anas querquedula* en Vendée
(avec indices de nidification)

Les quelques nicheurs sont signalés à la réserve de St Denis et au communal du Poiré-s-Velluire et également ailleurs dans les étangs du bocage et les marais du Nord de la Vendée malgré l'absence de données sur ces sites au fichier.

SARCELLE SOUCROUCOU (*Anas discors*)

(1)

2ème donnée de l'espèce originaire du Nord de l'Amérique pour le fichier (Rappelons qu'un mâle a été observé à Noirmoutier le 13/5/88 par Vincent Ridoux)
1 mâle St Hilaire (marais de la Vie) 11/4/90 (G.B)

CANARD SOUCHET (*Anas clypeata*)

(125)

En 1990, stationnements pré-nuptiaux un peu partout sur les étangs et le marais sans gros effectifs. Le nombre varie de 10 à 50 ind; seule la réserve d'Olonne a 120 ind le 26/2 (G.Bu).

En période de reproduction, quelques couples sont signalés à St Hilaire (marais de la Vie), au lagunage de l'Epine et sur quelques étangs du bocage, le fichier ne peut pas préciser leur statut de nicheur faute des données de reproduction.

En 1991, les stationnements sont identiques à ceux de 1990, à part pour la réserve de St Denis avec 386 ind le 15/3 (ADEV).
4 données comme nicheur possible ou probable pour les marais de Sallertaine, de Beauvoir, de St Hilaire de Vie et la réserve de St Denis du Payré.

NETTE ROUSSE (*Netta rufina*)

(1)

1 cpl Réserve de Chanteloup

le 13/3/90 (ONC)

FULIGULE MILOUIN (*Aythya ferina*)

(72)

Présent sur l'ensemble des étangs, des lacs et des stations d'épuration mais seulement 2 données pour le littoral. Nicheur régulier à l'étang des Boucheries.
170 ind le 14/1 (L.G et S.R), 188 ind le 21/1 (B.T), 210 ind le 9/2 (N.P) et 230 le 15/2 (Y.R et N.P) à l'étang des Boucheries

200 ind Lagunage de Noirmoutier

16/1 (J.P)

Pour 1990-91, l'étang des Boucheries (16 données) a accueilli 50 à 60 ind en moyenne (le seul maxi: 85 ind le 15/11 S.C).

1 mâle et 2 femelles Réserve de St Denis

le 4/3 (N.P)

FULIGULE NYROCA (*Aythya nyroca*)

(2)

1 mâle Etang des Boucheries

les 17 et 22/5 (P.B)

FULIGULE MORILLON (*Aythya fuligula*)

(22)

1er semestre 90:

3 à 8 ind Etang des Boucheries jusqu'au 22/5.

1 cpl Lac de Chassenon

1 fem Etang de la Rainsandière

4 m, 1 f Lac du Moulin Papon

10/2 (G.B)

25/2 (B.P)

15/3 (S.C)

1990-91 :

1 à 7 ind Etang des Boucheries

10 ind Etang de la Rebillière

5 ind Lagunage de Noirmoutier

du 6/7 au 30/3

2/2 (D.P)

24/2 (T.G)

Pas de données de nidification pour ces deux années malgré la présence de 2 mâles et 1 femelle à l'étang des Boucheries le 22/5/90.

FULIGULE MILOUINAN (*Aythya marila*)

(7)

Présent surtout sur le littoral et moins souvent sur les plans d'eau d'intérieur.

1 fem ou imm les Sables (bassin des Chasses)

26/10 (D.D)

2 ind Olonne (plage de Sauveterre)

6/2 (D.P)

1 m, 4 f le 9/2 et 3 fem le 10/2 Port de Croix de Vie (G.B)
10 env Lagune du Dain
2 fem les Sables (la Vertonne)
1 mâle Pointe de l'Aiguillon

20/2 (J.R)
22/2 (G-L.C)
25/2 (A.T et A.L)

(18)

EIDER A DUVET (*Somateria mollissima*)

1990:

1 mâle Ile de Noirmoutier (le Vieil)

114 (73 m) Ile de Noirmoutier (le Vieil)

3 m, 4 f Pointe d'Arçay

16/1 (J.P)
21/05 (A.B)
24/05 (J.D et D.P)

1990-91 :

9 données concernant de 3 à 7 ind à la Pointe de l'Aiguillon du 1/8 au 23/9

1 ind Grande Jetée de la Chaume

21 mâles Ile de Noirmoutier (la Madeleine)

3 ind Olonne (plage de Sauveterre)

1 mâle Plage de la Terrière (plage)

9 ind le 22/2 T.Y et 12 ind le 6/3 N.P Pointe du Grouin du Cou

15/09 (D.P)
15/09 (G.B)
15/12 (D.P)
16/12 (C.F (C.O.R.A))

(6)

HARELDE DE MIQUELON (*Glaucula hyemalis*)

1 m, 2 f Lagune du Dain
8 ind Brem-s-mer (la Gachère)

14/12 (J.R)
27/01 (D.P)

(45)

MACREUSE NOIRE (*Melanitta nigra*)

Commune en hiver sur le littoral, souvent avec de gros effectifs, surtout en fin d'hiver.

1er semestre 90 :

+200 ind St Gilles (plage des Marines)

1377 ind la Terrière (plage)

500 ind Pointe du Grouin du Cou

+150 ind le Jaunay

1 ind le 30/04 (C.V), et toujours 1 ind les 14 et 17/05 Pointe de l'Aiguillon (S.D).

07/01 (G.B)
21/01 (C.Gn)
04/02 (C.V)
04/03 (G.B)

1990-91 :

Jul	Aoû	Sep	Oct	Nov	Déc	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Jun	N°
			+				+++	+				1126.1-2
			++			+	+++	+				1126.7-8
		+				+	+					1127.3-4
							+	+				1227.5-6
								+				1228.3-4
					++							1328.1-2
				+								1328.7-8

Cycle de présence de la Macreuse noire sur les côtes vendéennes

Dans ce tableau, les données sont principalement situées de fin Décembre à début Mars.

+ 1000 ind Longeville 25/12 (P.R)
± 3400 ind Pointe du Grouin du Cou 06/03 (N.P)

MACREUSE BRUNE (*Melanitta fusca*) (4)

6 ind St Gilles (les 5 Pineaux) 18/03/90 (G.B)
12 ind Longeville (plage du Rocher) 17/12/90 (C.F (C.O.R.A))
+ 2 ind Longeville 25/12/90 (P.R)
1 mâle Olonne (plage de Sauveterre) 12/01/91 (D.D)

GARROT A OEIL D'OR (*Bucephala clangula*) (24)

1 f ou imm Lagune de Bouin 10/02/90 (D.D)
1 fem Baie de l'Aiguillon 24/02/90 (A.T et A.L)

1990-91 :

1 donnée de Décembre pour 2 ind en Baie de l'Aiguillon le 18/12 (ONC)
20 données de Février et de Mars :
1 à 4 fem Croix de Vie du 08/02 au 12/02
8 fem Lagunage de Barbâtre 24/02 (T.G)
1 à 2 ind Lagune de la Belle Henriette du 03/03 au 08/03
1 à 3 ind Etang des Boucheries du 03/03 au 17/04
1 donnée d'avril pour 1 fem à l'étang des Boucheries le 17/04 (L.G)

HARLE PIETTE (*Mergus albellus*) (2)

1 mâle Réserve de Chanteloup 12/02/90 (ONC)
1 fem Croix-de-Vie (au port) 09/02/91 (G.B)

HARLE HUPPE (*Mergus serrator*) (14)

Surtout observé sur le littoral du Nord de la Vendée

23 ind Ile de Noirmoutier 16/01/90 (J.P)
2 mâles le 9/2 et 1 femelle le 13/2/90 Lagune de Dain (J.R)
1 fem St Gilles (les 5 Pineaux) 07/04/90 (G.B)
14 ind Olonne (plage de Sauveterre) 01/12/90 (D.P)
27 ind Ile de Noirmoutier (le Devin) 19/01/91 (C.Gn)
1 mâle Lagune de la Belle Henriette 24/04/91 (S.D)

ERISMATURE ROUSSE (*Oxyura jamaicensis*) (2)

Espèce d'Amérique du Nord, échappée de captivité et nichant librement en Grande Bretagne, d'où elle se montre en Europe de ci, de là.

1ère donnée pour le fichier, inaugurant une longue liste d'observations pour 91-92.

1 mâle Etang des Boucheries 15 et 26/6/91 (L.G)

BONDREE APIVORE (*Pernis apivorus*) (23)

L'arrivée est située fin mars et début avril :

6 ind Poiré-s-Velluire 18/3/90 (PNR)
1 ind Etang du Blanc 6/4/90 (S.C)
1 mâle paradant à Nalliers 10/4/90 (E.G)

1990-91 : 13 données de fin août à octobre correspondant aux passages postnuptiaux et 3 données de Mai pour la nidification

9 ind le 15/9, 23 ind le 16/9, et 1 ind le 23/9 Pointe de l'Aiguillon et le dernier le 25/9 à St Hilaire de Riez (G.B).

MILAN NOIR (*Milvus migrans*) (162)

Nicheur régulier dans tout le département (pas de données pour l' Ile d'Yeu) et toujours en nombre important dans les zones de marais et des lêtes littorales.

Le 1er noté le 7 février 1990 ; maximum des données en mars et avril.

12 ind Pointe d'Arçay 6/4 (P.M et J.M)
16 ind Nalliers (Puits de Bonnu) 17/7 (E.G)
+ 10 ind St Hilaire de Riez 22/7 (G.B)

Dernière observation le 17 septembre en baie de l'Aiguillon (H.P.)

2 données en novembre! 1 ind à Maillé le 3/11 (D.C) et 1 ind à Noirmoutier le 13/11 (J-P.E.)

En 1991, les 1ers sont notés le 8 mars, à Champ St Père.

20 ind décharge des Epesses 2/6 (T.Y)
49 ind décharge du Poiré-s-Vie 28/6 (A.G)

MILAN ROYAL (*Milvus milvus*) (21)

Noté surtout en automne et en hiver (comme l'illustre ce tableau) concernant souvent de 1 à 3 ind; les 2 derniers signalés le 25 avril au marais d'Olonne (ONC de Chanteloup).

Jul	Aoû	Sep	Oct	Nov	Déc	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Jun	N°
					+							1226.7-8
						+	+		+			1227.1-2
						+	+					1227.5-6
			+									1325.3-4
						+						1327.5-6
					+			+				1327.7-8
			+									1328.7-8
			+									1427.3-4
			+									1427.7-8
						+		+				1428.1-2
			+									1428.3-4

Cycle de présence du Milan royal en Vendée

CIRCAETE JEAN LE BLANC (*Circaetus gallicus*) (10)

Aucune information de nidification de cette espèce n'est parvenue au fichier; deux sites de nidification possible (région de Mortagne et de St Denis du Payré).

1 ou 2 ind régulièrement observés dans le secteur de Luçon-Triaize-St Denis du Payré-les Magnils du 30/7 au 28/8

Le dernier noté le 17 septembre 90 en baie de l'Aiguillon et le 1er, le 14 avril 91 au bois de Velluire (vol de parade) (R.R et T.T-PNR)

BUSARD DES ROSEAUX (*Circus aeruginosus*) (154)

Régulièrement observé toute l'année dans tout le département y compris l'Ile d'Yeu. Nicheur bien représenté surtout dans les zones palustres et également dans quelques étangs bocagers.

± 12 ind	Olonne (vallée de la Verdonne)	4/1 (D.D)
± 10 ind	Baie de l'Aiguillon	17/9 (H.P)
10 ad et imm	Orouet	5/10 (G.B)
4 jeunes	Réserve de St Denis	juin 91 (ADEV)

BUSARD SAINT MARTIN (*Circus cyaneus*) (71)

Observé régulièrement toute l'année, un peu partout (pas de données pour l'Ile d'Yeu) essentiellement nicheur dans la région bocagère et forestière. Peu d'indices de reproduction sont parvenus au fichier (soit une dizaine de couples) et peu non plus concernant des dortoirs hivernaux.

6 ind	en migration postnuptiale	Pointe de l'Aiguillon	16/9 (C.Gn, P.M et C.V)
5 ind	Communal de Vouillé les Marais		15/12 (C.Gn)

BUSARD CENDRE (*Circus pygargus*) (80)

1ère observation d'une femelle à Champagné les marais le 29 mars 1990 (PNR); la dernière notée d'env 50 ind le 17 septembre en baie de l'Aiguillon (H.P).

Les données de nidification proviennent en grande partie du Marais Poitevin, mais quelques cas de nidification possible ou probable à l'intérieur : Mouchamps, Montaigu, les Brouzils, Chantonay et St Martin des Noyers (indice de nidification sur ce dernier (A.G)).

1 couple	Ile d'Yeu	8/4 (X.H)
27 ind	Réserve de St Denis	10/8 (ADEV)
± 50 ind	Baie de l'Aiguillon	17/9 (H.P)

Depuis quelques années, le Parc Naturel Régional du Marais Poitevin poursuit ses efforts pour protéger la population nicheuse dans le Marais Poitevin.

L'estimation de la population nicheuse du Marais Poitevin en 1991 s'élève au plus à une centaine de couples. Saluons le PNR pour l'énorme effort et pensez à eux à chaque fois que vous verrez le busard cendré voler majestueusement au ras des prairies et des champs...

AUTOUR DES PALOMBES (*Accipiter gentilis*) (12)

2 indices de reproduction en 90: Forêt de Gralas et Massif forestier de Mervent-Vouvant. 1 ind Bois de la Vergne (Chassenon) 10/3 (G.B) et 1 ind Mareuil-s-Lay 11/3 (P.R).

Toujours 2 indices de reproduction en 91 : Forêt de Gralas et Massif forestier de Mervent-Vouvant.

3 données dans le massif forestier de Mervent-Vouvant en juillet, en septembre et en janvier.

EPERVIER D'EUROPE (*Accipiter nisus*) (68)

Sédentaire et nicheur commun partout dans les bois bocagers, côtiers et les forêts.

Un pic de données en avril et en mai correspond à la population nicheuse locale.

2 jeunes au nid	Bois de Velluire	28/7/90 (A.T et A.L)
6 passages de 1 à 2 ind	Pointe de l'Aiguillon	du 16/9 au 23/10
1 nid + 3 oeufs	Poiré-s-Vie	12/06/91 (A.G)

BUSE VARIABLE (*Buteo buteo*) (225)

C'est le rapace le plus visible partout avec un apport d'individus nordiques en hiver.

1er semestre 90: l'hivernage de 2 à 5 ind ou davantage est plus fréquent noté dans les communaux du marais Poitevin (25 données sur 33) que dans le bocage. En période de nidification, c'est l'inverse, l'intérieur remporte le palmarès des données.

En 1990-91 : 33 données concernant de 2 à 6 ind en dispersion nuptiale et hivernage de 2 à 5 ind principalement noté dans le marais Poitevin et la baie de l'Aiguillon.

AIGLE BOTTE (*Hieraetus pennatus*) (2)

5èmes données du fichier toujours en période de migration.

1 ind (phase sombre) Communal d'Angles 11/3 (P.R) et 1 ind sombre (probablement l'oiseau du 11/3) Pointe d'Arçay le 14/3 (ONC)

BALBUZARD PECHEUR (*Pandion haliaëtus*) (29)

En 90, une seule donnée en migration de printemps pour 1 ind Chaillé les Marais le 8/3 (PNR)

En 1990-91, souvent noté en migration postnuptiale de septembre à octobre et 1er cas d'hivernage d'un ind dans le marais d'Olonne et le marais de la Guittière jusqu'au 21 Janvier 91.

18 données concernant de 1 à 4 ind dans le marais d'Olonne du 14 août au 30 décembre 90.

1 ind	Chaillé les marais	31/8 (J-C.L)
1 ad	Etang des Boucheries	21/10 (G.P)
1 ind	Mervent	2/11 (G.B)

FAUCON CRECERELLE (*Falco tinnunculus*) (195)

Très commun et nicheur dans tout le département y compris l'Ile d'Yeu; l'hivernage est régulier dans le marais Poitevin et la baie de l'Aiguillon avec une densité importante due à l'apport d'oiseaux nordiques.

Des passages de fin d'été notés à la Pointe de l'Aiguillon totalisent plus de 80 oiseaux du 24/8 au 27/10.

FAUCON KOBEZ (*Falco vespertinus*) (1)

Toujours dans le secteur de Triaize - Chasnaix - St Denis, une seule donnée pour une femelle le 24 août 90 au communal des Magnils Reigniers (P.R)

FAUCON EMERILLON (*Falco columbarius*) (27)

Venu des pays nordiques, l'hivernage est régulier en petit nombre surtout sur le littoral avec quelques incursions à l'intérieur.

1er semestre 90: 5 données d'un ind dans le Marais Poitevin du 22/1 au 12/4 et 1 donnée d'intérieur à Sérigné le 11/4.

10 observations du 9 août 1990 au 6 avril 1991 sur le littoral et 3 observations d'intérieur pour un oiseau.

FAUCON HOBÉREAU (*Falco subbuteo*) (65)

Le 1er ind noté à Nalliers le 10 avril 1990; environ 8 couples se sont reproduits en 1990.

Dispersion des familles très nette en août et en septembre (comme l'histogramme du nombre de données nous le montre), le maximum des données en Mai correspondant aux parades et défenses de territoire.

La dernière observation le 5/10 à Orouet (G.B) et le 1er noté le 5 avril 91 à Nalliers (C.Gn), peu de couples nicheurs (à peine 10) signalés au fichier.




Figure 4 Histogramme des données de Falco subbuteo en Vendée.

FAUCON PELERIN (*Falco peregrinus*) (43)

En hivernage, il fait désormais partie du paysage dans le Marais Poitevin (notamment en baie de l'Aiguillon et au communal du Poiré-s-Velluire).

15 observations d'un ind au communal du Poiré-s-Velluire du 1 novembre 1990 au 21 mars 1991, 9 observations d'un ind en baie de l'Aiguillon du 28 septembre 1990 au 10 mars 1991, les autres observations d'un ind à la Pointe d'Arçay, à la réserve de St Denis du Payré, au communal de Lairoux et de Nalliers.

PERDRIX ROUGE (*Alectoris rufa*) (24)

Gibier de chasse massivement introduit partout;
24 données concernant 66 ind du 4/1/90 au 30/1/91

PERDRIX GRISE (*Perdix perdix*) (21)

Gibier de chasse; presque toutes les données proviennent de la grande plaine céréalière de Luçon à Benet.

21 données concernant 87 ind du 12/5/90 au 2/6/91; maxi 15-20 le 1 novembre à Auzay et 25-30 le 3 novembre à Maillé (C.Gn)

CAILLE DES BLES (*Coturnix coturnix*) (15)

Toujours signalée par des chanteurs en mai et en juin (14 données pour la plaine céréalière de Luçon à Bretet et une pour Vairé), elle disparaît à la fin d'Août.

FAISAN DE COLCHIDE (*Phasianus colchicus*) (16)

Gibier de chasse artificiellement introduit partout y compris l'Ile d'Yeu.

RALE D'EAU (*Rallus aquaticus*) (13)

1 ind Ile d'Yeu (marais de la Croix) 10/4 (X.H)
2 chanteurs les 25/5 et 15/6 à Orouet et 1 ad avec 3 pullis dans le marais de la Vie (St Hilaire) (G.B)
1990-91 : 3 observations concernant 1 adulte et 2 juvéniles à la lagune de la Belle Henriette du 19/8 au 19/9 (G-L.C et J.R)
3 chanteurs Orouet les 26 et 28/3 (G.B)
1 chanteur Etang des Boucheries 30/3 (L.G)
1 chanteur Port la Roche 24/4 (A.B)
3 ind St Hilaire (marais de la Vie) 21/6 (G.B)

RALE DES GENETS (*Crex crex*) (2)

Toujours peu noté :
1 mort écrasé le 29 septembre en migration à la Pointe de l'Aiguillon (PNR) et un mâle chanteur le 28 juin 1991 le Poiré-s-Vie (micro-milieu en plein bocage) (A.G)

POULE D'EAU (*Gallinula chloropus*) (129)

Très commune, nicheuse et sédentaire sur tous les points d'eau du département y compris l'Ile d'Yeu.

TALEVE D'ALLEN (*Porphyrola alleni*) (2)

Espèce nicheuse en Afrique au sud du Sahara (à consulter dans les notes et faits divers de "L'Oiseau et la Revue Française d'ornithologie Vol 61, 1991 n° 3 pp:254-257).
1ère donnée pour la Vendée d'un immature du 18 au 21 janvier 1991 à la réserve de Chanteloup et malheureusement trouvée morte de froid le 21 janvier (ONC)

FOULQUE MACROULE (*Fulica atra*) (91)

Nicheur commun sur tous les étangs du bocage et les lacs d'où proviennent la presque totalité des données, quelques données dans certains milieux favorables du Marais Poitevin.
Fin d'hivernage de 1989-90: maxi: 240 à +300 Etang des Boucheries, 150 à 170 au plan d'eau de Luçon en janvier et en février.
Rassemblement post-nuptial important à l'étang des Boucheries pour plus de 500 le 6 juillet 1990 N.P, et 344 le 26 juin 91 (L.G)

GRUE CENDRÉE (*Grus grus*) (12)

5 ind Baie de l'Aiguillon 30/12/90 (A.T et A.L)
Un passage de 6 ind le 22 octobre à la Chaume et une petite troupe de 2 à 10 ind stationnant en baie de l'Aiguillon du 28/10 au 18/12.
1er cas de stationnement prolongé au printemps d'un ind au communal du Poiré-s-Velluire du 1er au 21 Avril (R.R, T.T et C.Gn).

OUTARDE CANEPETIERE (*Otis tetrax*)

(30)

La 1ère notée le 18 février 90: un ind au communal du Poiré-s-Velluire (D.C).
 Les chanteurs sont notés dès le mois de mai : 1 ind le 5 mai au communal du Poiré (D.C), 5 au moins le 20 mai à Bretet G.B, 1 ou plus le 25 mai à Nalliers (C.V).
 Pas de rassemblement postnuptial au communal du Poiré-s-Velluire et seulement une petite troupe de 10 ind vus en vol le 26 octobre 1990 (D.C).
 1er cas d'hivernage d'un ind (8 données du 15/12 au 19/2) au communal du Poiré-s-Velluire, peut-être est-ce le même oiseau qui a hiverné en 1989-90 (car l'oiseau a été observé le 18/2 par D.C, et cette date est un peu trop avancée pour les migrateurs).
 L'enquête Outardes 1991 de Philippe Moteau donne provisoirement le résultat de 6 mâles chanteurs dans le secteur Ouest (Nalliers) et de 7 mâles chanteurs dans le secteur Est (Nieul-s-l'Autize).

HUTRIER-PIE (*Haematopus ostralegus*)

(47)

Surtout noté en janvier au littoral ; maxi : 300 le 16 janvier 1990 à l'île de Noirmoutier; dernier noté le 24 mai
 Des petits groupes de 3 à 60 ind du 25 juillet au 31 octobre sur le littoral et hivernage de 370 ind le 30/12 et +260 le 16 janvier 91 à la pointe d'Arçay (ONC) et 1267 le 19/1/91 en baie de Bourgneuf (C.Gn).

ECHASSE BLANCHE (*Himantopus himantopus*)

(67)

Les 1ères notées le 18 mars 1990 à la réserve de Chanteloup et quelques données de reproduction :

14 cples Marais de Beauvoir et de St Urbain (3 colonies sur 800 ha) (P.R)
 14 ind (dont 4 couveurs) Lagunage de l'Epine 20/5 (A.B)
 3 cples le Grand Marais et 4 cples à la décharge de St Hilaire de Riez (au moins 12 pullis) en Mai-Juin (G.B)

Soit environ 22 cples nicheurs dans le marais du Nord de la Vendée, mais les données de reproducteurs pour la réserve de St Denis du Payré, les marais d'Olonne et de la Guittière ne sont pas parvenues au fichier.

Dès juillet, les dispersions en famille sont toujours notées dans les stations d'épuration :

13 dont 6 juv. Lagunage de Luçon 3/7/90 (N.P)
 5 ind Lagunage de Nalliers 30/7/90 (E.G)
 20 ad et imm Lagunage de Luçon 30/7/90 (O.P)
 la dernière observation de 2 ind à Noirmoutier 15/9 (Labregère)

La 1ère observation de 2 ind le 24 mars 1991 au marais de Noirmoutier (A.B). Données de reproduction en 1991:

9 cples pour 3 pullis Marais de St Hilaire (G.B), 4 nids pour 10 pullis Réserve de St Denis (ADEV), 2 cples (nidification incertaine) marais salants de Champagné (C.Gn)
 1 cple (sans comportement nicheur) au communal de Lairoux (P.R.), 3 ind (non nicheurs) Triaize, et 2 ind (non nicheurs) au communal des Magnils-Regniers 10/6 (P.R)

AVOCETTE ELEGANTE (*Recurvirostra avosetta*)

(47)

Hiverné en nombre varié chaque année en baie de l'Aiguillon et de Bourgneuf. Pas d'effectifs importants cette année; les maxis: +200 ind le 6/1 à l'estuaire du Lay (S.D) et 155 le 21/1 Jetée de Jacobsen (P.R.)

505 ind Réserve de Chanteloup 7/2 (ONC)
 2 données de reproduction : 20 cples au marais de Beauvoir et de St Urbain (3 colonies sur 800 ha) (P.R) et 77 ind dont 16 couveurs au lagunage de l'Epine (A.B)

Hivernage de 1990-91 nettement plus important qu'en 1989-90 :

420 ind Réserve de la Pointe d'Arçay 30/12 (J.M)
 2220 ind Baie de l'Aiguillon 16/1 (ONC)
 246 ind Baie de Bourgneuf 19/1 (C.Gn)
 296 ind Marais de Mullambourg (représentant approximativement la population hivernante

sur Noirmoutier) (T.G)

2 données de reproduction sur les marais de Beauvoir et de St Urbain (nombre de couples non communiqué)

OEDICNEME CRIARD (*Burhinus oedicephalus*)

(30)

Oiseau migrateur et nicheur commun dans la plaine calcaire de Luçon à Nieul-s-l'Autize. Arrivé en général début mars (10 mars 1990 et 5 mars 1991), les chanteurs sont notés à Xanton-Chassenon, Chaix, Mouzeuil-St-Martin, Nieul-s-l'Autize, Poiré-s-Velluire, Bretet, Nalliers et Auzay.

1 ind au lac du Jaunay (1ère mention de ce site pour le fichier) le 24/7 (G.B)

Rassemblements d'automne : 40 le 28/10, 80-90 ou + le 1/11 et 25-30 le 4/11 Auzay (C.Gn) et le dernier à Chaix le 14/11 (P.M)

PETIT GRAVELOT (*Charadrius dubius*)

(35)

Observé de mars à début septembre, les données concernent souvent des petits groupes de 2 à 6 ind principalement notés sur les étangs bocagers et les marais d'Olonne, de St Hilaire de Riez et la réserve de St Denis.

Sites de reproduction pour 1990 :

2-3 cples Etang de la Rainsandière (1 nid avec 4 oeufs) (B.P)

1 cple et 1 juv Marais au Père (Olonne) (D.D)

Dispersion notée dès la fin de juillet 1990:

3 le 20/7 Réserve de St Denis, 3 le 28/7 Marais de la Vie, 5 le 5/8 Lac d'Apremont-Maché et 3 le 19/8 Lagune de la Belle Henriette.

Sites de reproduction pour 1991 ;

1 cple Marais de St Hilaire à partir du 5/5 (G.B)

1 cple Marais d'Olonne 8/5 (G.Bu)

1 ind Lagune du Dain (Comportement aile blessée) 25/5 (P.R)

GRAND GRAVELOT (*Charadrius hiaticula*)

(97)

Contrairement à son petit cousin, il fréquente principalement le littoral ou les marais littoraux en petites ou grosses bandes souvent avec des bécasseaux variables. Il est visible presque toute l'année mais ne niche pas en Vendée

1 à 40 Ile d'Yeu (surtout côte Nord) 2/8 (X.H)

300 Pointe de l'Aiguillon 5/8 (L.G)

100 Lagune de la Belle Henriette 22/8 (S.D)

110 Réserve de St Denis du Payré 16/11 (ADEV)

150 Réserve de la Pte d'Arçay 30/12 (J.M)

300 Réserve de Chanteloup 12/5 (G.Bu)
1000 Baie de l'Aiguillon (polder de la Bosse) 16/5 (C.Gn)

GRAVELOT A COLLIER INTERROMPU (*Charadrius alexandrius*) (23)

Noté du 5 avril au 25 septembre 1990 sur le littoral et les marais littoraux
37 ind Pointe de l'Aiguillon 5/4 (N.P)
2 ad et 3 pullis Lagune de la Belle Henriette 14/5 (S.D)
Stationnement de 30 à 50 ind à la Pointe de l'Aiguillon du 5/8 au 25/8 (L.G)

1er noté le 14 avril 1991 à la réserve de Chanteloup
8 cples Lagune du Dain (cantonés sans comportements de nicheurs) 25/5 (P.R)
1 cple la Barre des Monts (comportement d'inquiétude) 26/5 (P.R)

6 ind le 30 décembre 1990 à la Pointe d'Arçay (J.M) (la seule donnée d'hiver pour le fichier).

PLUVIER GUIGNARD (*Eudromias morinellus*) (3)

Rare, mais régulièrement observé aux passages du printemps et d'automne depuis 1987.
11 ind Nieul-s-l'Autize (1 ère donnée pour cette troupe importante en plaine calcaire) 28/4/90 (G.B.)
1 ind Baie de l'Aiguillon 28/7 E.Chapamlie (CORIP) (info de H.Robreau-LPO).
1 ind séjournant à l'Île d'Yeu (la Gde Conche) du 25 au 29/8 X.H

PLUVIER DOMINICAIN (*Pluvialis dominica*) (1)

Oiseau nord-américain ; 1 ind Marais d'Olonne 23/7 (ONC)

PLUVIER FAUVE (*Pluvialis fulva*) (1)

Ressemblant au cousin d'Amérique du Nord, originaire de la Sibérie.
Première donnée du printemps (soumise au CHN) pour le fichier d'un ind en plumage nuptial séjournant du 29 au 31/5 au Langon en compagnie des vanneaux (C.Gn), c'est probablement le même oiseau qui a été vu à Petit Mars (Loire Atlantique) (source Oiseau-Magazine n°24).

PLUVIER DORE (*Pluvialis apricaria*) (72)

28 données du 14 janvier au 18 mars 1990 aux marais-communaux du Marais Poitevin
800-900 Communal du Poiré-s-Velluire 14/1 (C.Gn)
700 Réserve de St Denis 17/2 (ADEV)
850 Communal de Lairoux 3/3 (C.Gn)
300 Communal de St Benoist 10/3 (C.Gn)
200 Communal de Curzon 17/3 (C.Gn)

Le 1er noté le 23 juillet 1990 au marais d'Olonne D.D et F.T et le dernier au marais d'Olonne le 18 mai 1991 ONC.

2 ind Ile d'Yeu (les Conches) 25/8 (X.H)
+ 600 ind Etang des Boucheries (étang vidé) 25/12 (N.P)
1500 ind Communal du Poiré-s-Velluire 12/1 (C.Gn)

PLUVIER ARGENTE (*Pluvialis squatarola*) (48)

Hivernage uniquement sur le littoral et les marais salés;
357 le 30/12 et 330 le 16/1 Pointe d'Arçay (J.M et ONC)
1120 ind Baie de l'Aiguillon 16/1 (ONC)
1960 ind Baie de Bourgneuf 19/1 (C.Gn)

Les passages de printemps sont surtout notés en Mai dans les zones côtières et aussi dans l'intérieur.
4 le 2/5 D.C et 1 autre le 17/5 (C.Gn Communal du Poiré)
± 100 ind Marais de la Vie (St Hilaire) 13/5 (G.B)
± 30 ind Vouvant (en vol) 18/5 (P.B)

VANNEAU HUPPE (*Vanellus vanellus*) (233)

Hivernage important dans le Marais Poitevin ; résultats du comptage BIROE en janvier dans les marais communaux du Marais Poitevin:

1990: 25.081 ind 1991 : 12.493 ind

73 couples se sont reproduits en 1990 dans les marais de Beauvoir et de St Urbain (P.R.)

En 1991, la population totale nicheuse du Marais Poitevin est de 369-374 cples (1960-63: 3000-5000 cples, 1982: 500 cples, 1984: 420-455 cples), ils ont niché sur l'Île d'Yeu, Noirmoutier, les marais de la Guittière, d'Olonne, de St Hilaire de Riez et de Sallertaine (± 50 cples pour ce dernier (P.R)).

BECASSEAU MAUBECHÉ (*Calidris canutus*) (25)

Noté lors des passages, concernant de 3 à 100 ind., d'août à septembre en baie de l'Aiguillon, aux îles d'Yeu et de Noirmoutier et à la lagune de la Belle Henriette.

Une donnée d'hiver de 3000 à 4000 ind en baie de l'Aiguillon le 16/1/91 (ONC)

Les passages de printemps concernant 5 à 150 ind sont notés en mai sur le littoral ; maxi : ± 5000 le 16 mai 91 en baie de l'Aiguillon (C.Gn.)

BECASSEAU SANDERLING (*Calidris alba*) (28)

Noté de la fin d'août à septembre et de mars à mai par petites troupes de 5 à 30 ind sur les plages; maxi: 330 le 23/5/90 Barbâtre, ± 150 le 7/9/90 Plage de Sauveterre, + 150 le 9/3/91 Plage du Grouin du Cou et ± 100 le 16/5/91 Plage de Sion-s-l'Océan

Une donnée d'hiver de 5 ind le 7/12/90 Plage de la Tourette (Île d'Yeu) (S.C)

BECASSEAU MINUTE (*Calidris minuta*) (11)

Observé lors des migrations de juillet à octobre et de mars à la mi-mai et une donnée d'hiver d'un ind du 16 janvier 1991 à la baie de l'Aiguillon.

Stationnement de 2 à 11 ind du 19 août au 17 septembre 90 à la lagune de la Belle Henriette

BECASSEAU DE TEMMICK (*Calidris temmincki*) (9)

Noté aux passages d'août et de septembre et de la mi-avril à mai dans les marais de St Hilaire, d'Olonne et de la réserve de St Denis concernant 1 à 3 ind.

BECASSEAU COCORLI (*Calidris ferruginea*) (13)

Une seule donnée de printemps 1990 d'un ind Barbâtre 23/5 (A.B)
 Régulièrement observé lors de sa migration postnuptiale de la fin de juillet à la mi-septembre
 10 ind le 25/7 (S.D) et 8 ind le 19/8 (G-L.C) Lagune de la Belle Henriette
 16 ind Marais Nord de Bouin 20/8 (P.R)
 18 ind Réserve de Chanteloup 29/8 (ONC)

BECASSEAU VIOLET (*Calidris maritima*) (28)

Régulièrement observé à St Gilles-Croix-de-Vie, Sion-sur-l'Océan et la Chaume du 8 septembre au 4 mai (8 à + 50 ind. concernés); une seule donnée pour Noirmoutier le 21/1.
 44 ind St Gilles de Vie 2/1 (G.B)
 58 ind la Chaume 27/1 (D.P)
 40 ind Sion-s-l'Océan 25/3 (G.B)

BECASSEAU VARIABLE (*Calidris alpina*) (107)

Observé toute l'année sur le littoral et les marais côtiers, son effectif hivernant est important en baie de Bourgneuf et de l'Aiguillon. Mais malgré quelques indices de présence en période de reproduction, il n'est pas encore prouvé comme nicheur.

1 ind alarmant Communal de St Benoist (voir article de Gorgebleue n°10) 5/06/90 (P.R)
 5 ind Lagune de la Belle Henriette 17/6 (N.P)

Résultats du dénombrement BIROE en Janvier 91 :

9425 ind Baie de l'Aiguillon 16/1 (ONC)
 1270 ind Pointe d'Arçay 16/1 (ONC)
 14450 ind Baie de Bourgneuf 19/1 (C.Gn)

BECASSEAU ROUSSET (*Tryngites subruficollis*) (3)

Oiseau nord américain (pour mémoire: 1ère mention du 9 au 28/9/85 au lac de Maché-Apremont (A.G.), 2ème mention du 7/9 au 9/9/88 au marais d'Olonne (ONC).)

1 juv au lac du Jaunay du 8/9 au 10/9/90 (D.D)

BECASSEAU COMBATTANT (*Philomachus pugnax*) (81)

Printemps 90 ;les passages de la mi-février à la mi-mai sont souvent notés sur les marais communaux du Marais Poitevin et le marais de la Vie (St Hilaire)

220 ind Communal de Lairoux 3/3 (C.Gn)
 334 ind Réserve de St Denis 12/4 (ADEV)
 et le dernier Réserve de St Denis 11/6 (ADEV)

Les passages de juillet à la fin d'août par petites troupes de 1 à 50 sont notés sur le lagunage de Luçon, la réserve de St Denis, le marais de la Vie, la Pointe de l'Aiguillon, la lagune de la Belle Henriette, les marais d'Olonne et le lac d'Apremont-Maché.

Une donnée d'hiver du 25 décembre 1990 d'un oiseau à l'étang des Boucheries (étang vidé) (N.P)

Printemps 1991, les passages du 3 février au 29 mai sont toujours notés sur les marais communaux du Marais Poitevin, les marais de St Hilaire de Riez et une donnée pour l'étang de la Rainsandière.

± 100 ind Marais d'Orouet 6/4 (G.B)
 313 ind Polder de Virecourt 15/4 (C.Gn)
 1060 ind Réserve de St Denis 17/4 (ADEV)
 150 ind Marais de la Vie (St Hilaire) 18/4 (G.B)
 et les derniers à la réserve de St Denis 14/6 (ADEV)

BECASSINE SOURDE (*Lymnocyptes minimus*) (5)

1 ind Marais de la vie (St Hilaire) 24/3/90 (G.B)
 1 ind Lac du Moulin Papon 8/11/90 (S.C et B.T)
 1 ind Mervent (le Nay) 28/1/91 (P.B)
 1 ind Marais de la vie les 21/3 et 20/4/91 (G.B)

BECASSINE DES MARAIS (*Gallinago gallinago*) (133)

Observée presque sur toute l'année dans toutes les zones humides et les étangs, quelques données en mai et en juin, pas d'indices de reproduction en 90 et 91.

26 ind Communal du Poiré-s-Velluire 14/1/90 (C.Gn)
 25 ind Etang des Boucheries 14/1/90 (L.G et S.R)
 29 ind Marais d'Olonne 21/2/90 (J.P)
 +40 ind Marais de la Vie 15/3/90 (G.B)
 1 ind Marais de la Vie 10/5/90 (G.B)
 1 ind Réserve de St Denis 11/5/90 (ADEV)
 42 ind Réserve de St Denis 10/8/90 (ADEV)
 +70 ind Etang des Boucheries 25/12/90 (N.P)
 +50 ind Communal du Poiré-s-Velluire 8/2/91 (C.Gn)
 1 ind Marais de la Vie 28/5/91 (G.B)
 1 ind Réserve de St Denis 14/6/91 (ADEV)

BECASSE DES BOIS (*Scolopax rusticola*) (9)

Notée du 24 octobre 90 au 22 Février 91.

1 ind St Hilaire de Loulay 24/10 (P.B)
 1 ind (la passée) Pissotte 26/10 (P.B)
 1 ind Bois du Beaupuy 8/11 (O.P)
 5 ind (la passée) Mervent (le Nay) 6/12 (P.B)
 5 ind Ile d'Yeu 19/12 (P.B)
 1 et 2 ind Forêt de Vouvant les 8 et 9/2 (P.B)
 1 ind St Gilles (en ville dans un jardin!...) 10/2 (G.B)
 1 ind Pinède de la Belle Henriette 22/2 (T.Y)

BARGE A QUEUE NOIRE (*Limosa limosa*) (155)

Importants passages prénuptiaux dans les marais communaux du Marais Poitevin et quelques données de reproduction sur le Marais Poitevin et le Marais Breton.

5500 ind Communal du Poiré-s-Velluire 18/2 (C.Gn)
 5500 ind Communal de Lairoux 3/3 (C.Gn)
 1365 ind Communal des Magnils, 3595 ind Communal de Lairoux, 2250 ind Communal de St Benoist 10/3 (C.Gn)
 1 alarmant Communal du Poiré-s-Velluire 4/5 (D.C)

15 cples Marais de Beauvoir et de St Urbain 7/5 (P.R)
 7 cples Marais de la Barre des Monts 7/5 (P.R)
 15 ind Réserve de St Denis 11/5 (ADEV)
 1 cple alarmant et cantonné Communal de St Benoist 5/6 (P.R)

Stationnement de 4 à 70 ind du 9 juillet au 19 septembre à la lagune de la Belle Henriette, l'hivernage de quelques centaines à quelques milliers dans la baie de l'Aiguillon de novembre à janvier (maxi: ±3000 16/1/91 (ONC)).

Les passages de printemps 91 du Marais Poitevin; maxi: +5800 le 28 février et le 3 mars, 8.338 le 21 mars et ±7000 le 24 mars (Etudes 91 de LPO)
 22 cples reproducteurs dans le Marais Poitevin (la population semble avoir retrouvé ses effectifs de 1981, car depuis sa transformation en base de Loisirs le communal de Luçon a subi la perte de 15 à 20 couples). (Etudes 91 de LPO)
 7-9 cples Marais de Beauvoir et 6 cples Marais de St Urbain 20/5 (P.R)

BARGE ROUSSE (*Limosa lapponica*) (38)

Les données sont notées aux passages d'automne, l'hivernage sur le littoral du 8 juillet au 8 février concernant de 30 à 500 ind
 14 données de passages pré-nuptiaux avec des effectifs faibles de 10 à 80 ind en mai sur le littoral, les marais côtiers et les marais d'intérieur (communal du Langon et du Poiré-s-Velluire).

COURLIS CORLIEU (*Numenius phaeopus*) (70)

Noté principalement de la mi-juillet à la fin d'août et de la fin mars à mai comme l'illustre ce tableau.

Jul	Aoû	Sep	Oct	Nov	Déc	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Jun	N°
										+		1025.3-4
	+++											1026.1-8
											+	1125.1-2
	++								+++	++		1126.3-4
	+											1127.3-4
									+			1226.3-4
											++	1227.1-2
	+								+++	++		1328.3-4
	+									+		1328.5-6
							+		+++	+++		1328.7-8
									+++	+++		1428.1-2

Cycle de présence de *Numenius phaeopus* en Vendée.

14 ind Moulleron le Captif 12/8 (O.P)

Etude LPO au printemps 91 sur les dortoirs des courlis corlieux dans la baie de l'Aiguillon: L'effectif minimum transitant par le Sud-Vendée peut être estimé à 15-20.000 oiseaux, ce chiffre est remarquable en comparaison de l'effectif de courlis transitant en Europe de l'Ouest par

"l'East Atlantic Flyway" qui est estimé à 50.000 oiseaux (Engelmoer et Al,1984).




Figure 5 Courbe de présence du Courlis corlieu en Vendée lors de la migration pré-nuptiale.

COURLIS CENDRE (*Numenius arquata*) (56)

A partir du 14 juillet jusqu'au 14/5. Hivernage surtout noté sur le littoral, des passages de février à mars notés plus fréquemment à l'intérieur que sur le littoral.

700 ind Baie de l'Aiguillon 16/1 (ONC)
 1452 ind Baie de Bourgneuf 19/1 (C.Gn)

Des passages à l'intérieur du 6 février au 9 mars: aux marais-communaux des Magnils, du Poiré-s-Velluire, de Lairoux, aux marais de Champagné et de Chaillé les marais, à Vouvant, à Mouzeuil, à l'étang de la Chèvrerie.

Deux dates tardives :

2 ind Dunes de Tresson (Ile de Noirmoutier) ?/5 (P.R)
 5 ind Plage de la Chaume 14/5 (G.Bu)

Pas d'indices de reproduction en 91.

CHEVALIER ARLEQUIN (*Tringa erythropus*) (33)

Noté par petites troupes du 3 juillet au 25 août sur le lagunage de Luçon, la réserve de St-Denis, le marais de la Vie, l'étang du Parc Soubise et l'Ile d'Yeu et du 30 mars au 27 mai sur l'étang de la Rainsandière, la réserve de St-Denis, les marais d'Olonne et de la Vie.

15-20 ind Réserve de St Denis 8/7 (N.P)
 4 ind Baie de l'Aiguillon 16/1 (ONC)
 3 ind Etang de la Rainsandière 30/3 (M.R)
 6 à 15 ind Marais de la Vie (St Hilaire) du 4 au 27/5 (G.B)

CHEVALIER GAMBETTE (*Tringa totanus*) (156)

Observé toute l'année dans les marais littoraux et les baies, les passages de fin d'été sont principalement notés sur la lagune de la Belle Henriette concernant 10 à 60 ind et le marais de la Vie concernant 5 à 16 ind.

1200 ind Marais d'Olonne 14/8 (D.P)

Les observations de printemps sont principalement notées dans les marais du Marais-Poitevin et du Marais-Breton.

Nidification en 1990 :

83 cples Marais de Beauvoir et de St Urbain (P.R)
 ± 25 cples Communal de St Benoist (P.R)
 2 cples Lac de Luçon (C.V)
 3 cples St Hilaire de Riez (G.B)

Nidification en 1991 :

10 cples Marais de Sallertaine (P.R)
 2-3 cples Lac de Luçon (C.Gn)
 5-10 cples Réserve de St Denis (ADEV)
 35 cples env Marais de la Vie (St Hilaire) (G.B)
 94-102 cples Marais Poitevin (LPO)

CHEVALIER STAGNATILE (*Tringa stagnatilis*) (7)

Rare, originaire des pays de l'Est

1 ind Réserve de St Denis du 3 au 12 juillet (N.P, ADEV)
 1 ad Réserve de Chanteloup 1 juillet (D.D et ONC)
 1 juv Marais d'Olonne du 17 juillet au 4 août (D.D et D.P)

CHEVALIER ABOYEUR (*Tringa nebularia*) (53)

Noté du 10 juillet au 24 octobre 1990 avec un maximum de 7 oiseaux sur les lagunes de la Belle Henriette et du Dain, les lacs du Jaunay, de Rochereau et d'Apremont-Maché, les étangs des Ecluseaux, du Parc Soubise, de l'étang Neuf, le marais de la Vie.

25 ind Pointe de l'Aiguillon 25/8 (L.G)
 1 donnée d'hiver : 1 ind Etang du Parc Soubise 27/12 (T.Y)

Passages de printemps du 17 avril au 31 mai 1991 par petites troupes ne dépassant pas la dizaine sur l'étang des Boucheries, le lac de Luçon, le communal du Poiré-s-Velluire, la réserve de St Denis et le marais de la Vie.

PETIT CHEVALIER A PATTES JAUNES (*Tringa flavipes*) (4)

Oiseau nord américain, les 4 données d'un oiseau proviennent de la réserve de Chanteloup du 9 au 24 octobre (ONC)

CHEVALIER CULBLANC (*Tringa ochropus*) (85)

Observé presque toute l'année sur le littoral et surtout dans quelques milieux humides de l'intérieur.

1 à 19 ind Marais de la Vie (St Hilaire) du 17/3 au 25/6 (G.B)
 20 ind Marais de la Vie 3/7 (G.B)
 15 ind Orouet 16/7 (G.B)
 10 ind Lac du Jaunay 30/7 (G.B)
 1 et 2 ind Etang des Boucheries 15/11 S.C et 25/12 (N.P)
 15 ind Etang de la Rebillière 2/2 (D.P)

CHEVALIER SYLVAIN (*Tringa glareola*) (20)

Noté du 3 juillet au 5 octobre 1990 au marais de St Hilaire, au lagunage de Luçon, à la réserve de St Denis, aux lac du Jaunay et d'Apremont-Maché et à la lagune de la Belle Henriette avec un maximum de 3 oiseaux.

1 ind au Gois 25/11 (S.C)
 un oiseau noté en avril et jusqu'au 21 mai 1991 au marais de la Vie G.B

CHEVALIER GUIGNETTE (*Tringa hypoleucos*) (80)

Noté presque toute l'année avec un maximum de données de juillet à septembre et d'avril à mai, et 8 données d'octobre à février.

7 ind Lac de Rochereau 27/4 (M.R)
 8 ind Etang des Boucheries 27/4 (P.B)
 < 10 ind Marais de la Vie 30/4 (G.B)
 20 ind Etang des Boucheries 6/7 (N.P)
 20 ind Lagune de la Belle Henriette 24/7 (S.D)
 1 à 10 ind Ile d'Yeu (surtout côte nord) 31/7 (X.H)
 10 ind Lac du Moulin Papon 9/8 (S.C)
 1 ind Marais de l'Aurière 13/1 (D.D)
 1 ind les Sables d'Olonne (bassin de la Chasse) 15/1 (D.D)
 4 ind Etang de la Chèvrerie 2/2 (D.P)

Pas d'indices de reproduction en 1990 ni 1991

TOURNEPIERRE A COLLIER (*Arenaria interpres*) (49)

Noté du 20 janvier au 9 juin, du 25 juillet au 30 décembre 1990 et du 4 au 28 mai 1991 sur le littoral.

1 à 10 ind Littoral de St Gilles du 20/1 au 14/5/90 (G.B)
 13 ind Pointe de l'Aiguillon les 11 et 14/5/90 (S.D)
 1 à 4 ind Pointe de l'Aiguillon du 5/8 au 13/10 (L.G, N.P, S.D et C.Gn)
 ± 50 ind Sion-s-l'océan 16/5/91 (G.B)

PHALAROPE DE WILSON (*Phalaropus tricolor*) (3)

Un individu a séjourné du 11 au 22 septembre dans la réserve de Chanteloup (ONC et D.P)

PHALAROPE A BEC ETROIT (*Phalaropus lobatus*) (3)

Encore un dans la réserve de Chanteloup du 12 au 21 septembre (ONC et D.P)

PHALAROPE A BEC LARGE (*Phalaropus fulicarius*) (3)

1 ind Noirmoutier (le Vieil) 15/9 (A.B)
 1 juv Lac du Jaunay 21/9 (D.D)
 1 ind les Sables d'Olonne (sortie kifanlo) 23/9 (D.D)

LABBE POMARIN (*Stercorarius pomarinus*) (3)

Observation postnuptiale d'un ind Ile d'Yeu 24/8 X.H, les Sables d'Olonne 23/9 (D.D) et St Gilles Croix de Vie 6/10 (G.B)

LABBE PARASITE (*Stercorarius parasiticus*) (15)

Observé habituellement sur le littoral d'août à octobre.

1 à 2 ind St-Gilles les 15/8, 21/9, 6, 12 et 13/10 (G.B)

3 ind Pointe des Corbeaux (Ile d'Yeu) 20/8 (X.H)

1 à 4 ind les Sables (sortie kifanlo) les 22/8, 9 et 23/9, et 29/10 (D.P et D.D)

1 ind Ile de Noirmoutier 15/9 (G.B)

1 à 4 ind Pointe de l'Aiguillon du 16/9 au 13/10 (CPN d'Aizenay, C.V et C.Gn)

LABBE POMARIN OU PARASITE (1)

1 ind en phase sombre Phare de Grosse Terre (St Gilles) 6/6/91 (G.B)

GRAND LABBE (*Stercorarius skua*) (14)

2 ind les Sables d'Olonne 25/1 (D.D)

1 ind Noirmoutier (le Vieil) 4/2 (A.B)

5 données d'août à septembre aux Sables d'Olonne (sortie en mer) avec un maximum de 13 ind le 23/9

2 ind Pointe de l'Aiguillon 24/8 (L.G)

1 ind l'Ile d'Yeu 24/8 (X.H), Sion-s-l'océan 29/10 (G.B), le Jaunay 31/10 (G.B); l'Herbaudière 1/11 (A.B) et St Hilaire de Riez 6/1 (G.B et P.R)

MOUETTE MELANOCEPHALE (*Larus melanocephalus*) (15)

Observée à la réserve de Chanteloup, aux Sables d'Olonne et St Gilles Croix de Vie du 27/1 au 19/6/1990 avec un maximum de 43 oiseaux à la réserve de Chanteloup le 18/4.

Observée de décembre 1990 à juin 1991 et une seule observation à la Pointe de l'Aiguillon d'un ind le 5/3 (ONC)

65 ind Marais d'Olonne 17/4 (ONC)

Belle progression pour les reproducteurs au marais d'Olonne depuis 1988; 2 cples nicheurs en 88, 4 cples nicheurs en 89 et 7 ou 8 cples nicheurs en 91 (ONC)

MOUETTE PYGMEE (*Larus minutus*) (50)

33 données de 1990 sont dues au passage pré-nuptial du 4 février au 7 mai avec quelques groupes importants : 200 le 8/3 au lac de Luçon ; 550 le 10/3 Communal de Lairoux; 380 le 23/3 et 300-350 le 5/4 Lagune de la Belle Henriette.

4 observations de migration postnuptiale du 3 août au 31 octobre avec un maximum de 10 ind le 31/10 Lagunage de l'Herbaudière.

4 observations d'hiver du 2 au 6 janvier 1991 ; 7 le 2/1 et 15 le 6/1 St Gilles (G.B et P.R);

40 le 6/1 St Hilaire G.B et P.R et ± 15 le 5/1 les Sables d'Olonne (D.D).

14 observations en migration pré-nuptiale du 15 mars au 4 mai ; 200 env le 25 mars à Sion-s-l'océan et 330 le 6 avril au lagunage de l'Herbaudière.

MOUETTE DE SABINE (*Larus sabini*) (4)

Observée au large des Sables d'Olonne en août et en septembre avec un maxi de 45 à 50 ind le 22/8 (D.P)

et une observation tardive d'un adulte à la lagune de la Belle Henriette le 1/11 (G.B)

MOUETTE RIEUSE (*Larus ridibundus*) (116)

Observée toute l'année sur tout le département avec un maximum en hiver. Pas de dortoirs recensés en 1990 et 1991 et une seule donnée de reproduction de 300-350 cples Réserve de Chanteloup 1991 (ONC)

env 5000 Lac du Moulin Papon 24/1/90 (S.C)

GOELAND A BEC CERCLE (*Larus delawarensis*) (12)

Oiseau nicheur du centre des Etats-Unis, toutes les données sont de la région des Sables d'Olonne; 1 immature 1er hiver du 2/2/90 au 5/5/90 (D.D et ONC) et une autre observation d'un immature 2è hiver au lac du Tanchet 26/1/91 (D.D).

GOELAND CENDRE (*Larus canus*) (20)

Noté du 20 janvier 90 au 18 mars 90, en août, en novembre et puis du 20 février au 28 mars 91 sur le littoral et le communal du Poiré-s-Velluire.

GOELAND BRUN (*Larus fuscus*) (50)

Observé presque toute l'année sur le littoral et aussi à l'intérieur surtout de la fin d'été à la fin d'hiver. Une donnée de reproduction en 1991 de 15 à 17 couples au marais d'Olonne.

GOELAND ARGENTE (*Larus argentatus*) (52)

Observé toute l'année et 2 données de reproduction en 1991 : 4 couples à St Gilles (les 5 Pineaux) (G.B) et 140-145 couples à la réserve de Chanteloup (ONC)

GOELAND LEUCOPHEE (*Larus cachinnans*) (21)

Observé du 2 juillet 90 au 17 septembre et puis de mars à juin 91 sur le littoral de l'Ile d'Yeu, de St Gilles, de la baie de l'Aiguillon, de la lagune de la Belle Henriette et le marais d'Olonne. Une donnée de reproduction en 1991 de 6 couples dans la réserve de Chanteloup (ONC).

GOELAND A AILES BLANCHES (*Larus glaucoides*) (4)

Rare, mais régulier depuis 5 ans surtout noté sur le littoral du nord de la Vendée.

1 ind Ile d'Yeu (Port Joinville) du 8 au 11 avril 1990 (X.H)

1 im. 1ère année le 2/1 (G.B) et 1 adulte le 6/1/91 à St Gilles Croix de Vie (G.B et P.R)

GOELAND MARIN (*Larus marinus*) (34)

Observé toute l'année sur le littoral et une donnée de reproduction en 1991 d'un couple dans la réserve de Chanteloup (ONC).

MOUETTE TRIDACTYLE (*Rissa tridactyla*) (20)

Les données de reproduction sur le phare des Barges en 1990 et 91 n'ont pas été transmises au fichier.

10 ad et imm	St Gilles	12/2 (G.B)
+30 ind	Ile d'Yeu (Pointe des Corbeaux)	20/8 (X.H)
+20 ind	St Gilles (plus de la moitié sont mazoutées)	12/1 (G.B)

STERNE HANSEL (*Gelochelidon nilotica*) (5)

1 ind	Réserve de St Denis	13/6 et 8/7 (H.D et N.P)
1 ind	Lagune de la Belle Henriette	21/7 (D.D, F.T et F-D.E)
1 ind	Réserve de St Denis	16 et 18/5 (ADEV et C.Gn)

STERNE CASPIENNE (*Sterna caspia*) (11)

Observée en migration d'avril et d'août à septembre.

1 à 6 ind du 5 au 26 avril et puis 1 à 5 ind du 29 août au 16 septembre dans la baie de l'Aiguillon et la Pointe d'Arçay.

1 ind	Ile d'Yeu (Pointe des Corbeaux)	28/8 (X.H)
1 ind	Marais d'Olonne	les 12 et 13/9 (ONC)

STERNE CAUGEK (*Sterna sandvicensis*) (47)

Notée aux deux passages de la fin de juillet à la mi-octobre et de la fin mars à mai et deux données hors de ces dates pour 1 ind le 27 janvier 1990 et le 5 janvier 1991 aux Sables d'Olonne (D.D).

Le premier oiseau noté le 18 mars 1990 à St Gilles; passages du 7 au 13 avril à l'Ile d'Yeu avec un maxi de plusieurs centaines le 13 avril, peu suivis ailleurs.

Passages d'été du 25 juillet au 13 octobre à la Pointe de l'Aiguillon avec quelques maxi: 200 le 5/8, 300 le 24/8, 250 le 25/8 et le dernier 13 octobre.

Autres observations concernant quelques troupes n'excédant pas la cinquantaine d'oiseaux sur le long du littoral

Première notée le 25 mars 1991 à Sion-s-l'Océan (G.B)

STERNE PIERREGARIN (*Sterna hirundo*) (33)

La 1ère notée le 16 mars 1990 à la réserve de Chanteloup et 2 couveurs parmi les 83 oiseaux au lagunage de l'Epine 20/5 (A.B)

Passages d'été à la Pointe de l'Aiguillon du 4 septembre au 16 octobre avec un maxi de 160 oiseaux le 4 septembre (P.M), un juvénile est noté les 22 et 27 octobre aux Sables d'Olonne (D.D) et encore un immature aux Sables d'Olonne du 22 décembre au 4 janvier (O.Pe, A.L, et D.D), c'est le premier cas d'hivernage en Vendée de cette espèce transmis au fichier.

Une donnée de reproduction de 38 à 42 couples au marais d'Olonne

STERNE ARCTIQUE (*Sterna paradisaea*) (1)

Seulement observée au large des Sables d'Olonne en migration postnuptiale; 2 ind au large des Sables d'Olonne (sortie kifanlo) le 14/7 (D.P)

STERNE NAINE (*Sterna albifrons*) (19)

6 données au passage prénuptial du 7 mai au 7 juin 90 ;maxi 46 le 11/5 et 68 le 14/5 Pointe de l'Aiguillon (S.D)

Pas de données de reproduction en 1990 transmises au fichier

Passages d'été à la Pointe de l'Aiguillon du 25 juillet au 16 septembre; maxi 70 le 25/7 et 50-70 le 15/8 La 1ère notée le 21 avril à St Gilles (G.B) et environ 70 ind dans la lagune de Dain; nombre de couples nicheurs non connu (P.R).

GUIFETTE MOUSTAC (*Chlidonias hybrida*) (2)

2 données de 4 ind aux marais de Challans et de Beauvoir le 7 mai 1990 (G.B et P.R)

GUIFETTE NOIRE (*Chlidonias niger*) (42)

La 1ère notée le 4 avril Réserve de Chanteloup (ONC); maxi 21 ind le 13 mai à St Gilles et pas de données de reproduction transmises au fichier.

Passage d'été surtout sur la frange littorale du 3 juillet au 6 octobre ; maxi 7 ind le 20/7.

La dernière le 8 novembre à la réserve de Chanteloup (ONC)

et la 1ère notée le 14 avril à la réserve de St Denis; maxi 80 le 25 avril à la Pointe de l'Aiguillon et 45 le 26 avril à la réserve de St Denis.

3 sites de reproduction en Marais Poitevin; 17 cples ont produit 35 jeunes à la réserve de St Denis (ADEV), 6-7 cples au communal de Lairoux le 24 mai mais l'abandon complet est constaté le 26 mai après des travaux hydrauliques et 6-7 cples au communal d'Angles le 16 mai et abandon complet constaté le 3/7 dû à l'assèchement prématuré de la zone de nidification (Etudes 91 de LPO).

GUIFETTE LEUCOPTERE (*Chlidonias leucopterus*) (2)

2 données d'un ind le 4 mai 1990 à la réserve de St Denis (H.D-ADEV) et un ind le 22 mai 1991 à l'étang des Boucheries (P.B).

GUILLEMOT DE TROIL (*Uria aalge*) (21)

Noté du 20 janvier au 27 mai 1990 sur le littoral du nord de la Vendée et de l'Ile de Noirmoutier; 7 données sur 10 sont des oiseaux morts ou mazoutés; au total: 37 cadavres.

Principalement noté sur le littoral des Sables d'Olonne et de St Gilles Croix de Vie du 13 juillet au 12 janvier 1991; maxi: env 40 ind le 22/8/91 au large des Sables d'Olonne

PETIT PINGOUIN (*Alca torda*) (18)

Noté du 20 janvier au 14 mai 1990 sur le littoral du nord de la Vendée; maxi: +26 le 12 avril à l'Ile d'Yeu et aussi 20 cadavres le 23 février sur la côte ouest de Noirmoutier.

4 données d'un ind le 15/9 et 3/11 Ile de Noirmoutier, le 21/11 Ile d'Yeu, et le 9/12 Plage de Sauveterre.

MERGULE NAIN (*Alle alle*) (4)

Encore 4 cadavres les 17, 18 et 22 février 1990 dans la région des Sables et de Noirmoutier après la tempête du début de février.

1 ind Plage de Sauveterre 1/12 (D.D)

MACAREUX MOINE (*Fratricula arctica*) (4)

Rien que des cadavres en 1990 ; 1 le 5/2 la Terrière, 2 le 23/2 et 1 le 23/5 Ile de Noirmoutier et 2 le 3/3 Plage du Veillon.

PIGEON COLOMBIN (*Columba oenas*) (23)

Observé surtout en migration à la pointe de l'Aiguillon du 1er septembre au 27 octobre. Quelques observations en période de nidification:

1 chant de mâle le 02/04/90 à Beaupaire (L.G.)
les autres du 23/03 au 12/06 dans le marais de la Vie (G.B.)

PIGEON RAMIER (*Columba palumbus*) (33)

Présence régulière toute l'année. Nicheur certain sur tout le département
1 individu albinos à la Flocellière le 27/02/90 (L.G.)
Vol de 10 oiseaux en migration le 27/10/90 à la pointe de l'Aiguillon.

TOURTERELLE TURQUE (*Streptopelia decaocto*) (15)

Présence régulière toute l'année.
Nicheur dans tout le département.

TOURTERELLE DES BOIS (*Streptopelia turtur*) (33)

1ère observation de l'année le 23/04 à Vouvant (P.B.),
dernière observation en migration le 21/10 à la pointe de l'Aiguillon (C.Gn. et C.V.)
Niche surtout dans le bocage et le Marais Poitevin.

COUCOU GRIS (*Cuculus canorus*) (42)

Observé régulièrement dans tout le département
Premier chant de l'année le 19/02/90 (équipe du P.N.R.).
Dernière donnée le 15/06/90 (G.B.)

CHOUETTE EFFRAIE (*Tyto alba*) (70)

Espèce régulière toute l'année sur tout le département.

HIBOU PETIT-DUC (*Otus scops*)

Deux données seulement, toutes deux à Noirmoutier:
7 mâles chanteurs au bois de la Chaize, le 25/05/91 (Ph.R.)
1 chant au bois de la Blanche le 31/03/90 (A.B.)

CHOUETTE CHEVECHE (*Athene noctua*) (17)

Les données sont de la région des Brouzils (M.F. et G.P.), de la Roche sur Yon (S.Ch.), du Marais Breton (G.B.), de la Dive (O.P., S.D.), du Marais Poitevin (T.T.)
Pas d'indice de nidification de ce petit rapace si répandu autrefois.

CHOUETTE HULOTTE (*Strix aluco*) (7)

Peu d'observations pour cet oiseau pourtant commun.

HIBOU MOYEN-DUC (*Asio otus*) (9)

Toutes les données proviennent du Marais Poitevin et de l'Ile d'Yeu.
Une seule donnée de nidification certaine à l'Ile d'Yeu (X.H.)

HIBOU DES MARAIS (*Asio Flammeus*) (21)

Présent toute l'année dans les marais côtiers et le Marais Poitevin.

ENGOULEVENT D'EUROPE (*Caprimulgus europaeus*) (12)

Les observations vont du 30 avril au 1er septembre. Elles proviennent des massifs forestiers (Mervent, Gralas, Parc Soubise) et de la forêt côtière. Parades et chants.

MARTINET NOIR (*Apus apus*) (28)

La 1ère donnée de l'année le 14 avril, la dernière le 21 octobre.
La plupart des données sont de fin avril à fin juillet. Ensuite, les observations d'oiseaux en migration sont rares.

MARTIN PECHEUR (*Alcedo atthis*) (50)

La plupart des observations ont été faites dans les marais côtiers; pourtant l'espèce est bien représentée aussi dans le bocage, toute l'année.
Trois indices de nidification probable (Rocheservière, Aizenay et la Roche sur Yon)

HUPPE FASCIEE (*Upupa epops*) (80)

L'espèce est observée un peu partout dans le département.
Les premiers oiseaux sont signalés le 11/03/90 (S.Ch.) et les derniers le 14/09/90 (G.B.)
Une famille de 7 individus en juin 91 à l'Auroire - Le Poiré sur Vie (A.G.)
Malgré le grand nombre de données, on ne peut pas dire que l'espèce est commune en Vendée.

TORCOL FOURMILIER (*Jynx torquilla*) (3)

Les trois données, de la région côtière, en août (Ph.R., D.P., A.D.-LPO) concernent probablement des oiseaux en migration.

PIC VERT (*Picus viridis*) (30)

Très répandu en toutes saisons, dans tout le département.

PIC EPEICHE (*Dendrocopos major*) (24)

Espèce bien représentée en toutes saisons dans tout le département, avec de nombreux indices de nidification.

PIC EPEICHETTE (*Dendrocopos minor*) (16)

Observé en toutes saisons dans tout le département, moins répandu que le précédent.
Un seul oiseau, observé en migration le 06/10/90 à la pointe de l'Aiguillon.

ALOUETTE CALANDRELLE (*Calandrella brachydactyla*) (4)

Toutes les observations ont été faites dans les dunes de la pointe de l'Aiguillon (N.P., P.M., S.D.).
Pas d'indice de nidification, malgré une observation en mai.

COCHEVIS HUPPE (*Galerida cristata*) (36)

Presque toutes les données proviennent de la côte ou du sud du département.
Aucune observation dans le bocage.
L'espèce est présente toute l'année.

ALOUETTE LULU (*Lullula arborea*) (22)

Observée toute l'année sur la côte et dans le bocage.
Plusieurs mâles chanteurs signalés en hiver.

ALOUETTE DES CHAMPS (*Alauda arvensis*) (24)

Présente en toutes saisons dans tout le département, mais la plupart des données concernent la côte ou le Marais Poitevin.
10 données d'oiseaux en migration à la pointe de l'Aiguillon avec un maximum de 1.900 oiseaux le 21/10/90 (C.Gn. et C.V.)

HIRONDELLE DE RIVAGE (*Riparia riparia*) (49)

Toutes les données concernent des oiseaux en migration.
Première donnée de l'année le 28/02/91 (O.N.C. Chanteloup).
Première donnée de migration post-nuptiale le 04/08/90 (pointe de l'Aiguillon)
Dernière donnée le 30/09 (C.etJ.Gn., C.V., P.M.).
Migration post-nuptiale très importante à la pointe de l'Aiguillon avec un maximum de 4.282 oiseaux le 01/09/90 (C.Gn.)

HIRONDELLE RUSTIQUE (*Hirundo rustica*) (105)

Présente dans tout le département de mars à octobre.
Première donnée de l'année, le 13/03/90, dans les marais de la Vie (G.B.)
Dernière donnée le 01/11/90 (C. et J.Gn.)
1 donnée hivernale le 06/01/91 (P.P.E./GODS)
Les arrivées importantes ont lieu début avril et les premiers départs début septembre.
Opération migration à la pointe de l'Aiguillon: un maximum de 24.381 oiseaux le 16/09/90 (C.etJ.Gn., C.V., P.M.)

HIRONDELLE DE FENETRE (*Delichon urbica*) (34)

On la rencontre dans tout le département, mais en moins grand nombre que la précédente.
Fréquente les agglomérations.
La première donnée de l'année le 23/03/91 (R.R. et T.T. PNR).
La dernière le 30/09.
Les arrivées importantes ont lieu à la fin d'avril.
Opération migration à la pointe de l'Aiguillon: maximum de 140 le 16/09/90 (C.etJ.Gn., C.V., P.M.).

PIPIT ROUSSELIN (*Anthus campestris*) (16)

Toutes les observations ont été faites dans les dunes côtières, de l'Aiguillon aux Sables-d'Olonne.
Un seul indice de nidification certaine à La Chaume.
Première donnée de l'année, le 25/04/90 (G.B.)
Dernière le 06/10/90 en migration à la pointe de l'Aiguillon.

PIPIT DES ARBRES (*Anthus trivialis*) (17)

Il a été observé au printemps à proximité des massifs forestiers et dans le Marais Poitevin.
Première observation de l'année le 28/03/90 à Puy de Serre (J.D.).
Dernière observation le 10/10/90 aux Agaures (D.D.).
Une seule donnée de nidification à Xanton-Chassenon.
La migration post-nuptiale commence dès le mois d'août (Ile d'Yeu le 03/08/90 X.H.)

PIPIT FARLOUSE (*Anthus pratensis*) (27)

Observé surtout d'octobre à mars, dans le bocage et dans la plaine.
En période de nidification, les données le mentionnent au Poiré-sur-Velluire (C.Gn.), dans la baie de l'Aiguillon (S.D.), sur les dunes du Jaunay (G.B.) et à l'Ile d'Yeu (X.H.).
On observe la migration post-nuptiale à la pointe de l'Aiguillon du 15 septembre à la fin d'octobre. Un maximum de 4.700 oiseaux le 21/10/90 (C.Gn. et C.V.).

PIPIT MARITIME (*Anthus spinoletta petrosus*) (25)

Quelques individus observés l'hiver dans le bocage.
En période de nidification, quelques observations à l'Aiguillon et à Saint-Gilles-Croix-de-Vie (G.B.)
Commun en toutes saisons à l'Ile d'Yeu (X.H.)

BERGERONNETTE PRINTANIERE (*Motacilla flava flava*) (73)

Toutes les données proviennent des marais côtiers et du Marais Poitevin, de mars à octobre.
Indices de nidification: Beauvoir, Marais de la Vie, Baie de l'Aiguillon.
Première donnée de migration de printemps le 23/03/90 à Port-la-Roche (A.B.)
Dernière donnée le 27/10/90.
Les premières observations de migration post-nuptiale à partir du 04/08 à la pointe de l'Aiguillon (L.G.).

BERGERONNETTE FLAVEOLE (*Motacilla flava flavissima*) (7)

1 observation le 10/04/90 près de Pouzauges (B.P.), toutes les autres en avril, mai et septembre dans les marais de la Vie (G.B.)

BERGERONNETTE GRISE (*Motacilla alba*) (62)

Observée toute l'année dans tout le département.

L'hiver, se groupent en dortoirs (plus de 1.000, en novembre 90, place de la Vendée à la Roche-sur-Yon (L.G.), il s'agit probablement d'oiseaux du type Yarrell).

1 individu albinos à l'étang de la Ramisardière le 25/02/90 (B.P.)

La migration post-nuptiale à la pointe de l'Aiguillon, a lieu du début septembre à la fin octobre, par petits groupes éparés de 3 à 10 individus. Maximum de 78 le 14/10/90 (C.Gn. et C.L.)

BERGERONNETTE DE YARRELL (*Motacilla alba Yarrelli*) (29)

Nombreuses données de novembre à avril, alors qu'à cette époque, les données du type alba sont rares.

Une donnée précoce le 27/07/90 à La Chaume (D.D.)

Aucun indice de nidification.

BERGERONNETTE DES RUISSEAUX (*Motacilla cinerea*) (31)

L'espèce est observée toute l'année en Vendée, dans le bocage, le Marais Poitevin et les marais côtiers.

Un individu en migration post-nuptiale le 06/10/90 à la pointe de l'Aiguillon (C.Gn., C.V., L.G.)

TROGLODYTE MIGNON (*Troglodytes troglodytes*) (15)

Régulier en toutes saisons dans tout le département.

ACCENTEUR MOUCHET (*Prunella modularis*) (12)

Commun en toutes saisons dans tout le département.

ROUGE-GORGE FAMILIER (*Erithacus rubecula*) (20)

Commun en toutes saisons dans tout le département. Devient discret de juillet à août. Observé en migration à la pointe de l'Aiguillon: 5 individu le 21/10/90 (C.G. C.V.)

ROSSIGNOL PHILOMELE (*Luscinia megarhynchos*) (33)

Presque toutes les données sont des chants de mâles, aussi bien en bocage que dans les marais. Premier chant, réserve de Chanteloup, le 18/03/90 (O.N.C.)

La dernière donnée de l'année, est une capture à l'écluse du Braud le 31/08/90 (A.D.-LPO)

GORGE-BLEUE A MIROIR (*Luscinia svecica cyaneola*) (44)

De nombreuses observations, (2 à 10 oiseaux pour chaque donnée) uniquement sur la côte et

les marais côtiers.

Première donnée de l'année, le 10/03/90 dans la baie de l'Aiguillon (O.P. et Ph.R.)

Et la dernière le 05/09/90 à la pointe de l'Aiguillon (S.D.)

ROUGE-QUEUE NOIR (*Phoenicurus ochruros*) (26)

Observé en toutes saisons sur la côte.

Quelques observations en ville.

Observé en migration à l'Ile d'Yeu le 21/08/90 (X.H.)

ROUGE-QUEUE A FRONT BLANC (*Phoenicurus phoenicurus*) (13)

La plupart des observations sont des oiseaux en migration de printemps, en avril, ou post-nuptiale, en août et septembre.

Aucun indice certain de nidification malgré 4 observations en période de nidification: le 04/05/91 à Pouzauges (B.P.), le 15/05/91 à Xanton-Chassenon (PNR), le 08/06/91 en forêt de Gralas (G.etY.R.) et un mâle chanteur du 28/04/90 au 05/07/90 aux Herbiers (S.R.)

TARIER D'EUROPE (*Saxicola rubetra*) (27)

Observé en Vendée de mars à octobre.

Première donnée de l'année le 10/03/90 à Curzon (C.Gn.)

Dernière le 20/10/90 à Orouet (G.B.)

La plupart des observations sont faites à la migration post-nuptiale de juillet à septembre.

2 indices de nidification: Le Poiré-sur-Velluire (C.Gn.) et le marais d'Olonne.

TARIER PATRE (*Saxicola torquata*) (61)

Les données proviennent de tout le département et en toutes saisons.

A l'Ile d'Yeu, il est régulier jusqu'au 31/08.

Ailleurs aussi, mais il devient moins commun en hiver.

TRAQUET MOTTEUX (*Oenanthe oenanthe*) (62)

La plupart des observations ont été faites sur la côte et les marais côtiers, sauf 4 dans le bocage et 2 dans la plaine.

La 1ère observation de l'année est du 17/03/90 aux Magnils-Reigniers (C.Gn.)

La dernière du 30/10/90 au Moulin-Papon (S.Ch.)

Malgré sa présence régulière d'avril à août, dans le Marais Poitevin et à l'Ile d'Yeu (X.H.), aucune donnée de nidification.

MERLE A PLASTRON (*Turdus torquatus*) (2)

Une donnée de 2 individus, le 10/04/90 au Poiré-sur-Velluire (C.Gn.)

Une donnée de 1 individu, encore au Poiré-sur-Velluire, l'année suivante, le 24/04/91 (C.Gn.)

MERLE NOIR (*Turdus merula*) (20)

Très commun en toutes saisons dans tout le département.

Première donnée de nidification en 1990 le 25/02 à Rocheservière (L.G.)

GRIVE LITORNE (*Turdus pilaris*) (18)

Commune chaque hiver dans tout le département, en bandes (maximum de 200 oiseaux (M.Ch.))

Première observation de l'année le 02/11/90 (G.B.)

La dernière le 17/03/91 à Beugné (C.Gn.)

GRIVE MUSICIENNE (*Turdus philomelos*) (20)

Des observations presque toute l'année, sauf du 01/08 au 07/10.

L'espèce, très commune avant l'hiver rude de 1985, est devenue presque rare au printemps comme en hiver.

Quelques indices de nidification.

GRIVE MAUVIS (*Turdus iliacus*) (12)

Comme chaque hiver en groupes importants. Maximum de 2 à 300 le 25/11/90 au Poiré-sur-Velluire (C.Gn.)

Première observation de l'année le 29/09/90 (G.B.)

Dernière le 12/02/91 (G.B.)

GRIVE DRAINE (*Turdus viscivorus*) (17)

L'espèce est présente toute l'année, sur tout le département.

BOUSCARLE DE CETTI (*Cettia cetti*) (17)

Fréquente dans les milieux humides avant l'hiver de 1985, l'espèce n'est commune aujourd'hui que sur l'île d'Yeu (X.H.)

Quelques chanteurs sur la côte et un dans le bocage, à Chantonnay le 14/04/90 (G-L.Ch.)

CISTICOLE DES JONCS (*Cisticola juncidis*) (5)

Une donnée, à la Belle-Henriette, le 16/04/90 (G-L.Ch.)

4 mâles chanteurs à la Faute le 14/08/90 (N.P.)

1 chant à l'Épine le 28/04/91 (L.G. et J.P.)

2 autres à l'Épine le 07/05/91 (Ph.R.)

LOCUSTELLE TACHETÉE (*Locustella naevia*) (4)

Un mâle chanteur à Vairé le 16/04/90 (D.D.)

3 captures à l'écluse du Braud, le 27,28 et 30/08/90 (A.D.-LPO)

LOCUSTELLE LUSCINIOÏDE (*Locustella luscinioides*) (5)

3 données en mai 90 en baie de Bourgneuf (G.B., Ph.R., A.B.)

1 donnée à Port-la-Roche le 31/03/91 (A.B.)

1 capture à l'écluse du Braud le 26/08/90 (A.D.-LPO)

PHRAGMITE DES JONCS (*Acrocephalus schoenobaenus*) (17)

L'espèce est commune dans les marais côtiers du début avril au 15 septembre.

79 captures en 5 séances de baguage à l'écluse du Braud, du 26 au 30/08/90 (A.D.-LPO)

PHRAGMITE AQUATIQUE (*Acrocephalus paludicola*) (1)

Une seule capture à l'écluse du Braud le 26/08/90 (A.D.-LPO)

ROUSSEROLLE EFFARVATTE (*Acrocephalus scirpaceus*) (23)

Espèce très commune dans les marais côtiers du 14/04 au 05/10.

46 mâles chanteurs pour 7 points d'écoute en juin 1990, canal de Vienne (Ph.R.)

513 captures en 6 séances de baguage à l'écluse du Braud du 25 au 30/08/90 (A.D.-LPO)

ROUSSEROLLE TURDOÏDE (*Acrocephalus arundinaceus*) (7)

Observée en avril et en mai à Orouet (G.B. et Ph.R.)

1 mâle chanteur dans le communal de St-Denis-du-Payré le 04/05/91 (G-L.Ch.)

HYPOLAIS POLYGLOTTE (*Hyppolais polyglotta*) (21)

Des données du bocage, des marais de la Vie et de la Chaume.

La 1ère observation de l'année le 01/05/90 à Puy-de-Serre (J.D.)

La dernière le 05/10/90 aux Sables d'Olonne (D.D.)

5 captures à l'écluse du Braud, en 3 séances de baguage, les 27,28 et 29/08/90 (A.D.)

FAUVETTE PITCHOU (*Sylvia undata*) (10)

Les observations proviennent des dunes côtières, de l'île d'Yeu, où elle est régulière jusqu'au 31/08 (X.H.) et de quelques landes du bocage.

Aucune donnée de novembre à février, pourtant l'espèce hiverne en Vendée.

Des indices de nidification certaine à Olonne et à la Chaume.

FAUVETTE GRISETTE (*Sylvia communis*) (37)

De nombreuses données de mâles chanteurs dans tout le département.

Première donnée de l'année le 25/03/90 à Puy-de-Serre (J.D.)

La dernière à l'île d'Yeu le 31/08/90 (X.H.)

19 captures en 5 séances de baguage à l'écluse du Braud du 26 au 30/08/90 (A.D.-LPO)

FAUVETTE DES JARDINS (*Sylvia borin*) (18)

Des données de mâles chanteurs un peu partout du 26/03/90 au 31/08/90.

38 captures en 5 séances de baguage à l'écluse du Braud du 26 au 30/08/90 (A.D.-LPO)

FAUVETTE A TÊTE NOIRE (*Sylvia atricapilla*) (30)

Nombreuses données provenant de toutes les zones de Vendée. Aucune donnée au fichier de novembre à février, pourtant quelques oiseaux hivernent régulièrement dans le département.

POUILLOT DE BONELLI (*Phylloscopus bonelli*) (1)

Une seule donnée, le 25/05/90 en forêt de Gralas (S.Ch.)

POUILLOT SIFFLEUR (*Phylloscopus sibilatrix*) (1)

Une seule donnée à Orouet, les 24 et 30/05/90 (G.B.)

POUILLOT VELOCE (*Phylloscopus collybita*) (38)

Nombreuses observations dans tout le département en toutes saisons.
2 observations du type abietinus à l'île d'Olonne le 18 et le 19/11/90 (D.D.)

POUILLOT FITIS (*Phylloscopus trochilus*) (20)

Les données sont de la migration pré-nuptiale en mars et avril (1er chant le 18/02/90 (C.Gn.)) et de la migration post-nuptiale en août et septembre (dernière observation à la Faute le 30/09/90 (J-C.C.))

Aucun indice de nidification

99 captures en 4 séances de baguage à l'écluse du Braud du 27 au 30/08/90 (A.D.-LPO)

11 pouillots sp. en migration à la pointe de l'Aiguillon le 21/10/90 (L.G., C.Gn., C.V.)

ROITELET HUPPE (*Regulus regulus*) (9)

Toutes les données sont de l'hiver, réparties dans tout le département.
Pourtant deux données de nidification probable à Rocheservière (L.G.) et à Beaulieu-sous-la-Roche.

ROITELET TRIPLE-BANDEAU (*Regulus ignicapillus*) (14)

Presque toutes les données sont encore de l'hiver, sauf une le 23/05/90 à Noirmoutier (A.B.), une à l'île d'Yeu, avec un indice de nidification certaine, en avril 1990 (L.G.) et une le 30/04/90 au Creux-Jaune (A.G.)

6 roitelets sp. en migration à la pointe de l'Aiguillon le 21/10/90 (C.Gn., C.V.)

GOBE-MOUCHE GRIS (*Muscicapa striata*) (27)

Toutes les données de fin avril à fin septembre.
La plupart proviennent des régions côtières.

GOBE-MOUCHE NOIR (*Ficedula hypoleuca*) (39)

4 données seulement du printemps 1990 (23/04, 01/05, 05/05, 22/06), toutes les autres sont des oiseaux en migration post-nuptiale du 09/07/90 au 27/09/90.

Aucun indice de nidification.

PANURE A MOUSTACHES (*Panurus biarmicus*) (9)

Presque toutes les observations ont été faites l'hiver, du 07/01/90 au 23/03/90, sauf une du 22/05/90, avec un indice de nidification certaine, à Port-la-Roche (A.B.)

Des oiseaux ont été observés à la Belle-Henriette, aux Agaures, à Port-la-Roche et à Orouet.

MESANGE A LONGUE QUEUE (*Aegithalos caudatus*) (33)

L'espèce est observée dans tout le département et en toute saisons.
Une construction de nid le 10/03/90 (G.B.)

MESANGE NONNETTE (*Parus palustris*) (11)

La plupart des observations proviennent des massifs forestiers (forêt de Mervent, parc Soubise)
3 données d'hiver: janvier (S.R.), novembre (G.B.), décembre (Ph.M.), les autres sont de mars, avril et septembre.

2 indices de nidification: région de la Roche-sur-Yon et région de Mouchamps.

MESANGE HUPPEE (*Parus cristatus*) (16)

Presque toutes les données proviennent de la forêt côtière de pins, sauf des données à la Ferrière (J-C.C.), les Herbiers (S.Ch.), Mervent (Ph.M.), Vouvant (J.D.), Gralas (S.Ch.)

Les 2/3 des données sont de l'hiver.

Un indice de nidification à Vouvant (J.D.)

MESANGE REMIZ (*Remiz pendulinus*) (33)

Presque toutes les observations ont été faites aux agaures, et 3 à Port-la-Roche: du 07/10/90 au 31/03/91 (D.D., G.B., A.B., A.Ba., L.A., A.L. et O.Pe.).

Les oiseaux sont seuls ou en groupe (maximum 15 le 21/10/90 (G.B.)).

Pas d'indice de nidification.

MESANGE BLEUE (*Parus caeruleus*) (34)

Commune en toutes saisons dans tout le département.

MESANGE CHARBONNIERE (*Parus major*) (38)

Présente en toutes saisons dans tout le département.

Première observation de construction de nid le 24/03/90.

SITTELE TORCHEPOT (*Sitta europaea*) (16)

Observée en toutes saisons, surtout dans les massifs forestiers.

Des observations aussi dans la région de la Roche-sur-Yon en mars et juin (O.P.), à l'île d'Yeu (1 seule observation le 13/05/90: sortie du GOV), à Luçon le 01/08/90 (O.P.).

Un seul indice de nidification (O.P.), ce qui peut s'expliquer par la discrétion de l'oiseau à cette période.

GRIMPEREAU DES JARDINS (*Certhia brachydactyla*) (23)

Commun en toutes saisons dans tout le département.

LORIENT D'EUROPE (*Oriolus oriolus*) (30)

Presque toutes les données sont des mâles chanteurs, elles viennent du Marais Poitevin, des massifs forestiers, mais aussi des environs de la Roche-sur-Yon (les bords de l'Yon).
Les premiers chants sont du 29/04/90 au Poiré-sur-Velluire (D.C.) et à Jard-sur-Mer (S.Ch.).
La dernière observation est du 26/08/90 (P.B.) à Vouvant.

PIE GRIECHE ECORCHEUR (*Lanius collurio*) (26)

La plupart des données sont du Marais Poitevin.
6 observations dans le bocage: Les Herbiers, Saint-Fulgent, Les Essarts, Chantonay, Vouvant.
2 observations à l'île d'Yeu et une à la Chaume.
La première observation de l'année est du 24/04/90 à Saint-Fulgent (J-C.P.).
La dernière le 28/08/90 aux Magnils.
Un indice de nidification à Chantonay le 27/05/90 (G-L.CH. et A.R.)

PIE GRIECHE A TETE ROUSSE (*Lanius senator*) (10)

3 observations à l'île d'Olonne les 31/07, 18/08 et 28/09/90, de juvéniles en migration post-nuptiale. Les autres données sont du Marais Poitevin, en mai, juin et juillet.
1 juvénile le 22/08/90, à Grand-Landes (M.B., A.G.).
1 indice de nidification certaine au Poiré-sur-Velluire.

GEAI DES CHENES (*Garrulus glandarius*) (9)

Peu de données pour cet oiseau, commun partout dans le département et en toutes saisons.

PIE BAVARDE (*Pica pica*) (11)

Très commune en toutes saisons dans tout le département.
L'hiver, on observe des rassemblements en dortoirs dans certains bois du bocage, avec parfois une centaine d'individus.

CHOUCAS DES TOURS (*Corvus monedula*) (7)

Très commun en toutes saisons, surtout à proximité des agglomérations où il niche.
L'hiver, se mélange fréquemment aux dortoirs de freux.

CORBEAU FREUX (*Corvus frugilegus*) (8)

Commun un peu partout en hiver. Se regroupe le soir en dortoirs très importants.
Au printemps, on ne le rencontre qu'au voisinage des corbeautières, dans les régions suivantes: Coex, Montaigu, Bazoges-en-Pailers, Saint-Laurent-sur-Sèvre, Auzay, l'Hermenault, le Poiré-sur-Velluire (maximum de nids observés: 294 dans la corbeautière d'Auzay (Ph.M.))

CORNEILLE NOIRE (*Corvus corone*) (17)

Commune partout et en toutes saisons, en couples ou en petits groupes.
Quelques oiseaux en migration à la pointe de l'Aiguillon, en octobre, en petits vols.

ETOURNEAU SANSONNET (*Sturnus vulgaris*) (44)

Très commun en toutes saisons. Les très grandes bandes d'hivernants s'observent à partir de la fin octobre. Elles disparaissent début mars.
Nombreuses données de migrateurs à la pointe de l'Aiguillon, de début septembre à la fin octobre, avec un maximum de 3.492 le 21/10/90 (C.Gn., C.V.)

MOINEAU DOMESTIQUE (*Passer domesticus*) (13)

Le plus commun de nos passereaux.
2 données d'oiseaux en migration à la pointe de l'Aiguillon dont un vol de 70 le 06/10/90 (C.Gn., C.V., L.G.)

MOINEAU FRIQUET (*Passer montanus*) (4)

Commun par endroit: Moulleron-le-Captif (O.P.), Les Landes-Génusson (L.G.).

MOINEAU SOULCIE (*Petronia petronia*) (9)

Toutes les données sont du sud du département: Fontenay-le-Comte (Ph.M.), Nalliers (CPN), Mouzeuil (J-C.L.), le Langon (T.T. et R.R.).
Les observations sont faites en toutes saisons.

PINSON DES ARBRES (*Fringilla coelebs*) (41)

Très commun en toutes saisons. Grands rassemblements d'hivernants dans les champs récoltés de maïs-grain et de tournesol.
Importante migration à la pointe de l'Aiguillon de fin septembre à fin octobre. Maximum de 3.373 oiseaux le 21/10/90 (C.Gn. et C.V.).

PINSON DU NORD (*Fringilla montifringilla*) (10)

Peu de données en 1990 qui n'a pas eu d'hiver froid.
La première observation d'hivernants a eu lieu le 22/10/90 à Terrière-Plage (J-C.C.).
La dernière de l'année, le 05/04 (S.Ch.)

SERIN CINI (*Serinus serinus*) (10)

Les données du printemps et de l'été proviennent d'un peu partout dans le département.
Les observations les plus nombreuses sont faites à partir d'avril.
Quelques oiseaux hivernent sur la côte et à Noirmoutier.

VERDIER D'EUROPE (*Chloris chloris*) (31)

Commun dans tout le département en toutes saisons.
Plusieurs observations de bandes d'hivernants (20 à 40 oiseaux) à la Belle-Henriette (S.D.) et dans le bocage.
Données de migrateurs à la pointe de l'Aiguillon, en petits groupes de 3 à 10 oiseaux, en octobre. Maximum: 393 le 23/10/90 (B.P.)

CHARDONNERET ELEGANT (*Carduelis carduelis*) (47)

Très commun, surtout au printemps et en été. Plusieurs données de bandes importantes d'hivernants à Lairoux (C.Gn.), à Noirmoutier (Ph.R.), à la Roche-sur-Yon (S.Ch.). Des données de migration importante à la pointe de l'Aiguillon, souvent en vols mixtes linottes-chardonnerets, du 15 septembre à la fin octobre. Maximum: 5.925 le 21/10/90 (C.Gn. et C.V.).

TARIN DES AULNES (*Carduelis spinus*) (18)

Toutes les données sont de l'automne et de l'hiver.

Première observation le 03/10/90 à la Roche-sur-Yon (S.Ch.).

La dernière à Mouilleton-le-Captif le 13/03 (O.P.).

Les données de migration à la pointe de l'Aiguillon sont en octobre. Maximum: 254 le 06/10/90 (C.Gn. et C.V.).

LINOTTE MELODIEUSE (*Acanthis cannabina*) (54)

Espèce très commune, surtout au printemps et en été.

Des hivernants sont observés en bandes nombreuses, mélangées à des chardonnerets et des pinsons.

Migration observée à la pointe de l'Aiguillon, du début septembre au début novembre.

Les données les plus importantes sont en octobre avec un maximum de 21.950, le 21/10/90! (C.Gn. et C.V.).

BEC CROISE DES SAPINS (*Loxia curvirostra*) (5)

Quelques données seulement de septembre à novembre: une donnée en vol le 10/09/90 au Poiré-sur-Vie (A.G.), en migration à Noirmoutier le 19/09/90 et à la Chaume le 22/10/90 et le 06/11/90 (D.D.). Au bois des Jarries, le 27/11/90 et le 30/11/90 (B.P.).

BOUVREUIL PIVOINE (*Pyrrhula pyrrhula*) (21)

Observé surtout dans le bocage, à Noirmoutier et à l'île d'Yeu, où il est régulier jusqu'au 31/08 (X.H.). Il est relativement rare ailleurs.

Une donnée au Poiré-sur-Velluire, le 24/03/90 (équipe du PNR), et une autre à Nalliers le 01/04/90 (C.Gn.).

GROS BEC (*Coccothraustes coccothraustes*) (3)

Deux données en hiver: à l'Angle-Guignard (5 oiseaux), le 20/02/90 (G-L.Ch.) et 2 à Fontenay-le-Comte le 06/03/90 (Ph.M.).

Une autre au printemps: 3 individus à Vouvant le 07/05/90 (J.D.).

Pas d'indice de nidification.

BRUANT LAPON (*Calcarius lapponicus*) (2)

Un groupe de 7 oiseaux observés sur la lagune de Bouin le 19/01/91 (D.D.).

Un mâle en plumage nuptial, au communal de Mouzeuil le 21/05/91 (R.R. et T.T.).

BRUANT DES NEIGES (*Plectrophenax nivalis*) (4)

4 données d'hiver, en bordure de mer: en novembre à Noirmoutier, la pointe de l'Aiguillon et à la Faute (A.B., CEBAS de Beauvoir-sur-Niort, J-C.C.), en février dans les marais de la Vie (G.B.).

BRUANT FOU (*Emberiza cia*) (1)

Une seule donnée, deux jours de suite, au Poiré-sur-Velluire les 13 et 14/02/91 (C.Gn.).

BRUANT JAUNE (*Emberiza citrinella*) (17)

Commun dans le Marais-Poitevin et certaines régions du bocage, surtout au printemps et en été.

Quelques données d'hivernage: à Xanton-Chassenon le 10/02 et le 10/03/90 (G.B.).

BRUANT ZIZI (*Emberiza cirrus*) (20)

Commun un peu partout dans le département.

Les données montrent qu'il est présent en toutes saisons, avec un maximum d'observations au printemps (mâles chanteurs).

BRUANT DES ROSEAUX (*Emberiza schoeniclus*) (42)

Commun dans les marais côtiers ou au bord des étangs du bocage en toutes saisons. Diminution des données en hiver. 24 captures en 6 opérations de baguage à l'écluse du Braud, du 25 au 30/08/90 (A.D.-LPO).

Observé en migration à la pointe de l'Aiguillon, en octobre, en petits groupes épars de 2 à 6 individus. Maximum: 27 oiseaux le 27/10/90 (C.V., L.G., T.T.).

BRUANT ORTOLAN (*Emberiza hortulana*) (3)

Observé en migration, en août et septembre: 1 capture le 28/08/90 à l'écluse du Braud (A.D.-LPO).

15 individus à l'île d'Yeu le 28/08/90.

Une femelle juvénile au Sables d'Olonne le 26/09/90 (D.D.).

BRUANT PROYER (*Emberiza calandra*) (11)

Toutes les données sont du sud du département. Quelques observations en hiver dans le Marais Poitevin: Chaix (Ph.M.), Mouzeuil (J-C.L.), le Poiré-sur-Velluire (Ph.M. et A.Bu.).

Observé en migration à la pointe de l'Aiguillon, en petits groupes: 22 individus le 06/10/90 (C.Gn., C.V., L.G.).