

# La Gorgebleue 2.0

Les articles et notes de  
[www.faune-vendee.org](http://www.faune-vendee.org)

Référence : 001-FV2012



## Observation d'un Venturon montagnard *Serinus citrinella* à l'île d'Yeu : première donnée vendéenne

Xavier HINDERMEYER, Olivier PENARD & Frédéric PORTIER

Citation : HINDERMEYER X., PENARD O., PORTIER F., 2012. Observation d'un Venturon montagnard *Serinus citrinella* à l'île d'Yeu : première donnée vendéenne. *La Gorgebleue 2.0*, 001-FV2012, 2 p. [www.faune-vendee.org](http://www.faune-vendee.org).

### Introduction

Espèce monotypique à distribution restreinte, le Venturon montagnard (*Serinus citrinella*) niche dans les montagnes, du Centre de la péninsule Ibérique à la Forêt-Noire et à l'Autriche. En France, elle est présente dans les Pyrénées, les Alpes, le Massif central, les Vosges et le Jura (Géroudet 1980, Dubois et al. 2008).

A l'automne 2006, nous avons la chance de découvrir un venturon montagnard dans la dépression de la dune de la Grande Conche sur l'île d'Yeu, Vendée (N 46°43' W 02°20'). Il s'agit de la première observation de l'espèce sur l'île mais également de la première mention vendéenne.

### L'observation

Le 26 octobre 2006, en début d'après-midi, nous prospectons la petite dépression située dans la dune de la Grande Conche (non loin de la pointe des Corbeaux), au sud-ouest de l'île. Au bord de la petite friche, située à l'entrée de la zone, quelques fringilles se nourrissent à terre. Il s'agit principalement de

chardonnerets élégants (*Carduelis carduelis*) mais l'un des oiseaux, beaucoup plus "vert", attire tout de suite notre attention.

Il s'agit d'un fringille de petite taille, proche de celle d'un chardonneret élégant ou d'un tarin des aulnes (*Carduelis spinus*). Aux jumelles, la face, le ventre et le croupion (bien visibles en vol) apparaissent jaune verdâtre. En revanche, l'arrière de la calotte, la nuque, les côtés du cou, le haut de la poitrine et des flancs sont gris. Le dos est gris verdâtre uniforme, non strié. Les ailes sont foncées avec deux barres alaires bien nettes. Enfin, le bec est gris, assez long et relativement pointu, et les pattes rosâtres.

L'oiseau, assez farouche, se nourrit à terre mais s'envole et se pose dans un Pin maritime (*Pinus pinaster*) lorsqu'il est dérangé et peut y rester un long moment avant de redescendre.

Malgré la surprise d'une telle observation, il n'y a pas de doute : il s'agit d'un mâle adulte de Venturon montagnard. Nous pourrions observer l'oiseau par intermittence pendant une partie de l'après-midi et quelques photographies seront même réalisées. Mieux, l'oiseau se mettra à chanter à deux reprises !

Malheureusement, il ne sera pas retrouvé le lendemain, malgré des recherches actives.



La LPO Vendée fait partie du réseau VisioNature.

Grâce aux technologies Internet, débutants, amateurs et professionnels naturalistes, peuvent partager en temps réel leur découverte et ainsi améliorer la connaissance et la protection de la faune.





Dépression où a été observé l'individu.  
Photo © Marie-Paule Hindermeier



Venturon montagnard (*Serinus citrinella*), île d'Yeu, 26/10/2006.  
Photo © Frédéric Portier

## Discussion

Il est bien difficile de savoir d'où venait exactement cet oiseau. En effet, le Venturon montagnard est plutôt sédentaire. Il effectue toutefois des déplacements à l'automne et au printemps. Ainsi, des venturons originaires de l'est du Massif alpin franchissent les cols et gagnent le Sud-Est de la France, essentiellement les reliefs de moyenne altitude, dans la Drôme, le Vaucluse et le Languedoc. L'espèce franchit régulièrement la Durance en petit nombre mais ne dépasse qu'exceptionnellement les Alpilles. Enfin, le baguage a montré que certains individus atteignent les Pyrénées et l'Espagne (Dubois et al. 2008).

Les conditions météorologiques des jours précédents (vents de sud marqués) ont peut-être favorisé cette observation complètement inattendue.

Cette donnée est l'une des rares mentions de l'espèce loin des zones de reproduction et d'hivernage classiques. Il faut tout de même signaler une autre observation sur la côte Atlantique, avec un mâle, le 10 février 1980, à Trévignon (Finistère). Quelques autres données proviennent de Champagne-Ardenne (hiver 1984-1985), du Loiret (6 janvier 1996), de Saône-et-Loire (entre 1997 et 1999) et du littoral Méditerranéen (Dubois et al. 2008).

Il s'agit donc seulement de la deuxième mention connue de l'espèce sur la côte Atlantique et de sa première mention vendéenne. Elle a été homologuée par le Comité d'Homologation Départemental vendéen (CHD 85) (Portier *et al.*, à paraître). L'île d'Yeu s'impose donc de plus en plus comme un lieu privilégié pour de telles observations exceptionnelles.

## Bibliographie

Dubois Ph.-J., Le Maréchal P., Oliosio G. & Yésou P., 2008. *Nouvel inventaire des Oiseaux de France*. Delachaux & Niestlé, 560 p.

Geroudet P., 1980. *Les passereaux. Tome 3 : des pouillots aux moineaux. Troisième édition*. Delachaux et Niestlé, Neuchâtel-Paris, 283 p.

Xavier HINDERMEYER  
24 boulevard Gabriel Guist'hau  
44000 NANTES  
xavier.hindermeier@gmail.com

Olivier PENARD  
15, rue des Eglantines  
44760 LES-MOUTIERS-EN-RETZ  
o.penard@orange.fr

Frédéric PORTIER  
144 rue Georges Clemenceau  
85190 VENANSAULT  
frederic-nadege.portier@orange.fr