

LE MOINEAU SOULCIE *PETRONIA PETRONIA*
A FONTENAY-LE-COMTE EN VENDEE

C'est le 27 février 1985 que je rencontrai pour la première fois le Moineau soulcie *Petronia petronia* à Fontenay-le-Comte. A 7 h du matin je découvrais un mâle chantant sur mon toit mais j'étais loin de me douter que ce chant si gai et énergique allait me devenir familier.

Il me fallut ensuite attendre le 14 mars avant de rencontrer de nouveau cet oiseau et alors, en plus de celui qui devait être mon réveil-matin jusqu'à fin mai, je découvris deux autres mâles chantant à proximité de l'église Notre-Dame. C'est dans ce vieux quartier où la pierre est encore épargnée par le crépi, que je trouvai le maximum de Soulcies, soit guère plus de 5 couples. Néanmoins il me fut possible de rencontrer d'autres oiseaux isolés, probablement nicheurs aussi, en d'autres points de la ville, sur des cheminées de vieux bâtiments, et même un mâle qui, jusqu'à fin juillet, chantait devant une cavité dans un mur de hangar, à moins d'un mètre cinquante du sol.

Je pense que la population fontenaisienne de cette espèce doit être d'environ une quinzaine de couples. La nidification ne fait pas de doute: le 12 juillet j'observai, depuis ma fenêtre, un jeune individu se faisant nourrir par l'un des parents. Pendant le mois de juillet, alors que les oiseaux ne chantent plus véritablement mais qu'ils émettent des appels incessants à proximité des nids, j'ai pu entendre un oiseau à Pissotte et un autre à St Michel-le-Cloucq. Ma dernière observation de cette espèce date du 18 août, il s'agissait de 4 individus en vol.

J'espère que le printemps prochain ramènera ces oiseaux à Fontenay-le-Comte et qu'à l'avenir l'observation du Moineau soulcie dans cette ville n'aura pas un caractère exceptionnel.

Michel CLEMOT
16 bis rue Benjamin Fillon
85000 Fontenay-le-Comte

Note de la rédaction: les observations de M. Clémot sont d'autant plus intéressantes que nous n'avons que très peu de données sur cet oiseau en Vendée.

Yeatman (1976) indique le Moineau soulcie comme nicheur certain sur les cartes de l'I.G.N. au 1/50 000 ème de Luçon (13.27) et de Chantonnay (14.26). Dans son premier Atlas des Oiseaux Nicheurs de Vendée, le G.O.V. (1982) le considère comme nicheur possible sur la seule carte de Luçon, et dans sa deuxième édition, G.O.V. (1985), comme nicheur possible sur cette même carte, et nicheur probable sur celle de Fontenay-Le-Comte (14.27). C'est dans cette ville que J.M. Boutin nous signale l'oiseau en 1984 et 1985. Audurier et Boutin (1983) font état de données plus anciennes concernant la Vendée (BON: 1 ind. le 16 janvier 1960 et 4 le 4 juillet 1960 à St Jean-de-Monts, 1 le 27 juillet 1960 à la Pointe du But à l'Île d'Yeu. Nectoux: 1 mâle le 16 août 1968 à St Gilles) sans indiquer leurs sources. Ils citent "Debru, 1958" pour une observation qui doit être attribuée à Labitte et

Languetif (1962): "Nous n'avons pas observé les représentants de cette espèce aux abords du rocher de la Dive, comme autrefois, mais nous avons pu en voir quatre exemplaires le 4 mai (1960) entre Grues et Saint-Denis-du-Payré.", "...ils s'envolèrent pour aller en rejoindre deux autres posés à une trentaine de mètres de nous sur de hautes tiges, puis tous s'envolèrent aussitôt, ...". Spitz (1964) considère le Moineau soulcie comme nicheur dans la région de St Michel-en-l'Herm sans donner d'observation personnelle mais fait référence à celle de Labitte et Languetif ci-dessus. Il faut remonter aux années 39-40 pour trouver le Soulcie nicheur à Luçon et à Fontenay (Guérin 1927, 1938, 1939 et 1940).

Ce bref aperçu de la littérature concernant le Moineau soulcie en Vendée montre à quel point cet oiseau a été peu observé jusqu'à nos jours. Faut-il attribuer ce fait à une répartition très localisée de l'espèce, à sa faible densité ou à un manque d'intérêt de la part des observateurs pour un oiseau peu spectaculaire ? *Petronia petronia* mériterait d'être mieux connu des ornithologues vendéens; notre département n'est-il pas à la limite nord de l'aire de répartition actuelle de l'espèce ?

Souhaitons que vous serez nombreux à nous faire part, comme Michel Clénot, de vos découvertes concernant cet oiseau.

REFERENCES

- Audurier, et Boutin, J.M. (1983). Le Moineau soulcie dans les Deux-Sèvres, *addendum* Répartition du Moineau soulcie dans la région du Centre-Ouest. Bull. U.C.A.G.O. 5 : 23.
- Bon, M. (1924). Observations sur *Petronia petronia*. R.F.O. 8 : 479.
- Debru, H. (1958). Remarques sur la biologie du Moineau soulcie. O. & R.F.O. : 112.
- Guérin, G. (1927). La mue du Soulcie indigène. R.F.O. 11 : 356-357.
- Guérin, G. (1938, 1939, 1940). Ornithologie du Bas-Poitou. Les oiseaux dans la Vendée et quelques cantons limitrophes. O. & R.F.O. 8, 1938 : 64-77; 613-641; 9, 1939 : 89-118; 233-254; 530-563; 10, 1940 : 334-359.
- G.O.V. (1982). Atlas des Oiseaux Nicheurs en Vendée : 22.
- G.O.V. (1985). Atlas des Oiseaux Nicheurs en Vendée : 20.
- Labitte, A., et Languetif, A. (1962). Notes sur les oiseaux nicheurs du marais vendéen (au printemps 1960). O. & R.F.O. 32 : 127-133.
- Spitz, F. (1964). Notes sur l'avifaune nicheuse de la région de Saint-Michel-en-l'Herm (Vendée). O. & R.F.O. 34 : 51-67.
- Yeatman, L. (1976). Atlas des Oiseaux Nicheurs de France. S.O.F. : 252-253.

Christian GOYAUD
557 La Vigne aux Roses
85000 La Roche-sur-Yon