

SORTIE ORNITHOLOGIQUE DU G.O.V.
à l'ILE DE RE
(13-14 FEVRIER)

Samedi 13 Février, à 8 heures 30, Place Napoléon, une quinzaine de govidés sont regroupés pour recevoir les dernières recommandations de Philippe Rouiller (organisateur de la sortie), et nous voilà partis à la découverte de l'île de Ré.

11 heures : embarcadère de La Rochelle, derniers pas sur le continent et premier regard vers l'île aux Bernaches. Accompagnés de mouettes rieuses, goélands bruns, leucophées, cendrés, marins et quelques rares mouettes mélanos, nous débarquons : nous allons passer deux jours complètement fous...

Ah ça ! Les bernaches ne manquaient pas, des "bancs" de plus de 500 broutaient les algues (zostères) découvertes par la marée. Mais quelle fut notre surprise lorsque nous découvrîmes ~~dans deux troupes différentes les deux sous-espèces~~ de la bernache cravant :

- la bernache cravant à ventre blanc
- la bernache cravant du Pacifique (ou à ventre sombre).

En un après-midi, nous venions d'observer les trois variétés mondiales de la bernache cravant (cf. fiche).

La journée du dimanche s'annonçait resplendissante et nous avions encore beaucoup de choses à découvrir. Une grande balade autour du fief de l'île, rappelant parfois quelques endroits de la baie de l'Aiguillon, nous fit découvrir de multiples espèces : harles huppés, grèbe jougris, grèbe à cou noir, canards, sarcelles, chevaliers arlequins, gambettes, bécasseaux, pluviers argentés, barges... Après une telle matinée, le repas fut apprécié par tous et notre week-end se termina

par un après-midi de sea-watching (sur les côtes nord-est de l'île, phare des Baleines), qui nous permit d'observer de nombreux plongeurs imbrins et arctique quelques catmarins, des eiders à duvet, harles huppés et le magnifique garrot à oeil d'or; à quelques mètres au-dessous de nous, déambulait tout un monde de lilliputiens : bécasseaux variables, sanderlings, violets, tournepierres, grands gravelots, enfin, à la grande joie de nos ornithos, un guillemot de troïl fut observé à moins d'une dizaine de mètres, sur les rochers.

Il était 17 heures quand un vol de bernaches passa nos yeux se dirigeant vers le continent ; pour nous aussi il était l'heure de plier bagages, mais je crois que tous les govidés présents n'oublieront pas de sitôt cette magnifique île aux oiseaux : l'île de Ré... et aussi le dernier voyage par le bac.

Merci Philippe.

Liste des espèces observées :


- Plongeurs imbrin, arctique et catmarin
- Grèbes huppe, jougris, à cou noir, esclavon (2 individus)
- Canards colvert, souchet, pilet, siffleur - Tadorne de Belon
- Sarcelle d'hiver
- Harle huppe (très nombreux)
- Garrot à oeil noir (2 mâles, 1 femelle)
- Grand cormoran
- Héron cendré
- Aligrette garzette
- Bernache cravant européenne, à ventre blanc et du Pacifique
- Macreuse noire (52 individus)
- Eider à duvet (mâle et femelle)
- Busard des roseaux
- Faucon crécerelle
- Huitrier pie
- Barge à queue noire et barge rousse
- Avocette
- Bécasseau variable, sanderling, violet
- Pluvier argenté
- Grand gravelot
- Courlis cendré
- Chevalier gambette, arlequin, aboyeur
- Tournepierre à collier
- Mouette rieuse, mélanocéphale (2 ind.)
- Sterne caugek
- Goéland marin, brun, argenté, leucopnée, cendré
- Guillemot de troïl
- Pipit maritime
- Bruant des roseaux

Soit : 50 espèces

Nicolas POINTECOUTEAU

BERNACHE CRAVANT EUROPEENNE
(Branta Bernicla Bernicla)

- apparence générale très foncée



Tache blanche des 2 côtés
de la tête (parfois peu prononcée)

Ventre et flanc sombres
(relativement variables)


Notre BERNACHE CRAVANT EUROPEENNE se reproduit dans les toundras du Spitzberg et celles de l'Ouest sibérien en compagnie de sa cousine à ventre sombre. Elle hiverne sur les côtes nord européennes atlantiques.

BERNACHE CRAVANT A VENTRE PALE
(Branta Bernicla Hrota.)

Cette BERNACHE se reproduit dans la toundra arctique canadienne. Elle hiverne sur les côtes nord américaines atlantiques ; quelques individus sont observés sur nos côtes atlantiques.

BERNACHE CRAVANT A VENTRE BLANC

(Branta Bernicla Hrota)




dessus brun

Ventre et flanc très pâles

BERNACHE CRAVANT A VENTRE SOMBRE OU DU PACIFIQUE
(Branta Bernicla Nigricans)

LA BERNACHE CRAVANT DU PACIFIQUE se reproduit dans les toundras arctiques de l'est sibérien et l'Alaska. Elle hiverne sur les côtes américaines du pacifique



Collier beaucoup plus
marqué que chez les deux
précédentes

Haut des flancs pâle,
contrastant avec le
ventre très sombre
et le dessus.

