

RESULTATS DES RECENSEMENTS D'ANATIDES EN

VENDEE, Janvier 1977.

Dans le cadre des recensements internationaux de sauvagine coordonnés par le B.I.R.S., des dénombrements sont désormais régulièrement effectués avec une périodicité mensuelle ou moins en Vendée dans le cadre des activités de la Station O.N.C. de Chanteloup. D'autres ornithologues amateurs y participent aussi, et des dénombrements aériens sont assurés.

Durant l'hiver 1976-1977 l'effort a été très intense et pas moins de 8 dénombrements plus ou moins complets ont été réalisés entre Août et Mars, portant sur les 3 zones humides importantes de Vendée : Baie de Bourgneuf-Marais Breton ; Marais d'Olonne-Littoral entre les Sables d'Olonne et Brétignolles sur mer ; et enfin Anse de l'Aiguillon-Pointe d'Arçay-Malais Poitevin.

Un travail de F. GOSSMAN (en stage à Chanteloup) détaille et analyse de nombreuses autres données pour la période Novembre-Février pour la Vendée. Il peut être compulsé à la bibliothèque de la Station.

Ont participé aux recensements à pied : O. et S. FOURNIER, A. GARNIER, F. GOSSMAN, D. GUILBERT, M. HETAS, J.C. et C. ROUSSELOT et J.M. WATIER. M. BROSELIN a communiqué ses résultats des dénombrements aériens.

Il ne sera ici considéré que les résultats synthétisés obtenus à la mi-janvier lors des dénombrements réalisés durant la période internationale.

I - Résultats des recensements aériens et à pied de mi-janvier 1977

(voir Tableau 1).

Les résultats furent obtenus en faisant la moyenne des données des deux méthodes. Cependant pour les Bernaches et Macreuses, ainsi que pour les espèces observées seulement dans un des cas, les nombres sont repris intégralement. Cette synthèse est probablement une estimation très correcte et proche de la réalité. Elle donne un reflet exact de l'importance de la Vendée pour la sauvagine hivernante.

La comparaison avec les autres hivers est présentée dans le Tableau 2. Seules les années où des dénombrements aériens ont complété le travail au sol, ont été retenues. Néanmoins, les effectifs de Macreuses n'ont pas été décomptés aussi parfaitement les années précédentes.

II - Evolution des effectifs globaux de Vendée entre 1966 et 1977

(voir Tableau 2).

On peut remarquer l'accroissement général des effectifs, mieux reflété et nuancé encore par le Tableau 3 qui compare les effectifs de 4 espèces présentes dans l'Anse de l'Aiguillon en Janvier 1977 avec la moyenne et le maximum de ces effectifs dénombrés pendant la période 1967-1974 (Atkinson-Willes).

III - Comparaison des effectifs moyens et maximums de 4 espèces dans l'Anse de l'Aiguillon en Janvier.

Les conditions habituelles fort favorables pour l'hivernage des Anatidés en Vendée ont été améliorées encore cet hiver du fait de la pluviosité et des conditions météorologiques favorables dans l'Europe de l'Ouest et

Zones	Anse de l'Aiguillon	Pointe Arçay	Perthuis Breton	Marais Poitevin	Réserve St D. du Payré	Les Sables Brétign.	Réserve Chanteloup	Stg. ST. Avaugourd	Brétignolles Fromentine	Baie de Bourgneuf	TOTAL/ espèces
Espèces											
A. platyrhynchos	4.250	490			900	340		21	120	825	6.946
A. crecca	4.000	55		1.000	800	120		49		195	6.219
A. penelope	1.600				600	45	52			245	2.542
A. acuta	8.400	30			150	120	490			15	9.205
A. clypeata	6.550				200		385	1		50	7.186
A. sp.	750	70				1.150				50	2.020
Total Anas	25.550	645		1.000	2.650	1.775	927	71	120	1.380	34.118
Aythya ferina	10				15		4			20	49
Melanitta nigra		50	1.500			1.400			3.800	20	6.770
Mergus serrator										3	3
Mergus sp.										1	2
Anser anser	6				32						38
Anser sp.	7										7
Branta b.	195	85								2.750	3.030
Tadorna t.	6.900	250					7			90	7.247
Total Anatidés	32.668	1.030	1.500	1.000	2.697	3.176	938	71	3.920	4.264	51.264

TABLÉAU 1 : Résultats des recensements aériens et à pied de mi-janvier 1977.

Espèces	Janvier 66	Janvier 67	Janvier 75	Janvier 76	Janvier 77
A. platyrhynchos	2500	2000	1100	630	6946
A. crecca	1000	900	9347	6316	6219
A. penelope	4000	1500	4050	241	2542
A. acuta	4000	9650	4200	5330	9205
A. clypeata	20	200	1089	157	7186
A. sp					2020
Total anas	12520	16490	20086	21950	34112
Aythya marila	1200		300	400	
Aythya fuligula			10		
A. ferina			34		49
Melanita nigra	4000	2240	2200	4770	6770
Anser anser			15		7
Anser sp		7			38
Branta bernicla	5000	1450	5510	5400	5050
Tadorna t.	4060	3722	2667	5029	7237
Total anatidés	24500	25366	28022	37355	51279

TABLEAU 2 : Evolution des effectifs globaux
de Vendée entre 1966 et 1977.

Espèces	Effectifs de janvier de 67 à 74 dans l'Anse de l'Aiguillon			Janvier 77
	moyenne	maximum		
A. crecca	3700	6900		4000
A. acuta	7700	12500		3400
A. clypeata	800	4000		6550
Tadorna	4600	7700		6900

TABLEAU 3 : Comparaison des effectifs moyens et
maximums de 4 espèces dans l'Anse de
l'Aiguillon en Janvier.

défavorables plus au Nord (coup de froid de fin Décembre).

L'effectif de plus de 51.000 Anatidés est de loin le nombre le plus important enregistré en Vendée depuis l'hiver mémorable et cruel de 1962-1963.

Puissent, tous ceux que cela intéresse, faire en sorte que la richesse et la diversité des milieux humides, non seulement en Vendée mais dans l'Ancien Monde (à l'échelle des déplacements de ces oiseaux), soient conservées en l'état, au moins. Sinon nous serons les derniers témoins d'une richesse que nos enfants regretteront...

Nouvelles Ornithologiques Vendéennes (Janvier à Juin 1977).

NIDIFICATIONS:

- Deux nouvelles colonies de Guiffettes Noires (*Chlidornias niger*) : une sur le communal de St Benoist/Mer (environ 12 couples), une sur le communal de Longeville (environ 7 couples). DAVIAU, BARITEAU, MORNET.
- Les différentes colonies de Barges à queue noire (*Limosa limosa*) en Vendée pour 1977 : communal de Triaize (2-3 couples) ; communal de Luçon (2-3 couples) ; communal de Beugné l'abbée (5-6 couples). Soit un total de 9 à 12 couples !!! C'est peu. GARNIER, WATIER.
- Ont niché sur la Lagune de Bouin mise en réserve de nidification (accès interdit) cette année : Sterne naine (*Sterna albifrons*) 5 couples ; Sterne pierregarin (*Sterna hirundo*) 180 couples ; Avocettes (*Recurvirostra avosetta*) 24 couples ; Gravelot à Collier interrompu (*Charadrius alexandrinus*) 6-7 couples ; Vanneau (*Vanellus vanellus*) 43 couples ; Gambette (*Tringa totanus*) 10 couples. METAIS.
- Une forte augmentation des effectifs d'Avocettes (*Recurvirostra avosetta*) a été notée cette année en période de reproduction, par rapport à 1976 : Marais d'Olonne : 340-380 contre 200 ; Marais de Bouin : 130-140 contre 50-60 ; Marais de la Guittière : 30 contre 30. Soit un total de 500-550 contre 280-290 en 1976.
- Par contre, forte diminution des couples d'Phasques (*Himantopus himantopus*) : Marais d'Olonne : 20 contre 30 ; Marais de Bouin : 4 contre 20 ; Marais de Noirmoutier : 3-5 contre 20-25.
- Sur renseignements de M. JOLY (Beauvoir/Mer) une colonie de Hérons cendrés (*Ardea cinerea*) a été localisée dans le nord de la Vendée.

OBSERVATIONS :

- Un très important passage de Mouettes pygmées (*Larus minutus*) du 20 Mars au 20 Avril 1977. Un maximum de 1000-1200 le 25 Mars sur la Réserve de Chanteloup, Ile d'Olonne (équipe Chanteloup).
- 5 à 8 Cigognes blanches (*Ciconia ciconia*) séjournent dans le Marais de Longeville depuis début Mai (ou avant) (BARITEAU, MORNET).
- 1 Phalarope à bec étroit (*Phalaropus lobatus*), ♀ en plumage nuptial, a été observé le 15 Mai 1977 en Baie de l'Aiguillon (GARNIER, WATIER).
- 1 Corneille mantelée (*Corvus corone cornix*) en compagnie de 4 Corneilles noires (*Corvus corone corone*) le 8 Mai 1977 sur la dune de Sauveterre (GARNIER).
- 1 Mergule nain (*Plautus alle*) sur la Réserve de Chanteloup le 21/2/77.

AVIS : 4 Flamands du Chili (*Phoenicopterus ZOOFILIIUS...*) stationnent dans le Marais d'Olonne. Prière à ceux qui les ont perdu de venir les chercher... (mais ils volent bien !).
