SYNTHÈSE ORNITHOLOGIQUE
ÎLE D'YEU

Volume 11

Année 2017

Rédaction :
Marie-Paule HINDERMEYER
Xavier HINDERMEYER
Collaboration :
Frédéric PORTIER

Photo de couverture : Pouillot à grands sourcils © *Olivier PENARD*

Référence bibliographique du document :
HINDERMEYER M.-P. & HINDERMEYER X., 2018 - *Synthèse ornithologique - Ile d'Yeu*. Vol. 11, Année 2017, 50 p.

SYNTHÈSE DES OBSERVATIONS ORNITHOLOGIQUES FAITES SUR L'ÎLE D'YEU AU COURS DE L'ANNÉE 2017

DÉCEMBRE 2018

RÉDACTION

Marie-Paule & Xavier HINDERMEYER
24 boulevard Gabriel Guist'hau
44000 NANTES
Mél : xavier.hindermeyer@gmail.com

COLLABORATION

Frédéric PORTIER

LISTE DES OBSERVATEURS

Valérie AURIAUX (V.A.), Christian BAERTICH (C.B.), Élodie BOUSSIQUAULT (E.B.), Guillaume BRUNEAU (G.B.), Luc CHAILLOT (L.Ch.), Raphaël CHAUSSIS (R.C.), Simon CLAUDE (S.C.), David COUZIN (D.C.), Jérémy DECHARTRE (J.D.), Quentin DEMARQUET (Q.D.), Sandrine DESMAREST (S.D.), Didier DESMOTS (D.D.), Philippe J. DUBOIS (P.J.D.), Daniel DUMORTIER (D.Du.), Martine DUYS (M.D.), Matthieu FAVEYRIAL (M.F.), Johan GARDON (J.G.), Lucien GROISARD (L.G.), Anthony GUÉRARD (A.G.), Jean-Marc GUILPAIN (J.-M.G.), Alix HINDERMEYER (A.H.), Marie-Paule HINDERMEYER (M.-P.H.), Xavier HINDERMEYER (X.H.), Bertrand ISAAC (B.I.), Marie-Hélène JANDET (M.-A.J.), Orianne JOUVEL (O.J.), Franck LATRAUBE (F.L.), Frédéric LE GALLO (F.L.G.), Alexandre LIGER (A.L.), Jérôme de LINARES (J.D.L.), Damien MERCERON (D.M.), Pauline MOMOT (P.M.), Floriane PASSAS (F.Pa.), Olivier PENARD (O.Pe.), Thomas PERRIER (T.P.), Frédéric PORTIER (F.P.), Sylvain REYT (S.R.), Dominique ROBARD (D.R.), Martin ROMET (M.R.), Hervé ROQUES (H.R.), Jacques ROS (J.R.), Sylvain ROUILLE (S.Ro.), Franck SALMON (F.S.), Françoise SARRAZIN (F.Sa.), Didier SIMON (D.S.), Alain TROFFIGUÉ (A.T.) et Fernand VOISIN (F.V.).

REMERCIEMENTS

Un grand merci, tout d'abord, à Frédéric PORTIER qui assure le suivi ornithologique de l'île avec nous depuis plus de quinze ans et qui a fait une relecture critique de cette synthèse.

Nous tenons également, comme chaque année, à remercier Claude BUGEON pour les observations inédites et les précieuses informations qu'il nous a communiquées, la famille SAGE et Fernand VOISIN qui nous ont autorisés à observer sur les terrains qu'ils exploitent et avec qui nous avons eu, comme toujours, des échanges très fructueux. Un grand merci aussi à Valérie AURIAUX, Sandrine DESMAREST, Alain MOUSNIER et Didier SIMON, observateurs locaux particulièrement actifs et qui relaient souvent des observations réalisées par d'autres islais.

Toute notre gratitude va ensuite aux observateurs qui se sont succédés sur l'île au cours de l'année 2017 et qui nous ont transmis leurs données, en particulier Guillaume BRUNEAU, Luc CHAILLOT, Didier DESMOTS, Philippe J. DUBOIS, Martine DUYS, Matthieu FAVEYRIAL, Johan GARDON, Jean-Marc GUILPAIN, Bertrand ISAAC, Franck LATRAUBE, Frédéric LE GALLO, Alexandre LIGER, Jérôme de LINARES, Olivier

PENARD, Thomas PERRIER, Sylvain REYT, Dominique ROBARD, Martin ROMET, Hervé ROQUES et Orianne JOUVEL, Jacques ROS, Franck SALMON et Alain TROFFIGUÉ.
Et merci, enfin, à mes collègues de la DREAL, David COUZIN, Carole NORDEZ et Françoise SARRAZIN.

Un très grand merci à ceux qui nous ont permis d'illustrer cette synthèse grâce à leurs photographies mises gracieusement à notre disposition : Valérie AURIAUX, Jean-Marc GUILPAIN, Olivier PENARD, Frédéric PORTIER & Didier SIMON.

Cette synthèse est la onzième édition. Toutes vos remarques/observations pour l'améliorer dans les années qui viennent restent les bienvenues.

LES FAITS MARQUANTS DE L'ANNEE 2017

Encore une **très bonne année ornithologique** pour l'île d'Yeu.

Le nombre de données collectées en 2017 (18 725) est en très nette augmentation (+31%) par rapport à 2016 (chiffre, de loin, le plus important depuis le début du suivi). Le nombre d'espèces observées est de 204, en légère diminution (-5,6%) mais dépasse tout de même, pour la seconde fois, le seuil des 200 espèces (cf. Fig. 1).

A noter cette année au printemps, la remontée assez spectaculaire d'oiseaux du sud avec, sur la seule journée du 25 mai, l'observation d'un Roselin githagine (*Bucanetes githagineus*), d'une Caille des blés (*Coturnix coturnix*), d'un Crabier chevelu (*Ardeola ralloides*), d'une Alouette calandrelle (*Calandrella brachydactyla*) et de deux individus de Sterne hansel (*Gelochelidon nilotica*).

L'essentiel de ces données a été saisi sur la base de données en ligne mise à disposition par la LPO Vendée depuis 2009 (www.faune-vendee.org) mais quelques données nous ont encore été transmises directement.

Le nombre total de données figurant dans notre base au 31 décembre 2017 était de 157 367.

Fig. 1 : Nombre annuel d'espèces et de données



Le nombre d'observateurs est en très légère diminution (en fait assez stable) avec un chiffre de 47 (en réalité un peu plus si nous comptons tous les membres des groupes qui ont fréquenté l'île).

Le nombre de jours d'observation est en nette augmentation cette année avec un chiffre de 289 (+20,4% par rapport à 2016) qui constitue le chiffre le plus important depuis le début du suivi. C'est un chiffre très important puisqu'il signifie que pendant près de 80% des jours de l'année une personne a observé sur l'île d'Yeu et a transmis ses données. Ce chiffre est en grande partie dû à l'investissement des observateurs locaux particulièrement actifs.

Les observations sont toujours assez bien réparties sur l'année. Ainsi, elles sont faites tous les mois de l'année et si octobre reste encore très largement le mois le plus riche en données (4 436), avril (2 641) en fournit également un nombre important, puis novembre (2 182), août (2 161), septembre (1 925), février (1 207) et mai (1 180). La répartition sur l'année de ces jours d'observation ainsi que le nombre de données collectées associées sont illustrés ci-dessous (cf. Fig. 2).

Fig. 2 - Importance et répartition journalière des données en 2017



Les nouvelles espèces

L'année 2017 est, encore une fois, marquée par l'observation de nouvelles espèces (3) et d'une nouvelle sous-espèce sur l'île. La liste islaise (en cours de finalisation) dépasse désormais les 325 espèces.

Il s'agit, tout d'abord, d'un Crabier chevelu (*Ardeola ralloides*) découvert le 25/05 posé dans une petite crique sur la côte sauvage, près de la pointe du But.

Ce sont, ensuite, les observations, à l'automne, d'un individu de Pie-grièche à tête rousse (*Lanius senator*) de la sous espèce *badius* posé dans les prairies de Perdrette le 21/08 puis d'un Fuligule nyroca (*Aythya nyroca*) dans les marais de la Guerche le 26/08 et, enfin, de deux jeunes Cigogne noire (*Ciconia nigra*), la première le 04/10 en vol migratoire au dessus du vallon du Pissot et, la seconde, posée les 05 et 06/10 autour des marais de la Croix.

Les autres observations marquantes

Parmi les espèces et sous-espèces très rares sur l'île, on note cette année :
- une donnée de Roselin githagine (*Bucanetes githagineus*), en mai (2 et 3ème mentions pour l'île) ;
- une donnée de Bécasseau tacheté (*Calidris melanotos*), en août (3ème mention pour l'île) ;
- une donné de Sittelle torchepot (*Sitta europaea*), en mars (3ème mention pour l'île) ;
- une donnée de Cigogne blanche (*Ciconia ciconia*), en juin (4ème mention pour l'île) ;
- une donnée de Canard chipeau (*Anas strepera*), en janvier (4ème mention pour l'île) ;
- une donnée de Pouillot siffleur (*Phylloscopus sibilatrix*), en octobre (4ème mention pour l'île) ;
- une donnée de Faisan vénéré (*Syrmaticus reevesii*), en octobre (5ème mention pour l'île) ;
- une donnée de Pic vert (*Picus viridis*), en octobre (5ème mention pour l'île) ;

- trois données de Cygne tuberculé (*Cygnus olor*), en mai, juillet et octobre (5 à 7ème mentions pour l'île) ;
- sept données de Sarcelle d'été (*Anas querquedula*), en mars (5 à 11ème mentions pour l'île) ;
- une donnée de Sterne hansel (*Gelochelidon nilotica*), en mai (6ème mention pour l'île) ;
- une donnée de Pouillot de Bonelli (*Phylloscopus bonelli*), en août (6ème mention pour l'île) ;
- trois données de Combattant varié (*Philomachus pugnax*), en septembre (6 à 8ème mentions pour l'île) ;
- cinq données de Goéland pontique (*Larus cachinnans*), en mars, avril, octobre et décembre (6 à 10ème mentions pour l'île) ;
- une donnée de Marouette ponctuée (*Porzana porzana*), en octobre (6ème mention pour l'île) ;
- une donnée d'Hirondelle rousseline (*Cecropis daurica*), en juin (6ème mention pour l'île) ;
- une donnée d'Engoulevent d'Europe (*Caprimulgus europaeus*), en mai (7ème mention pour l'île) ;
- une donnée de Milan royal (*Milvus milvus*), en octobre (8ème mention pour l'île) ;
- deux données de Balbuzard pêcheur (*Pandion haliaetus*), en août et septembre (8 et 9ème mentions pour l'île) ;
- deux données de Pipit de Richard (*Anthus richardi*), en octobre (9 et 10ème mentions pour l'île) ;
- deux données de Goéland bourgmestre (*Larus hyperboreus*), en décembre (9 et 10ème mentions pour l'île).

LISTE SYSTÉMATIQUE

Dans la liste ci-dessous, chaque nom d'espèce est suivi de deux chiffres entre parenthèses. Le premier chiffre représente, pour l'espèce considérée, le nombre de données islaises enregistrées dans la base de données jusqu'au 31 décembre 2016 (statistique obtenue sur un total de 138 642 données). Le deuxième chiffre représente le nombre de données du 1er janvier au 31 décembre 2017, soit 18 725 au total.

Les espèces en rouge suivies d'un astérisque (*) sont soumises à homologation nationale et celles en bleu suivies de deux astérisques (**) sont soumises à homologation départementale.

CYGNE TUBERCULÉ *Cygnus olor* (4/3)
Trois nouvelles observations de cette espèce sur l'île : 10 individus en vol au dessus de Port-Joinville le 23/05 (F.P.), 1 adulte posé plage des Bossilles/de la Borgne le 27/07 (V.A. & M.-P.H.) et 1 individu en vol devant la plage des Bossilles/de la Borgne le 27/10 (V.A.). Le Cygne tuberculé reste rare sur l'île mais semble devenir plus régulier.

Il s'agit seulement des 5 à 7ème mentions de l'espèce sur l'île après celle de P. Paulian en 1984 rapportée par C. Bugeon dans sa synthèse sur l'avifaune de l'île (2013), celle de 8 individus posés en mer devant la Galiote le 11/06/2013 (S. Desmarest & V. Auriaux), celle de 5 individus en vol longeant la côte sauvage au niveau des Trupailles le 26/07/2013 (M.-P. & X. Hindermeyer) et celle de 2 individus (1 adulte et 1 1ère année) posés devant la plage des Roses le 27/02/2016 (L. Barault fide *S. Desmarest & V. Auriaux).*

BERNACHE CRAVANT *Branta bernicla* (102/16)
La sous-espèce type *Branta bernicla bernicla*, régulière sur l'île en petit nombre, est observée cette année en fin d'hiver et en automne. A l'automne, elle est notée en septembre, octobre et novembre - 15 individus au passage depuis le phare des Corbeaux le 30/10 (F.L.G.). Plusieurs observations en fin d'hiver : 1 individu du 14 au 18/02 sur les plages de la côte nord (M.-P., A. & X.H.). A noter plus d'une quarantaine d'individus en vol nord le 10/03 lors de la traversée Fromentine-Yeu (M.-P.H.).

TADORNE DE BELON *Tadorna tadorna* (1016/121)
L'espèce est observée uniquement de janvier à juillet sur l'île où elle se reproduit - deux premiers couples le 01/01 à la carrière et devant la plage de la Tourette (M.-P., A. & X.H.). Les maxima sont notés au printemps avec par exemple plus de 25 individus sur l'aérodrome le 11/04 (J.D.L.). L'essentiel des couples reproducteurs est noté entre Port-Joinville et la pointe du But et sur la côte sauvage mais sans décompte précis. La carrière accueille 1 couple cette année, de même que les marais de la Guerche mais la femelle est retrouvée morte le 03/06 (M.-P. & X.H.). Un indice certain de nidification avec 2 adultes et 9 poussins partant vers le continent le 03/06 depuis la pointe du But (M.-P. & X.H.). Malheureusement la mer est formée et le vent contraire, plusieurs goélands (marin et argenté) prédatent une grande partie des poussins avant que la famille ne renonce à traverser!


Photo © Frédéric Portier

CANARD SIFFLEUR *Anas penelope* (38/1)
Une seule observation cette année avec 1 individu posé en mer devant la pointe de la Père le 01/01 (M.-P. & X.H.). Aucune donnée à l'automne.

CANARD CHIPEAU *Anas strepera* (3/1)
L'espèce est très rare sur l'île (la dernière observation datait de 2013). Cette année, un mâle est observé en vol le 04/01 au dessus de la pointe de la Gournaise (X.H., C.N. & D.C).

Il s'agit seulement de la 4ème mention de l'espèce sur l'île après celles de 2 mâles en vol et posés plage de Ker Châlon le 29/12/1996 (M.-P. & X. Hindermeyer), celle d'un mâle posé plage des Sapins le 20/03/2004 (M.-P. & X. Hindermeyer) et celle d'une femelle en vol pointe des Corbeaux le 02/03/2013 (M.-P., A. & X.H.).

SARCELLE D'HIVER *Anas crecca* (52/3)
L'espèce est peu observée cette année : 2 individus dans les marais de la Guerche le 20/02 (L.G.), 1 individu en migration active au dessus des marais de la Guerche le 03/10 (F.P.) et 12 individus au passage devant la pointe du But le 31/10 (L.Ch.).

CANARD COLVERT *Anas platyrhynchos* (428/78)
Comme les années précédentes, beaucoup d'observations cette année, y compris certaines en hiver. Il est difficile de connaître exactement le nombre de couples nicheurs mais on peut estimer de 4 à 6 couples dans les seuls marais de la Guerche. L'espèce s'est également reproduite au Marais Salé. Les premiers poussins sont observés le 18/04 dans les marais de la Guerche et au Marais Salé (F.P.). Pas de passage noté à l'automne, exceptés 4 individus en vol devant la pointe de Gilberge le 17/11 (V.A.).

CANARD PILET *Anas acuta* (25/4)
Un mâle adulte est observé au printemps, posé plage de la Tourette et de Ker Châlon les 30/04 et 01/05 (M.F., J.G., L.Ch. & V.A.). Plus classiquement, l'espèce est notée lors du passage postnuptial avec plus d'une quarantaine d'individus en vol le 24/09 lors de la traversée Yeu-Fromentine (M.-P., A. & X.H.) et 4 individus en migration active au dessus de la dune de la Grande Conche le 03/10 (F.P.).

SARCELLE D'ÉTÉ *Anas querquedula* (4/7)
Belle série d'observations au printemps pour cette espèce rare sur l'île : 1 mâle et 3 femelles le 16/03 (F.P., V.A. & S.D.), 1 mâle le 17/03 (V.A.) puis 4 mâles et 2 femelles du 18 au 20/03 (D.S, S.D. & V.A.) au Marais Salé et enfin 3 mâles et 2 femelles dans les marais de la Guerche le 25/03 (V.A.).

Il s'agit seulement des 5 à 11ème mentions de l'espèce sur l'île après celle, estivale, de P. Paulian de la fin de la décennie 1970-début 1980 rapportée par C. Bugeon dans sa synthèse sur l'avifaune de l'île (2013), celle d'un couple le 27/03/2003 dans les marais de la Croix (J.-M. Guilpain), celle d'un mâle le 11/05/2007 toujours dans les marais de la Croix (F. Portier) et celle d'un mâle le 28/05/2014 dans les marais de la Guerche (M.-P., A. & X. Hindermeyer).

Photo © Frédéric Portier

Photo © Didier Simon

CANARD SOUCHET *Anas clypeata* (24/2)
Le Canard souchet est observé cette année en hiver et lors du passage prénuptial. En hiver, 4 individus (en 1 mâle et 3 femelles) sont observés en vol devant la plage de la Tourette le 01/01 (M.-P., A. & X.H.). Au printemps, 14 individus sont notés en vol lors de la traversée Fromentine-Yeu le 10/03 (M.-P.H.). Aucune donnée à l'automne.

FULIGULE NYROCA *Aythya nyroca* (0/1)**
Belle surprise avec l'observation d'un Fuligule nyroca posé puis en vol dans les marais de la Guerche le 26/08 (M.-P.H.). Il s'agit de la première mention de l'espèce sur l'île. Cette donnée est en cours d'examen par le comité d'homologation vendéen (CH85).

EIDER A DUVET *Somateria mollissima* (12/1)
Seconde observation en deux ans d'Eider à duvet posé dans les eaux de l'île, toujours en novembre : 1 individu de type femelle est noté le 16/11 devant la pointe des Corbeaux (D.R.).

MACREUSE NOIRE *Melanitta nigra* (322/32)
L'espèce est de plus en plus commune dans les eaux de l'île. Elle y est observée en janvier, février, avril puis de juillet à décembre. Toutes les observations sont faites depuis la côte nord et il s'agit souvent d'oiseaux en vol - 20 individus au passage pointe du But le 23/10 (M.-P.H.). Pas d'observation du groupe très important d'oiseaux qui semblait hiverner entre la pointe des Corbeaux et le continent ces dernières années.

PERDRIX ROUGE *Alectoris rufa* (326/42)
L'espèce est observée en février, avril puis de juin à novembre. Le groupe le plus important compte 11 individus les 16, 20 et 29/08 sur la dune de la Grande Conche (M.-P. & X.H.). Elle semble se maintenir sur l'île grâce aux lâchers d'oiseaux d'élevage. Un seul indice de reproduction certain rapporté cette année avec 2 adultes et 9 poussins le 16/08 sur la dune de la Grande Conche (M.-P.H.).

CAILLE DES BLÉS *Coturnix coturnix* (13/1)
Une seule observation cette année au printemps : 1 individu est levé pointe de la Tranche le 25/05 (M.-P. & X.H.). Pas de données à l'automne. La Caille des blés reste un migrateur rare sur l'île.

FAISAN VÉNÉRÉ *Syrmaticus reevesii* (4/1)
Nouvelle observation de cette espèce sur l'île : 1 femelle dans la dépression de la dune de la Grande Conche le 30/10 (L.Ch.). Il s'agit probablement d'oiseaux introduits pour la chasse.

Il s'agit seulement de la 5ème mention de l'espèce sur l'île après celle d'un mâle le 22/10/2005 dans les marais de la Croix (F. Portier & X. Hindermeyer), d'un individu le 14/03/2013 près du phare des Corbeaux (V. Auriaux), de deux individus le 27/08/2014 dans les marais de la Croix (M.-P., A. et X. Hindermeyer) et d'un autre individu le 03/12/2014 près de la plage du Marais Salé (G. Henry fide *S. Desmarest).*

FAISAN DE COLCHIDE *Phasianus colchicus* (1190/122)
L'espèce est bien présente sur l'île où elle est observée toute l'année. Plusieurs preuves de nidification sont rapportées cette année notamment dans la dépression de la dune de la Grande Conche - 1 femelle avec 1 poussin le 22/05 (F.P.) et le 20/08 (M.-P. & X.H.). Comme pour la Perdrix rouge, des lâchers réguliers d'oiseaux d'élevage sont effectués pour la chasse.

PLONGEON CATMARIN *Gavia stellata* (302/13)
Le Plongeon catmarin était le plongeon le plus commun en hiver autour de l'île. Comme l'année dernière, assez peu d'oiseaux sont notés cette année et uniquement sur la côte nord. L'espèce est observée en janvier et février puis en septembre - 1 individu précoce le 13/09 pointe du But (V.A.). Plus rien ensuite. Les maxima - faibles depuis quelques années - sont notés en février avec seulement 8 individus pointe des Corbeaux le 18/02 (M.-P., A. & X.H.).

PLONGEON ARCTIQUE *Gavia arctica* (91/2)
Le Plongeon arctique est régulier mais reste assez peu commun autour de l'île. Cette année deux observations seulement sont réalisées en hiver : 1 individu en vol le 01/01 devant la plage du Marais Salé et 1 individu le 21/02 pointe des Corbeaux (M.-P., A. & X.H).

PLONGEON IMBRIN *Gavia immer* (256/60)
L'espèce est notée presque uniquement sur la côte nord de l'île (principalement de Port-Joinville à la pointe des Corbeaux) excepté 1 individu plage des Vieilles le 17/02 (M.-P.H.). Beaucoup d'observations cette année de janvier à avril - dernier oiseau le 07/04 plage du Marais Salé (M.-P.H.) - puis à partir d'octobre avec un premier oiseau le 21/10 depuis la pointe des Corbeaux (B.I.). En décembre, on dénombre entre 3 et 4 individus hivernants (M.-P., A. & X.H.) mais au moins 1 individu est retrouvé mort (pris dans un filet posé très proche de la côte).

GRÈBE CASTAGNEUX *Tachybaptus ruficollis* (158/16)
Premier retour noté dès le 17/02 avec 1 individu entendu au Marais Salé (M.-P.H.). Pas de preuve formelle de nidification cette année même s'il est très probable que l'espèce se soit reproduite, comme les années précédentes, dans les marais de la Croix - au moins 2 individus le 05/06 (M.-P. & X.H.).

GRÈBE HUPPÉ *Podiceps cristatus* (961/112)
L'espèce, qui hiverne dans les eaux de l'île, y est observée cette année de janvier à avril - 2 derniers oiseaux le 16/03 plage de Ker Châlon (F.P.) - puis à partir de novembre - premiers oiseaux le 11/11 à Port-Joinville et plage de la Tourette (M.-P.H.). La presque totalité des observations est faite sur la côte nord sauf 1 individu près du Vieux Château le 13/02 (D.D.). Les maxima sont notés le 19/02 avec 18 individus le long de la côte nord (M.-P., A. & X.H.).

GRÈBE JOUGRIS *Podiceps grisegena* (26/1)**
L'individu déjà observé en décembre 2016 plages du Marais Salé et des Iliaux est toujours présent plage des Iliaux le 01/01 (M.-P., A. & X.H.). Cette donnée est en cours d'examen par le comité d'homologation vendéen (CH85).

GRÈBE A COU NOIR *Podiceps nigricollis* (67/11)
Après une année blanche, retour de l'espèce dans les eaux de l'île avec plusieurs données (peut-être du même oiseau) sur les plages de la côte nord du 03/01 avec 1 individu pointe des Corbeaux (V.A.) au 11/03 avec 1 individu plage des Ovaires (M.-P.H.).

FULMAR BORÉAL *Fulmarus glacialis* (147/8)
Le Fulmar boréal est observé à plusieurs reprises au printemps - 1 individu le 26/03 (P.J.D.) et au moins 2 individus le 01/05 (M.F., J.G. & L.Ch.) devant la pointe du Châtelet. L'espèce est également notée en juin et juillet puis lors du passage postnuptial - par exemple 1 individu depuis la pointe de la Gournaise le 15/08 (S.R., G.B., M.-P., A. & X.H.).

PUFFIN CENDRÉ *Calonectris diomedea* (102/22)
Belle série d'observations de Puffin cendré de nouveau cette année. Les deux premiers oiseaux sont notés au passage dès le 15/06 devant la pointe des Corbeaux (M.-P.H.). Le passage se poursuit ensuite de juillet à octobre - dernier individu au passage en 1h10 le 01/10 pointe du But (F.P.). Il s'agit à chaque fois de moins de 10 oiseaux sauf 12 individus comptés au passage en 50 minutes le 02/09 devant la pointe du But (M.-P. & X.H., B.I.) et au moins 20 individus au passage devant la pointe des Corbeaux le 24/07 (D.R. & V.A.).

PUFFIN MAJEUR *Puffinus gravis* (15/4)**
Quatre nouvelles observations pour cette espèce qui reste rare dans les eaux de l'île et doit se tenir plus au large. La première concerne 2 individus observés dès le 30/07 depuis la pointe des Corbeaux (M.-P. & X.H.). La seconde concerne au moins 1 individu identifié de manière certaine le 12/08 depuis la pointe du But (G.B.). Les deux dernières concernent 2 individus observés depuis un bateau à environ 2,3 kilomètres de la pointe des Corbeaux le 27/08 (X.H. & D.S.) et 1 individu qui passe près de la pointe des Corbeaux le 29/08 (M.-P. & X.H.). L'espèce semble plus régulière dans les eaux de l'île. Ces données sont en cours d'examen par le comité d'homologation vendéen (CH85).

PUFFIN FULIGINEUX *Puffinus griseus* (129/11)
L'espèce est observée cette année entre le 10/07 et le 26/10. Ces observations ne concernent qu'un à trois individus à chaque fois - exceptés 6 oiseaux au passage pointe des Corbeaux le 20/09 (V.A. & D.R.). Enfin, un oiseau posé est très bien observé depuis un bateau à environ 2,3 kilomètres de la pointe des Corbeaux le 27/08 (X.H. & D.S.).

PUFFIN DES ANGLAIS *Puffinus puffinus* (249/13)
Le Puffin des Anglais est très peu observé cette année du 14/04 au 23/10. Il s'agit presque toujours de moins de 5 individus - maximum 6 individus au passage devant la pointe du But le 20/09 (V.A.). Pas de passage important noté cette année.

PUFFIN DES BALÉARES *Puffinus mauretanicus* (967/105)
Le Puffin des Baléares reste, de loin, le plus commun dans les eaux de l'île. L'espèce y est observée à partir d'avril - premier oiseau le 21/04 depuis la pointe du But (M.-P. & X.H.). En juin, assez peu d'oiseaux si ce n'est plus de 70 individus en vol et surtout posés en radeau le 03/06 devant la pointe du But (M.-P. & X.H.). Un petit passage est noté en septembre et octobre avec par exemple plus de 120 individus devant la pointe des Corbeaux le 20/09 (D.R.), plus de 386 individus en 1h10 le 01/10 devant la pointe du But (F.P.) et 149 individus le 08/10 également devant la pointe du But (M.-P. & X.H.). Le dernier oiseau est observé le 11/11 depuis la pointe du But (M.-P.H.). A noter une observation de fin d'hiver avec 1 individu au passage devant la pointe des Corbeaux le 21/02 (M.-P. & X.H.).
Enfin, quelques observations de Puffin sp. en juillet, septembre et octobre concernent très probablement cette espèce.

OCÉANITE TEMPÊTE *Hydrobates pelagicus* (162/25)
L'espèce est observée de juin à octobre dans les eaux de l'île. Les maxima sont notés le 24/09 avec 13 individus au passage en 15 minutes devant la pointe des Corbeaux (M.-P. & X.H.). Deux observations d'Océanite sp. en octobre se rapportent sans doute également à cette espèce.

FOU DE BASSAN *Morus bassanus* (2683/378)
L'espèce est observée presque toute l'année autour de l'île. Les maxima sont notés au printemps - par exemple plus de 200 individus au passage en 30 minutes devant la pointe du But le 18/04 (M.-P. &

X.H.) - et lors du passage postnuptial avec par exemple 69 individus en 10 minutes le 08/10 depuis la pointe du But (M.-P. & X.H.).

GRAND CORMORAN *Phalacrocorax carbo* (3454/541)
L'espèce est observée toute l'année autour de l'île où elle est commune. Pas de groupe important noté cette année - maximum 25 individus posés ensemble pointe du But le 19/08 (M.-P., A. & X.H.) et le 20/09 (F.P.). Plusieurs oiseaux sont notés en migration active au printemps - 22 individus le 22/03 au dessus de la Bergerie (S.D.) - et à l'automne - 18 individus devant la plage de la Pulante, 12 individus au dessus de l'aérodrome et 23 individus au dessus des prairies de Perdrette le 07/10 (M.-P. & X.H.).

CORMORAN HUPPÉ *Phalacrocorax aristotelis* (886/105)
Le Cormoran huppé est observé presque tout au long de l'année autour de l'île. Toutes les observations concernent un à quatre oiseaux - par exemple 4 individus posés entre l'anse des Fontaines et l'anse des Soux les 25/05 et 05/06 (M.-P., A. & X.H.). Pas d'oiseaux bagués observés, ni d'indice de nidification cette année.

CRABIER CHEVELU *Ardeola ralloides* (0/1)
Un Crabier chevelu est découvert posé dans une petite crique de la côte sauvage, près de la pointe du But le 25/05 (M.-P. & X.H.). Il s'agit de la première mention de l'espèce sur l'île.

HÉRON GARDEBŒUFS *Bubulcus ibis* (27/3)
Le Héron gardeboeufs est de plus en plus régulier sur l'île. Cette année, l'espèce est notée au printemps - 1 individu le 09/03 au dessus de la rue Georges Clemenceau à Port-Joinville (V.A.) et 1 individu le 21/04 en migration active devant la pointe du But (F.P.) - et à l'automne avec 4 individus le 17/11 en migration active au dessus de Port-Joinville (F.P.).

AIGRETTE GARZETTE *Egretta garzetta* (3003/313)
L'espèce est présente toute l'année sur les plages et les marais de la côte nord de l'île (principalement ceux de la Guerche), plus rarement sur la côte sauvage et à l'intérieur de l'île. Il ne semble pas que l'Aigrette garzette se soit reproduite cette année sur l'île. Les oiseaux sont le plus souvent dispersés sur l'île et il est donc presque impossible d'avoir une idée exacte de l'effectif présent simultanément. Le plus gros groupe noté cette année est seulement de 6 individus plage des Bossilles/de la Borgne le 20/10 (S.D.). L'espèce est également notée en migration active, principalement à l'automne.

GRANDE AIGRETTE *Ardea alba* (13/4)
Quatre nouvelles observations cette année de cette espèce, toujours assez rare sur l'île mais de plus en plus régulière, au printemps et à l'automne : 1 individu en migration active le 15/03 devant la plage des Sapins (F.P.), 1 individu en vol le 08/04 depuis la pointe des Corbeaux (M.-P.H.), 7 individus en migration active le 23/09 devant la plage des Bossilles/de la Borgne (M.-P. & X.H.) et 8 individus le 26/10 en vol au dessus de l'impasse de la Borgne (V.A.).

HÉRON CENDRÉ *Ardea cinerea* (2113/242)
L'espèce est présente en petit nombre toute l'année sur les plages et dans les marais de la côte nord de l'île. La reproduction du Héron cendré sur l'île est désormais annuelle avec cette année au moins 1 couple - 1 adulte et deux juvéniles le 28/07 dans les marais de la Guerche (M.-P. & X.H.). On note un tout petit passage à l'automne avec par exemple 4 individus en migration active le 29/08 au dessus du vallon de l'aérodrome et 3 individus le 23/09 au dessus de la pointe du But (M.-P. & X.H.).

HÉRON POURPRÉ *Ardea purpurea* (44/3)
Le Héron pourpré est observé en petit nombre lors du passage prénuptial avec 1 individu le 23/04 en migration active au dessus du vallon de Belle Maison (D.S.), 1 individu le 30/04 en migration active devant la pointe de Gilberge (M.-P. & X.H.) et 1 adulte le 10/05 depuis la plage de la Tourette, arrivant de la mer et se dirigeant vers les marais de la Guerche (D.R.). Pas d'observation à l'automne.

CIGOGNE NOIRE *Ciconia nigra* (0/4)

Enfin deux mentions (les premières !) de Cigogne noire à l'île d'Yeu. Un individu de 1ère année, non bagué, est observé en migration active au dessus du vallon du Pissot le 04/10 (F.P.). Le lendemain 1 individu de 1ère année bagué est découvert posé dans les rochers près de la dune de la Grande Conche (D.R.) puis revu en vol en direction des marais de la Croix (V.A.) où l'oiseau sera retrouvé et bien observé le 06/10 (V.A. & F.P.). Il est probable qu'il soit resté plusieurs jours sur l'île puisque des observateurs l'auraient vu posé au centre de l'île. Cette Cigogne noire avait été baguée le 07/06/2017 à Biches dans la Nièvre puis était passée par les Pays-Bas, la Belgique et le département du Nord avant d'arriver à l'île d'Yeu (F. Chapalain, comm. pers.).

Photo © Frédéric Portier

Photo © Valérie Auriaux

CIGOGNE BLANCHE *Ciconia ciconia* (3/1)
Une nouvelle observation de Cigogne blanche sur l'île avec 2 individus en vol depuis Chiron Moreau le 16/06 (V.A.). L'espèce reste très rare sur l'île.

Il s'agit seulement de la 4ème mention certaine de l'espèce sur l'île après celle d'un individu (probablement posé auparavant dans les marais de la Guerche) en vol le 31/08/2002 (M.-P. & X. Hindermeyer), celle d'un individu posé dans les prairies de Ker Viroux le 17/04/2013 (N. Chauvet fide S. Desmarest) et celle d'un individu le 03/04/2016 en vol depuis la pointe de Gilberge, longeant le bord de mer en direction de la pointe des Corbeaux (V. Auriaux). Plusieurs autres observations nous ont toutefois été rapportées (notamment celle d'un individu posé sur le toit de l'école) mais à chaque fois sans date ou lieu précis.

SPATULE BLANCHE *Platalea leucorodia* (24/4)
L'espèce, qui reste peu commune sur l'île même si elle y est de plus en plus régulière, est de nouveau observée cette année aux deux passages : 4 individus devant la plage du Cours du Moulin le 11/04 (J.D.L.), 7 individus (5 adultes et 2 1ère année) en migration active depuis la côte sauvage près de la Pierre des Amporelles le 17/10 (A.L.), 1 individu depuis la plage des Bossilles/de la Borgne le 27/10 (S.D.) et 2 individus de 1ère année depuis la pointe des Corbeaux le 30/10 (F.L.G.).

BONDRÉE APIVORE *Pernis apivorus* (103/8)
L'espèce est peu observée de nouveau cette année avec trois données lors du passage prénuptial en avril et mai - 3 individus le 22/05 en migration active au dessus des marais de la Croix (F.P.) - et cinq données lors du passage postnuptial du 16 au 23/09 - par exemple 1 individu le 23/09 en migration active à Ker Bossy (M.-P. & X.H.).

MILAN ROYAL *Milvus milvus* (7/1)
Une seule donnée cette année lors du passage postnuptial : 1 individu le 31/10 au dessus de la mare des Broches (M.-P.H. & F.S.). L'espèce qui reste rare sur l'île semble de plus en plus régulière à l'automne.

Il s'agit seulement de la 8ème mention de l'espèce sur l'île après celles d'un individu les 26 et 27/10/1991 pointe du Châtelet (Groupe ornithologique vendéen), d'un individu au dessus de la carrière le 12/12/2010 (X. Hindermeyer), d'un individu au dessus du Sémaphore le 02/10/2016 (V. Auriaux), d'un individu au dessus de la pointe des Corbeaux le 13/10/2016 (M. Faveyrial), d'un individu en migration active au dessus de la saulaie des Sabias le 22/10/2016 (M.-P., A. & X. Hindermeyer) et d'un individu au dessus du bois de la citadelle le 22/11/2016 (V. Auriaux).

BUSARD DES ROSEAUX *Circus aeruginosus* (1337/269)
L'espèce peut être observée toute l'année sur l'île mais elle est toutefois beaucoup moins fréquente en hiver. Au moins trois couples se sont reproduits cette année sur l'île notamment dans les marais de la Croix, de la Guerche et sur la côte sauvage. Le succès reproducteur a été de 1 ou 2 jeunes à l'envol. Quelques oiseaux sont notés en migration active à l'automne, par exemple 2 individus le 04/10 au dessus de la dune de la Grande Conche (F.P.).

BUSARD SAINT-MARTIN *Circus cyaneus* (71/2)
Le Busard Saint-Martin, régulier sur l'île, n'est observé cette année que lors du passage postnuptial : 1 individu le 21/09 aux Nates (D.R.) et une femelle posée puis en vol le 04/11 dans les marais de la Guerche (M.-P. & X.H.).

BUSARD CENDRÉ *Circus pygargus* (16/1)
Après une année d'absence, le Busard cendré est de nouveau observé sur l'île lors du passage prénuptial : une femelle en migration active le 30/04 au dessus des marais de la Gorelle (X.H.). L'espèce reste rare sur l'île même si un suivi plus régulier des rapaces en migration au printemps et à l'automne devrait sans doute permettre d'augmenter le nombre de données.

ÉPERVIER D'EUROPE *Accipiter nisus* (1047/122)
L'espèce est présente toute l'année sur l'île où elle se reproduit. Pas d'indice certain de reproduction cette année. Même s'il est souvent difficile de distinguer les migrateurs des oiseaux locaux, quelques

oiseaux sont notés en migration active en septembre et octobre par exemple 2 individus en 55 minutes au dessus de la dune de la Grande Conche le 04/10 (F.P.).

Photo © Olivier Penard

BUSE VARIABLE *Buteo buteo* (257/145)

La Buse variable peut désormais être observée toute l'année sur l'île. Encore beaucoup de données cette année, y compris au printemps. Enfin, la première preuve de nidification d'un couple dans les prairies de Perdrette est apportée avec 1 adulte et 1 jeune le 09/07 (M.-P., A. & X.H.). Il est probable qu'un autre couple se soit également reproduit près des marais de la Croix. L'espèce est également observée aux deux passages - par exemple 5 individus en migration active le 24/09 au dessus du Marais Salé et 4 individus le 07/10 au dessus de Ker Bossy (M.-P. & X.H.).

BALBUZARD PÊCHEUR *Pandion haliaetus* (7/2)
Deux nouvelles observations de cette espèce, rare sur l'île mais qui semble annuelle depuis quelques années : 1 individu en vol depuis la plage des Sapins (direction pointe des Corbeaux) le 09/08 (G.B.) et 1 individu en vol depuis la plage de la Pulante (direction Port-Joinville) le 24/09 (M.-P. & X.H.).

Il s'agit seulement des 8 et 9ème mentions certaines de l'espèce sur l'île après celles d'un individu le 14/09/2006 au dessus de la pointe de la Gournaise (F. Portier & X. Hindermeyer), d'un individu le 08/07/2010 en migration active depuis la pointe du But (F. Portier), d'un individu le 27/03/2011 au dessus du vallon de Belle Maison (F. Portier & V. Auriaux), d'un individu posé puis en vol le 13/10/2013 derrière la plage du Loubinou (F. Portier), d'un individu en migration active le 07/09/2014 devant la plage des Vieilles (V. Auriaux), d'un individu en vol le 06/10/2015 au dessus des Sapins (O. Penard) et d'un individu en vol depuis la plage des Roses le 09/09/2016 (V. Auriaux). C. Bugeon signale également dans sa synthèse sur l'avifaune de l'île (2013) une observation ancienne (vraisemblablement de la fin des années 1970) rapportée par P. Paulian et V. Pontoizeau (l'oiseau aurait été tué) et une observation personnelle d'un individu pêchant devant la plage des Conches vers la fin des années 1990.

FAUCON CRÉCERELLE *Falco tinnunculus* (2696/339)
L'espèce est présente toute l'année sur l'île où elle se reproduit. Plusieurs preuves de reproduction certaine sont apportées cette année sans recherche particulière. Pas de passage marqué, ni au printemps, ni à l'automne.

FAUCON ÉMERILLON *Falco columbarius* (193/7)
L'espèce est observée cette année aux deux passages. Au printemps, 1 individu en migration active est observé le 23/05 depuis le phare des Corbeaux (F.P.). Le passage postnuptial, peu marqué cette année, n'est noté que du 03 au 19/10 avec par exemple 2 individus de type femelle en migration active depuis la plage du But le 17/10 (A.L.). Aucune observation en hiver.

FAUCON HOBEREAU *Falco subbuteo* (586/53)
Le Faucon hobereau est présent sur l'île à partir du mois d'avril - premiers oiseaux le 18/04 dans les marais de la Guerche et de la Croix (F.P.) - jusqu'au mois d'octobre - dernier oiseau le 07/10 près du Grand Phare (M.-P. & X.H.). Un seul indice certain de reproduction cette année dans les marais de la Croix. Un second couple s'est probablement reproduit sur la côte sauvage.

FAUCON PÈLERIN *Falco peregrinus* (37/11)
Toutes les observations cette année sont faites à l'automne. Un premier oiseau, une femelle adulte, est noté posé sur un cyprès près du Grand Phare le 07/10 (M.-P. & X.H.). Les autres observations s'étalent du 30/10 au 17/11 et concernent au moins trois oiseaux différents - par exemple 1 mâle immature à la pointe du But le 04/11 (J.-M.G.).

Photo © Jean-Marc Guilpain

RÂLE D'EAU *Rallus aquaticus* (551/43)
L'espèce est présente toute l'année sur l'île où elle se reproduit au moins dans les marais de la Croix. En dehors de ce site, des observations sont faites, le plus souvent à l'automne et en hiver, dans les marais de la Guerche - 3 individus le 23/10 (F.P.) - le Marais Salé, la mare du But et dans des milieux moins humides comme le fossé de la station d'épuration - 1 individu les 03/11 (M.-P. & X.H.) - derrière la plage de la Pulante et la dépression de la dune de la Grande Conche.

MAROUETTE PONCTUÉE *Porzana porzana* (5/1)
Une nouvelle observation à l'automne de cette espèce qui reste très rare sur l'île : 1 individu le 24/10 dans les marais de la Guerche (F.P.). L'espèce, très discrète, est probablement plus commune que ne le laissent supposer ces quelques rares observations…
Il s'agit seulement de la 6ème mention certaine de l'espèce sur l'île, uniquement dans les marais de la Guerche, après celle d'un individu le 28/10/2008 (F. Portier, M.-P. & X. Hindermeyer), d'un individu les 21 et 22/10/2010 (F. Portier), d'un individu le 31/10/2012 (F. Portier) et d'un individu le 09/10/2014 (F. Portier).

GALLINULE POULE-D'EAU *Gallinula chloropus* (1386/105)
L'espèce est présente toute l'année sur l'île où elle se reproduit notamment dans les marais de la Croix, de la Gorelle, au Marais Salé et dans la carrière. Le maximum, très faible, est noté en hiver au Marais Salé avec 10 individus le 07/01 (M.-P. & X.H.).

FOULQUE MACROULE *Fulica atra* (29/2)
Après deux années blanches, l'espèce est de nouveau observée cette année. Un individu est entendu le 20/04 dans les marais de la Croix (F.P.). Beaucoup plus surprenant, un oiseau est observé en vol le long de la côte sauvage au niveau de la pointe des Chancrelles venant du sud le 12/08 (G.B.). Il sera retrouvé posé devant la plage est de la pointe du But puis s'envolera plein nord en mer.

HUÎTRIER PIE *Haematopus ostralegus* (267/21)
L'espèce est observée en janvier, mars, avril, juin, juillet et septembre autour de l'île. Malgré la présence de nouveau d'un couple sur le site de nidification de 2015, pas de preuve de reproduction cette année encore. Pas de passage net, ni au printemps, ni à l'automne.

ÉCHASSE BLANCHE *Himantopus himantopus* (27/1)
Une seule observation cette année, au printemps : 8 individus en vol depuis la plage du Cours du Moulin le 10/4 (S.D.). L'espèce est de plus en plus régulière sur l'île.

GRAND GRAVELOT *Charadrius hiaticula* (1740/180)
L'espèce est observée de janvier à mai puis de fin juillet à décembre. Plus de quatre-vingt individus ont hiverné sur la côte nord. Les oiseaux quittent progressivement l'île à partir de fin février. Quelques observations ensuite de mars à mai - derniers oiseaux le 13/05 avec 1 individu plage de la Pulante et 3 individus plage des Bossilles/de la Borgne (M.-P., A. & X.H.). Le passage postnuptial est net à partir d'août et se poursuit en septembre et octobre. Les maxima sont classiquement notés à l'automne avec par exemple plus de 120 individus le 20/09 plage des Bossilles/de la Borgne (F.P.) et plus de 110 individus le 28/10 plage de la Tourette (M.-P., A. & X.H.).

GRAVELOT Á COLLIER INTERROMPU *Charadrius alexandrinus* (143/1)
L'espèce (1 individu) a hiverné tous les ans sur la côte nord de l'île de l'hiver 2006-2007 jusqu'en 2012. Plus rien ensuite. Un individu est observé cette année posé le 01/01 sur la plage des Iliaux (M.-P., A. & X.H.) mais ne sera pas revu de tout l'hiver.

PLUVIER DORÉ *Pluvialis apricaria* (194/13)
L'espèce est observée en janvier, février et mars puis en octobre et novembre. Il s'agit le plus souvent de 1 à 3 individus en vol ou posés sur la côte sauvage, les dunes ou même les plages de la côte nord - par exemple 3 individus posés sur la plage du Marais Salé le 01/01 (M.-P. & X.H.). Le maximum est de 6 individus ensemble sur l'aérodrome le 28/01 (S.D.).

PLUVIER ARGENTÉ *Pluvialis squatarola* (244/4)
L'espèce n'est observée qu'en mars et mai puis en octobre. Il s'agit presque à chaque fois de 1 à 2 individus, le plus souvent posés sur les plages de la côte nord, exceptés plus de 50 individus en vol depuis la pointe de la Père le 13/03 (M.-P.H.).

VANNEAU HUPPÉ *Vanellus vanellus* (574/62)
La petite population nicheuse de cette espèce se maintient sur l'île. Cette année au moins 10 couples nicheurs sont dénombrés sur l'aérodrome et les premiers poussins sont découverts le 14/04 (M.-P. & X.H.). Les autres observations sont effectuées en janvier, février - 23 individus sur l'aérodrome le 24/02 (M.-P., A. & X.H.) - et mars. Quelques oiseaux sont également observés début novembre - par exemple 15 individus plage de la Tourette le 01/11 (L.Ch.).

BÉCASSEAU SANDERLING *Calidris alba* (1653/219)
L'espèce, qui est en augmentation régulière depuis plusieurs années sur les rivages de l'île, est observée de janvier à mai puis de juillet à décembre. Nouveau record pour le nombre d'oiseaux hivernants cette année sur la côte nord de l'île - plus de 200 individus sont comptés le 31/12 plage des Bossilles/de la Borgne (M.-P., A. & X.H.). Le passage prénuptial est net en mai avec par exemple plus de 110 individus le 01/05 plage de le Tourette (M.-P.H.). Le passage postnuptial débute en juillet - 2 individus le 27/07 plage des Bossilles/de la Borgne (V.A. & M.-P.H.) - et se poursuit jusqu'en novembre. Les maxima sont notés en octobre et novembre avec par exemple plus de 140 individus le 25/10 et plus de 160 individus le 28/10 plage de la Tourette (M.-P., A. & X.H.), plus de 150 individus les 30/10 (B.I.), 31/10 (L.Ch) et 11/11 (M.-P.H.) plage des Bossilles/de la Borgne. Enfin, l'oiseau bagué "couleur" le 22 mai 2016 à Sandgerdi en Islande, et déjà noté en 2016, est observé jusqu'au 14/05 sur les plages de la côte nord (V.A., A.L.D., S.D., M.-P., A. & X.H.).

BÉCASSEAU TACHETÉ *Calidris melanotos* (2/1)**
Un individu est observé à 8h30 posé près de l'aérodrome le 19/08 (M.-P.H.). Malheureusement l'oiseau n'est resté que quelques minutes avant de repartir en vol vers le Grand Phare. Il n'a pas été retrouvé ensuite. Il s'agit seulement de la seconde mention pour l'île. Cette donnée est en cours d'examen par le comité d'homologation vendéen (CH85).
Il s'agit seulement de la 2ème mention de l'espèce sur l'île après celle d'un juvénile les 18 et 19/09/2010 dans les marais de la Guerche (R. Baeta, C. Lelaure, A. Liger, J. Présent, E. Sansault & X. Hindermeyer).

BÉCASSEAU VIOLET *Calidris maritima* (776/71)
L'espèce, bien présente sur l'île, y est notée de janvier à mai puis de septembre à décembre. Le nombre exact d'hivernants est difficile à estimer et les 15 individus comptés le 28/01 (S.D.) ou les 30 individus le 31/12 (M.-P., A. & X.H.) plage des Bossilles/de la Borgne sont très certainement en dessous de la réalité. Le passage prénuptial est noté en mars, avril - 75 individus posés le 02/03 plage des Bossilles/de la Borgne (S.D.) - et mai - encore plus de 45 individus pointe de la Gournaise le 13/05 (M.-P. & X.H.). Les premiers retours sont notés en septembre avec 2 individus posés le 16/09 plage des Bossilles/de la Borgne (M.-P. & X.H.). Le passage postnuptial en octobre et novembre est très peu marqué cette année - maximum 38 individus le 17/11 plage des Bossilles/de la Borgne (F.P.).

Photo © Olivier Penard

BÉCASSEAU VARIABLE *Calidris alpina* (678/32)
Le Bécasseau variable est observé aux deux passages et en hiver - par exemple 2 individus plage des Bossilles/de la Borgne le 01/01 (M.-P., A. & X.H.). Le passage prénuptial est surtout perceptible en avril avec 10 individus en vol devant la pointe du But le 18/04 (M.-P. & X.H.) et plus de 26 individus posés plage de la Tourette le 30/04 (M.F. & J.G.). Le passage postnuptial, très peu marqué cette année, débute fin juillet et se poursuit jusqu'en novembre avec par exemple 3 individus plage de la Pulante le 12/08 (G.B.) et 3 individus le 03/11 plage des Bossilles/de la Borgne (M.-P. & X.H.).

COMBATTANT VARIÉ *Philomachus pugnax* (5/3)
Après 2016, une nouvelle observation du Combattant varié sur l'île : un oiseau de 1ère année est découvert le 16/09, posé près de la pointe du Porteau (V.A., M.-P. & X.H.). Il y sera revu jusqu'au 19/09 (V.A.). L'espèce reste rare sur l'île.

Il s'agit seulement des 6 à 8ème mentions certaines de l'espèce sur l'île après celle de cinq individus le 01/05/1994 près de la mare des Broches (M.-P. & X. Hindermeyer), d'un individu les 30/08 et 01/09/2003 dans les marais de la Guerche (M.-P. & X. Hindermeyer), d'un individu le 12/09/2005 dans les marais de la Guerche (F. Portier) et d'un mâle posé le 21/08/2016 dans les marais de la Guerche (M.-P., A. & X. Hindermeyer).

Photo © Valérie Auriaux

BÉCASSINE SOURDE *Lymnocryptes minimus* (22/2)
Deux données cette année uniquement lors du passage prénuptial : 1 individu posé sur la dune de la Grande Conche le 16/03 (F.P.) et 1 individu le 17/04 dans les marais de la Guerche (M.-P. & X.H.). Aucune donnée cet automne. La Bécassine sourde reste peu commune sur l'île.

BÉCASSINE DES MARAIS *Gallinago gallinago* (171/15)
L'espèce est un peu plus observée que l'année dernière mais toujours en petit nombre. Les données s'étalent des mois de février à avril puis de septembre à décembre. Le site le plus fréquenté est toujours les marais de la Guerche mais l'espèce est également notée autour de l'aérodrome, sur la dune de la Grande Conche, au Marais Salé et sur la plage de la Tourette. Ces données ne concernent à chaque fois qu'un à deux individus sauf 4 individus le 19/02 autour de l'aérodrome (L.G.).

BÉCASSE DES BOIS *Scolopax rusticola* (24/1)
Une seule donnée d'un individu observé à Ker Pissot le 23/11 (V.A.).

BARGE Á QUEUE NOIRE *Limosa limosa* (15/1)
Une nouvelle donnée, lors du passage postnuptial, pour cette espèce qui reste rare sur l'île : 1 individu en vol devant la pointe de la Gournaise le 23/09 (M.-P. & X.H.).

BARGE ROUSSE *Limosa lapponica* (132/6)
L'espèce est observée cette année aux deux passages pré et postnuptial - par exemple 13 individus en vol depuis la pointe des Corbeaux le 08/04 (M.-P.H.) et 16 individus depuis la pointe du But le 13/09 (V.A.). Une donnée en hiver avec 2 individus posés sur la plage de la Tourette le 01/01 (M.-P., A. & X.H.).

COURLIS CORLIEU *Numenius phaeopus* (1449/166)
Classiquement, l'espèce est observée sur l'île aux deux passages prénuptial (du 08/04 au 26/05) et postnuptial (du 05/07 au 26/10). Le groupe le plus important est noté le 18/04 avec 17 individus posés pointe de Gilberge (M.-P., A. & X.H.). L'oiseau qui avait débuté son hivernage en 2016 a été noté jusqu'au 15/03 sur les plages de la côte nord de l'île. Un oiseau (le même ?), entamant peut-être un hivernage, a été observé à plusieurs reprises en décembre, toujours sur les plages de la côte nord.

COURLIS CENDRÉ *Numenius arquata* (70/2)
Très peu d'observations de nouveau cette année lors des passages pré et postnuptial : 1 individu en migration active le 21/04 (F.P.) et 3 individus posés le 16/08 (S.R.) sur la dune de la Grande Conche.

CHEVALIER GAMBETTE *Tringa totanus* (150/8)
L'espèce, régulière sur l'île, est observée aux deux passages. Le passage prénuptial a lieu en avril et mai avec par exemple 1 individu posé plage de Marais Salé le 22/04 (M.-P. & X.H.). Le passage postnuptial est peu marqué avec seulement quelques oiseaux notés en août. Ces observations ne concernent à chaque fois qu'un seul individu, exceptés 2 oiseaux le 31/08 à la Galiote (B.I.).

CHEVALIER ABOYEUR *Tringa nebularia* (164/15)
Le Chevalier aboyeur, régulier sur l'île, est observé cette année aux passages pré et postnuptial. Au printemps, l'espèce est notée du 19/04 - 1 individu en migration active au dessus de la pointe du Châtelet (F.P.) au 05/05 - 1 individu au dessus de la mare du But (D.R.). Le passage postnuptial, très peu marqué cette année, a lieu en juillet, août et octobre. Toutes les observations ne concernent qu'un individu en migration active et plus rarement posé, exceptés 3 individus en migration active au dessus de la dépression de la dune de la Grande Conche le 27/08 (M.-P. & X.H.).

CHEVALIER CULBLANC *Tringa ochropus* (291/42)
L'espèce est observée aux deux passages. Le passage prénuptial, assez marqué cette année, a lieu du 11/03 au 03/05 avec par exemple 6 individus dans les marais de la Guerche le 07/04 (M.-P., A. & X.H.). Le passage postnuptial débute classiquement en juillet - 2 individus le 07/07 dans les marais de la Guerche (M.-P. & X.H.) - mais est surtout perceptible en août et se poursuit jusqu'en octobre. Aucune observation en hiver. Les marais de la Guerche constituent toujours le principal site d'observation avec plus de 75% des données.

CHEVALIER GUIGNETTE *Actitis hypoleucos* (1071/162)
L'espèce est observée sur les côtes de l'île et dans les marais presque toute l'année. Pas d'hivernage certain cette année. Beaucoup d'observations mais on ne note pas de groupes importants lors des passages pré et postnuptial - maximum 6 individus ensemble les 25/05 pointe du But (M.-P. & X.H.) et 11/09 plage des Iliaux (V.A.).

TOURNEPIERRE Á COLLIER *Arenaria interpres* (2719/320)
L'espèce, commune, est observée presque toute l'année sur l'île. Plus de 100 individus ont hiverné sur l'île cette année. Un petit passage est noté en avril avec par exemple plus de 170 individus le 16/04 plage des Bossilles/de la Borgne (M.-P., A. & X.H.). Le passage postnuptial, plus marqué, est noté à partir d'août mais est surtout perceptible en octobre et novembre avec par exemple plus de 200

individus le 05/10 (F.P.) et plus de 250 individus le 03/11 (M.-P. & X.H.) plage des Bossilles/de la Borgne.

PHALAROPE À BEC LARGE *Phalaropus fulicarius* (14/1)
L'espèce, toujours rare dans les eaux de l'île, est observée de nouveau cet automne : 1 individu de 1ère année est observé au passage pointe des Corbeaux le 15/09 (X.H. & V.A.).

LABBE POMARIN *Stercorarius pomarinus* (96/14)
L'espèce, peu abondante mais très régulière, est observée en petit nombre uniquement lors du passage postnuptial (du 16/08 au 03/11). Il s'agit à chaque fois d'un ou deux individus - maximum 3 individus au passage en 35 minutes le 16/08 devant la pointe du But (M.-P.H.). Pas de donnée en hiver.

LABBE PARASITE *Stercorarius parasiticus* (213/64)
L'espèce est observée cette année aux deux passages. Au printemps, le passage, presque inexistant, a lieu en avril avec par exemple 1 individu le 30/04 depuis la Galiote (M.F. & L.Ch.). Au contraire, à l'automne le passage (du 04/07 au 29/10) est très marqué. Il concerne de 1 à 7 individus à chaque fois, exceptés 12 individus au passage le 30/08 depuis la pointe du But (M.-P. & X.H.) puis 11 individus le 01/09 (B.I., M.-P. & X.H.) et 9 individus le 23/09 (M.-P. & X.H.) depuis la pointe des Corbeaux. A noter un oiseau de 1ère année très peu farouche qui a stationné d'abord pointe des Corbeaux puis pointe du But du 18/08 au 20/09.

Photo © Marie-Paule Hindermeyer

GRAND LABBE *Stercorarius skua* (557/64)
Le Grand Labbe est toujours le labbe le plus commun dans les eaux de l'île. Il y est observé cette année de février à mai puis d'août à novembre. Il ne s'agit à chaque fois que d'un à cinq oiseaux, exceptés 7 individus le 26/03 lors de la traversée Yeu-Fromentine (B.I.), 12 individus le 13/04 lors de

la traversée Fromentine-Yeu (M.-P.H.) et 7 individus le 04/11 au passage devant la pointe du But (J.-M.G., A.T., F.L.G., M.-P. & X.H.).

MOUETTE MÉLANOCÉPHALE *Larus melanocephalus* (668/85)
L'espèce, désormais assez commune, est observée cette année sur l'île de janvier à avril puis de juillet - 1 individu de 2ème année plage de la Pulante le 08/07 (M.-P. & X.H.) - à décembre. Pas de gros groupes notés. En fin d'hiver on note un petit passage avec par exemple 27 individus posées plage des Bossilles/de la Borgne et 11 individus plage du Marais Salé le 20/02 (M.-P., A. & X.H.). Pas de passage marqué à l'automne.

MOUETTE PYGMÉE *Hydrocoloeus minutus* (203/6)
Très peu d'observations encore cette année en février et novembre seulement. Une seule observation de fin d'hiver avec 2 individus au passage pointe de la Gournaise le 23/02 (M.-P. & X.H.). Pas de passage noté au printemps. A l'automne, le passage a lieu en novembre - maximum plus de 15 individus devant la pointe du But le 17/11 (F.P.).

MOUETTE DE SABINE *Xema sabini* (37/1)
Nouvelle observation à l'automne de cette espèce peu commune mais cependant régulière dans les eaux de l'île : 2 individus (1 adulte et 1 1ère année) au passage le 23/10 devant la pointe des Corbeaux (M.-P.H.).

MOUETTE RIEUSE *Chroicocephalus ridibundus* (2206/291)
L'espèce est observée presque toute l'année sur l'île. Les maxima sont notés en hiver avec par exemple plus de 120 individus le 02/12 posés à Port-Joinville (M.-P. & X.H.). La majorité des oiseaux quitte l'île en février-mars, quelques individus étant encore observés jusqu'en juin. Les premiers retours ont lieu dès début juillet avec déjà 53 individus le 05/07 plage de Ker Châlon et 78 individus le 08/07 plage de la Pulante (M.-P. & X.H.).

GOÉLAND CENDRÉ *Larus canus* (351/86)
Beaucoup d'observations cette année. L'espèce, qui hiverne sur l'île, est observée principalement de janvier à avril puis d'octobre à décembre. Les maxima sont notés en hiver avec par exemple 45 individus le 17/01 (M.-P.H.) et 41 individus le 11/02 (D.D.) plage des Vieilles. Les observations concernent de 1 à 15 individus exceptés 17 individus le 03/11 au passage devant la pointe des Corbeaux et 19 individus posés le 22/02 plage des Vieilles (M.-P., A. & X.H.).

GOÉLAND LEUCOPHÉE *Larus michahellis* (178/28)
Le Goéland leucophée ne niche plus sur l'île même si cette année un oiseau est observé dans la carrière les 19/04 (F.P.) et 29/04 (M.-P. & X.H.). Un peu plus de données cette année. L'espèce est observée de janvier à mai puis de juillet à septembre et en décembre. Ces observations ne concernent qu'un ou deux individus à chaque fois. L'espèce doit souvent passer inaperçue dans les grands groupes de laridés.

GOÉLAND MARIN *Larus marinus* (2444/346)
L'espèce est commune et nicheuse sur l'île où elle est observée toute l'année. Pas de recensement au printemps des couples nicheurs sur la côte sauvage. Les maxima sont notés à l'automne à Port-Joinville avec par exemple plus de 240 individus le 19/08 et plus de 250 individus le 25/08 (M.-P., A. & X.H.). En hiver, plus de 200 individus sont comptés à Port-Joinville, dans le port de plaisance, le 31/12 (M.-P. & X.H.). De très nombreux oiseaux bagués "couleur" ont été observés cette année (368 lectures concernant 83 individus différents) : plusieurs oiseaux bagués en Seine-Maritime, au Havre et sur l'îlot du Ratier (G. Le Guillou, comm. pers.), sur l'archipel de Chausey et sur les îles Saint-Marcouf dans la Manche (F. Gallien, comm. pers.), sur la RNN de Lilleau des Niges sur l'île de Ré en Charente-Maritime (J. Gernigon, comm. pers.), sur les îles Looe et Mullion (Cornouailles) en Angleterre (B. Taggart & M. Grantham, comm. pers.), à Karmøy (Rogaland) en Norvège (N. H. Lorentzen, comm. pers.) et surtout de très nombreux oiseaux bagués dans le cadre du programme PERISCOPE.

Photo © Marie-Paule Hindermeyer

GOÉLAND BRUN *Larus fuscus* (1733/184)
L'espèce est commune et nicheuse sur l'île où elle est observée toute l'année. Pas de recensement au printemps des couples nicheurs sur la côte sauvage. En fin d'hiver, plus de 350 individus sont observés pointe du Châtelet le 13/02 (D.D.). A l'automne, le passage est net fin août avec plus de 250 individus les 27 et 31/08 (M.-P., A. & X.H.). De nombreux oiseaux ont été bagués sur la côte sauvage de l'île dans le cadre du programme PERISCOPE (F. Latraube, com. pers.). Plusieurs oiseaux bagués "couleur" ont été observés cette année (85 lectures concernant 79 individus différents). Il s'agit d'oiseaux du programme PERISCOPE mais aussi d'oiseaux bagués à Guernesey (P. Veron, comm.pers.), à Vlissingen-Oost (Zeeland) et à Rotterdam (Zuid-Holland) aux Pays-Bas (R.-J. Buijs, comm. pers.), à Pitsea dans l'Essex en Angleterre (P. Roper comm. pers.), sur l'île Revsholmen (Aust-Agder) en Norvège (N. H. Lorentzen, comm. pers.) et sur la réserve naturelle nationale de Lilleau des Niges sur l'île de Ré en Charente-Maritime (J. Gernigon, comm. pers.).

GOÉLAND ARGENTÉ *Larus argentatus* (2046/263)
L'espèce est commune et nicheuse sur l'île où elle est observée toute l'année. Pas de recensement au printemps des couples nicheurs sur la côte sauvage. Les oiseaux arrivent tôt sur la côte sauvage avec déjà plus de 150 individus près du gouffre d'Enfer le 07/01 (M.-P. & X.H.). Pas de passage net au printemps. A l'automne, un petit passage est noté avec plus de 350 individus posés pointe de la Gournaise le 03/11 (M.-P., A. & X.H.). Quelques oiseaux bagués "couleur" ont été observés cette année (5 lectures concernant 5 individus différents). Il s'agit d'oiseaux bagués dans le cadre du programme PERISCOPE et à Guernesey (P. Veron, comm.pers.).

GOÉLAND PONTIQUE *Larus cachinnans* (5/5)**
Belle série d'observations de Goéland pontique cette année. Un premier oiseau adulte est découvert le 11/03 plage de la Tourette (M.-P.H.). Il avait été bagué à Hortobágy en Hongrie le 13/05/2011 (Hungarian Bird Ringing Centre, comm. pers.). Un second individu de 2ème année est observé à Port-Joinville les 18 et 19/04 (M.-P. & X.H.). A l'automne, un individu de 1ère année est noté le 19/10 pointe des Corbeaux (A.L.). Enfin, un dernier individu de 2ème année est trouvé le 02/12 pointe de la

Gournaise (M.-P. & X.H.). L'espèce semble de plus en plus régulière sur l'île. Ces données sont en cours d'examen par le comité d'homologation vendéen (CH85).

L'espèce avait été vue pour la première fois sur la côte nord de l'île en 2009 avec un individu de 3ème hiver les 01 et 16/02 (M.-P., A. & X. Hindermeyer). L'espèce avait de nouveau été observée en 2011 avec 1 adulte posé sur la plage de la Tourette les 15 et 16/01 (X. Hindermeyer). Le comité d'homologation Loire-Atlantique et Vendée (CH44-85) a décidé, bien qu'il s'agisse très probablement de cette espèce, mais en l'absence d'éléments photographiques permettant d'exclure un éventuel hybride, de ne pas valider ces observations en tant que Goéland pontique "pur". Il s'agit donc seulement de la 5ème mention de l'espèce sur l'île après celles d'un individu de 3ème année le 09/03/2013 plage du Marais Salé, d'un adulte le 24/10/2013 pointe des Corbeaux (M.-P. & X. Hindermeyer), d'un individu de 1ère année le 27/10/2014 pointe des Corbeaux (A. & M.-P. Hindermeyer), d'un individu de 2ème année le 18/02/2015 pointe de la Gournaise (M.-P., A. & X. Hindermeyer) et d'un individu adulte plage du Marais Salé le 31/12/2016 (M.-P., A. & X. Hindermeyer).

Photos © Xavier Hindermeyer

GOÉLAND BOURGMESTRE *Larus hyperboreus* (8/2)**
Un individu de 1ère année est observé et photographié les 28 et 29/12 à Port-Joinville, respectivement sur la digue et dans le port de plaisance (M.-P.H. & D.S.). L'espèce reste rare sur l'île.

Il s'agit seulement des 9 et 10ème mentions de l'espèce sur l'île après celles d'un immature les 30/04 et 02/05/1994 plage de Ker Châlon (M.-P. & X. Hindermeyer), d'un individu le 18/01/1998 toujours plage de Ker Châlon (L. Geslin), d'un 1er hiver le 02/01/2004 plage des Bossilles/de la Borgne (M.-P. & X. Hindermeyer), d'un individu de 1er hiver depuis la Pierre des Amporelles, d'un individu depuis la Planche à Puare le 01/02/2009 (X. Hindermeyer), d'un individu de 2ème année dans la carrière le 24/05/2015 (M.-P. & X. Hindermeyer) et d'un individu de 2ème année plage de la Pulante le 11/01/2017 (S. Desmarest & E. Batiot).

Photo © Marie-Paule Hindermeyer

MOUETTE TRIDACTYLE *Rissa tridactyla* (796/57)
L'espèce est observée de janvier à mai puis d'octobre à décembre. Au printemps, le dernier oiseau est observé pointe du Châtelet 27/05 (M.-P. & X.H.). A l'automne, les premiers oiseaux sont notés seulement en octobre et le passage est très peu marqué. Quelques oiseaux en début d'hiver, par exemple plus de 70 individus devant la pointe des Corbeaux et plus de 50 individus devant la plage des Broches le 02/12 (M.-P. & X.H.).

STERNE NAINE *Sternula albifrons* (27/1)
Une seule nouvelle observation cette année pour cette sterne qui reste peu commune dans les eaux de l'île : 7 individus au passage en 30 minutes devant la pointe du But le 28/07 (M.-P. & X.H.).

GUIFETTE NOIRE *Chlidonias niger* (54/1)
Une seule observation cette année, lors du passage postnuptial, avec 2 individus devant la plage des Bossilles/de la Borgne le 20/09 (F.P.). Aucune donnée au printemps.

STERNE HANSEL *Gelochelidon nilotica* (5/1)**
Deux adultes sont observés au passage devant la pointe des Corbeaux le 25/05 (M.-P. & X.H.). L'espèce reste très rare sur l'île. Cette donnée est en cours d'examen par le comité d'homologation vendéen (CH85).

Il s'agit seulement de la 6ème mention de l'espèce sur l'île après celles de 4 individus le 06/03/1998 plage de la Petite Conche (M.-P. & X. Hindermeyer), de 2 individus les 07 et 08/03/2003 plage des Ovaires (M.-P. & X. Hindermeyer), d'un individu entre l'île et le continent le 04/04/2003 filant vers le nord-est (F. Portier) et de deux adultes en vol au dessus de la dune de la Grande Conche le 28/04/2013 (X. Hindermeyer).

STERNE CAUGEK *Sterna sandvicensis* (2749/353)
L'espèce, commune sur l'île, peut y être observée toute l'année. Le passage prénuptial est net en avril et mai avec par exemple plus de 140 individus plage des Ovaires le 21/04 (M.-P., A. & X.H.) et plus de 200 individus posés pointe de la Gournaise le 02/05 (D.R.). Le passage postnuptial débute en juillet et se poursuit en août et septembre avec un maximum de plus de 280 individus le 13/08 pointe des Corbeaux (S.R.). Enfin, l'espèce hiverne désormais tous les ans dans les eaux de l'île - par exemple 22 individus posés plage des Ovaires le 07/01 (M.-P. & X.H.).

STERNE PIERREGARIN *Sterna hirundo* (461/13)
L'espèce est très peu observée cette année aux deux passages. Une seule observation au printemps avec 2 individus lors de la traversée Fromentine-Yeu le 29/04 (L.Ch.). Même si quelques oiseaux sont notés en juin, le passage postnuptial débute vraiment fin juillet et se poursuit jusqu'en septembre - dernier oiseau le 20/09 pointe des Corbeaux (V.A. & D.R.). Il est peu marqué avec au maximum 8 individus au passage devant la pointe de la Gournaise le 28/07 (M.-P. & X.H.).

STERNE ARCTIQUE *Sterna paradisaea* (92/1)
L'espèce n'est observée qu'une fois cette année lors du passage postnuptial : 1 individu de 1ère année pointe des Corbeaux le 12/09 (V.A.).

GUILLEMOT DE TROÏL *Uria aalge* (513/42)
Le Guillemot de Troïl, qui se tient plus au large que le Pingouin torda, est noté cette année de janvier à mai puis de septembre à décembre. Le nombre d'individus est modeste avec le plus souvent moins d'une quinzaine d'individus - maximum plus de 25 oiseaux posés devant la pointe des Corbeaux le 18/02 (M.-P., A. & X.H.). A l'automne, le passage est noté en octobre et novembre - 15 individus au passage en 20 minutes le 11/11 devant la pointe du But (M.-P.H.).

PINGOUIN TORDA *Alca torda* (1108/112)
Le Pingouin torda est bien présent dans les eaux de l'île de janvier à mai - derniers le 22/05 à Port-Joinville et lors de la traversée Yeu-Fromentine (R.C.) puis de septembre - premier le 15/09 pointe des Corbeaux (M.-P. & X.H.) - à décembre. Pas de passage net noté au printemps. A l'automne, le passage est marqué en octobre avec par exemple 142 individus, dont 72 en 25 minutes, le 23/10 depuis la pointe du But (M.-P.H.). Assez peu d'oiseaux en hiver cette année.

On note, de nouveau cette année, un passage tout à fait remarquable d'alcidés (Pingouin torda/Guillemot de Troïl) en novembre avec par exemple plus de 2 085 individus en 1h00 le 05/11 devant la pointe du But (J.D.L.).

PIGEON COLOMBIN *Columba oenas* (179/24)
L'espèce n'est observée cette année que lors du passage postnuptial du 04/10 au 14/11. Ces observations concernent le plus souvent de 1 à 12 oiseaux, exceptés 35 individus en migration active en 55 minutes le 04/10 au dessus de la dune de la Grande Conche (F.P.) et 32 individus le 28/10 au dessus de la plage de la Tourette (M.-P. & X.H.). Les oiseaux posés sont plus rares - par exemple au moins 6 individus dans les prairies de Perdrette le 07/10 et 1 individu dans la dépression de la dune de la Grande Conche le 31/10 (O.Pe.).

PIGEON RAMIER *Columba palumbus* (1855/248)
L'espèce est commune et nicheuse sur l'île où elle est observée toute l'année. Aucun passage marqué n'est noté au printemps et à l'automne.

TOURTERELLE TURQUE *Streptopelia decaocto* (1408/190)
L'espèce est commune et nicheuse sur l'île principalement autour des zones urbanisées. Elle y est observée toute l'année. On note un petit passage au printemps avec par exemple 12 individus en migration active le 23/05 depuis le phare des Corbeaux (F.P.). Le maximum d'oiseaux ensemble est noté le 05/10 à la Bergerie avec seulement 18 individus (F.P.).

TOURTERELLE DES BOIS *Streptopelia turtur* (566/54)
L'espèce, nicheuse de plus en plus rare sur l'île, est observée d'avril - première le 16/04 plage du Cours du Moulin (B.I.) - à octobre. Pas d'indice certain de nidification cette année. Le passage prénuptial est surtout perceptible en avril avec par exemple 152 individus en migration active au dessus de la dune de la grande Conche le 22/04 (M.-P. & X.H.). Le passage postnuptial est très peu marqué avec seulement quelques oiseaux isolés en août, septembre et octobre - dernier individu le 03/10 dans la dépression de la dune de la Grande Conche (F.P.).

COUCOU GRIS *Cuculus canorus* (786/38)
L'espèce, nicheuse sur l'île, est observée à partir d'avril - premier individu chanteur le 07/04 dans les marais de la Croix (M.-P.H.) - jusqu'en juin. Le maximum de contacts auditifs et visuels a lieu en avril et mai.

EFFRAIE DES CLOCHERS *Tyto alba* (137/12)
L'Effraie des clochers, nicheuse sur l'île, est notée de février à mai puis en août et octobre - par exemple 1 individu sur le site de l'école des pêches à Port-Joinville le 08/04 (M.-P.H.). Pas d'indice certain de nidification cette année.

PETIT-DUC SCOPS *Otus scops* (41/30)**
Le Petit-duc scops fait désormais partie de l'avifaune nicheuse de l'île d'Yeu. Au moins un couple s'est très probablement reproduit de nouveau cette année entre les Nates, Ker Aura et le marais Mottou. Le premier chanteur est entendu dès le 13/04 près des Nates (M.-P.H.). Un petit passage prénuptial est noté fin mai-début juin avec 7 chanteurs différents comptés le 24/05 (M.-P. & X.H.). Des chanteurs sont entendus à Ker Bossy, Ker Châlon, au camping et près du marais de la Croix. L'espèce sera ensuite revue régulièrement jusqu'en août - dernier oiseau entendu le 19/08 près des Nates (M.-P. & X.H.). Ces données sont en cours d'examen par le comité d'homologation vendéen (CH85). Il est très probable que l'espèce progresse dans les années à venir mais le facteur limitant est très probablement le manque de sites de nidification favorables. Trois nichoirs ont été installés l'année dernière, sans succès pour l'instant.

HIBOU MOYEN-DUC *Asio otus* (91/2)
Très peu d'observations cette année. Le Hibou moyen-duc se reproduit toujours sur l'île comme en témoignent l'observation d'au moins deux jeunes le 08/07 près du vallon des Soux (S.D., M.-P. & X.H.).

HIBOU DES MARAIS *Asio flammeus* (38/3)
L'espèce, peu commune sur l'île, est observée classiquement lors du passage postnuptial : 1 individu posé pointe du Château Maugarni le 01/10 (F.P.), 1 individu découvert près du Vieux Château le 01/11 (D.R. & F.L.G.) et 1 individu qui arrive de la mer à la pointe du But et se pose sur les Chiens Perrins le 03/11 (B.I.).

ENGOULEVENT D'EUROPE *Caprimulgus europaeus* (6/1)
Observation étonnante, lors de la traversée, d'un individu qui vient juste au dessus de bateau pour continuer en direction de l'île le 12/05 (M.R.).

*Il s'agit seulement de la 7ème mention certaine de l'espèce sur l'île. En effet, il est très probable que l'espèce nichait sur l'île au début du XXème siècle comme en témoigne L. Magaud d'Aubusson (1909) qui indique que "pendant l'été, jusqu'à la mi-septembre, des Engoulevents (*Caprimulgus europaeus*) volent le soir au dessus des landes". Il faut ensuite attendre l'observation d'un individu en vol le 26/08/1992 derrière la pointe de la Gournaise (M. Bouron & S. Gautereau) puis de deux individus posés le 22/04/2015 sur le chemin près des Tchinettes (T. Magniez) et d'un mâle chanteur du 19 au 21/05/2016 dans la pinède de la plage de la Petite Conche (F.Portier & X. Hindermeyer). Enfin, C. Bugeon signale dans sa synthèse sur l'avifaune de l'île (2013) que l'espèce a été entendue dans les années 1970 par P. Paulian et dans les années 1980 par lui-même.*

MARTINET NOIR *Apus apus* (920/114)
L'espèce, nicheuse sur l'île, est observée du 18/04 - 2 individus en migration active à Ker Châlon et 1 individu au dessus des prairies de Perdrette (M.-P. & X.H.) - au 06/09 - 1 individu au dessus de la dune de la Grande Conche (V.A.). Pas de passage marqué au printemps et à l'automne - maximum plus de 50 individus en migration active au dessus de Ker Bossy le 14/08 (M.-P. & X.H.).

MARTIN-PÊCHEUR D'EUROPE *Alcedo atthis* (808/44)
Le Martin-pêcheur d'Europe est observé cette année en février puis d'août à décembre. Pas d'observation au printemps. L'espèce est notée à partir du 15/08 avec un premier oiseau dans les marais de la Guerche (M.-P. & X.H.). Elle est ensuite régulièrement observée jusqu'en décembre. La très grande majorité des observations est réalisée sur la côte nord de l'île et dans les marais. Les observations sur la côte sauvage sont plus rares - 1 individu le 22/09 plage des Sabias (S.D.) et 1 individu le 26/10 entre La Croix et les Tchinettes (J.R.). Aucun indice de reproduction.

Photo © Frédéric Portier

HUPPE FASCIÉE *Upupa epops* (128/12)
L'espèce est observée uniquement au printemps. Les deux premiers oiseaux sont notés le 17/03 pointe du Porteau (V.A.) et le dernier le 22/04 dans les marais de la Guerche (M.-P. & X.H.). Pas de preuve de reproduction sur l'île cette année.

TORCOL FOURMILIER *Jynx torquilla* (81/5)
Le Torcol fourmilier n'est observé cette année que lors du passage postnuptial. Les observations s'étalent du 25/08 au 19/10 - 1 individu dans la dépression de la dune de la Grande Conche (A.L.) - et ne concernent qu'un individu à chaque fois.

PIC VERT *Picus viridis* (4/1)
Nouvelle observation du Pic vert qui reste très rare sur l'île : 1 mâle est entendu le 04/10 dans les pins derrière la dépression de la dune de la Grande Conche (F.P.).

*Il s'agit seulement de la 3ème mention de l'espèce sur l'île après 1 individu en migration active au dessus de la dune de la Grande Conche le 26/10 (M.-P. & X. Hindermeyer) et 2 individus le 15/09/2012 à Ker Gigou (*fide *V. Auriaux). A noter qu'une loge attribuée à cette espèce a été découverte dans un Pin maritime pendant l'été 1994 (M. Bouron & S. Daydé). Enfin, C. Bugeon signale dans sa synthèse sur l'avifaune de l'île (2013) avoir entendu le rire du Pic vert au printemps dans les premières années de la décennie 1980 au cœur de l'île dans les boqueteaux de grands cyprès "macrocarpes", une fois aussi dans le bois mixte des Sapins près du Fort Gauthier dans les années 1990.*

PIC ÉPEICHE *Dendrocopos major* (61/4)
Toutes les observations ont lieu cette année à l'automne. Un individu est noté autour du Marais Salé du 18 au 24/09 (D.R., F.P., M.-P. & X.H.) puis un oiseau est observé le 04/11 près de la saulaie de Saint-Sauveur (J.-M.G.). Le Pic épeiche est aujourd'hui beaucoup plus régulier sur l'île.

ALOUETTE CALANDRELLE *Calandrella brachydactyla* (37/2)**
L'espèce n'est observée cette année que lors du passage prénuptial : 1 individu posé près du phare des Corbeaux le 23/05 (F.P.) et 1 individu posé pointe de la Tranche le 25/05 (M.-P. & X.H.). Ces données sont en cours d'examen par le comité d'homologation vendéen (CH85).

Photo © Frédéric Portier

ALOUETTE LULU *Lullula arborea* (65/9)
L'espèce est de nouveau peu notée sur l'île cette année. Au printemps, 1 individu est observé sur la dune de la pointe de la Gournaise le 10/03 (M.-P., A. & X.H.). Le passage postnuptial est peu marqué avec seulement quelques individus en migration active du 24 au 31/10 - maximum 4 individus au dessus de la pointe de la Tranche le 26/10 (M.-P. & X.H.).

ALOUETTE DES CHAMPS *Alauda arvensis* (1147/124)
L'espèce ne niche plus sur l'île depuis plusieurs années. Elle y est observée aux deux passages, principalement en mars et en octobre. Les passages sont très peu marqués au printemps et à l'automne cette année avec seulement 30 individus près du Grand Phare le 14/03 (V.A.), plus de 45 individus près de la carrière le 26/10 (D.R.) et 40 individus sur l'aérodrome le 31/10 (L.Ch.). Les derniers oiseaux sont notés le 17/11 à la Bergerie et en migration active pointe des Corbeaux (F.P.).

HIRONDELLE DE RIVAGE *Riparia riparia* (332/43)
L'espèce est notée en petit nombre aux deux passages. Le passage prénuptial débute en mars - deux premiers oiseaux le 11/03 dans les marais de la Guerche (M.-P.H.) - et se poursuit en avril et mai - dernier oiseau le 23/05 en migration active au dessus des marais de la Guerche (F.P.). Il s'agit à chaque fois de moins de 10 individus, exceptés 30 oiseaux le 15/04 dans les marais de la Guerche (M.-P. & X.H.). Le passage postnuptial, peu marqué, débute en août - deux premiers oiseaux le 14/08 depuis la pointe des Corbeaux (S.R.) - et se poursuit jusqu'en octobre - dernier individu en migration active le 04/10 au dessus de la dépression de la dune de la Grande Conche (F.P.).

HIRONDELLE RUSTIQUE *Hirundo rustica* (2862/453)
L'espèce est commune et nicheuse sur l'île. Elle y est observée aux deux passages. Le passage prénuptial débute en mars - deux premières le 12/03 pointe des Corbeaux (V.A., S.D., M.-P.H.) - et se poursuit en avril et mai. Le passage postnuptial débute en juillet et se poursuit jusqu'en novembre - par exemple plus d'une centaine d'individus le 26/09 depuis la pointe des Corbeaux (D.R.). Les deux derniers oiseaux sont notés le 17/11 depuis la dépression de la dune de la Grande Conche (F.P.) et le phare des Corbeaux (F.P. & V.A.).

HIRONDELLE DE FENÊTRE *Delichon urbicum* (443/30)
L'espèce est observée aux deux passages. Le passage prénuptial est noté en mars - deux premiers oiseaux le 11/03 dans les marais de la Guerche (M.-P.H.) - avril et mai. Il est peu marqué cette année avec par exemple un maximum de plus de 30 individus ensemble le 14/05 dans les marais de la Guerche (M.-P., A. & X.H.). Pas d'indice certain de reproduction cette année sur l'île. Le passage postnuptial est quasi-inexistant avec seulement deux données : 1 individu au dessus de la mare des Broches le 10/09 (V.A.) et 1 individu en migration active depuis le phare des Corbeaux le 04/10 (F.P.).

HIRONDELLE ROUSSELINE *Cecropis daurica* (5/1)**
L'Hirondelle rousseline est de nouveau observée cette année au printemps : 1 individu passe en vol au dessus des marais de la Guerche le 05/06 (M.-P. & X.H.). L'espèce semble de plus en plus régulière sur l'île, principalement au printemps. Cette donnée est en cours d'examen par le comité d'homologation vendéen (CH85).

Il s'agit seulement de la 6ème mention de l'espèce sur l'île après l'observation d'un individu le 05/05/2012 au dessus des marais de la Guerche (X. Hindermeyer), d'un autre le 30/10/2012 au dessus de la dune de la Grande Conche (F. Portier), d'un individu le 19/04/2014 en vol autour du phare des Corbeaux (M. Faveyrial, L. Chaillot et al.*), d'un individu en migration active le 22/04/2015 près du Chiron Moreau (M.-P., A. & X. Hindermeyer) et d'un adulte le 19/05/2016 dans les marais de la Guerche (F. Portier).*

PIPIT DE RICHARD *Anthus richardi* (8/2)**
Nouvelles observations de Pipit de Richard sur l'île à l'automne : 1 individu décolle en criant le 04/10 près du phare des Corbeaux (F.P.) et 1 individu passe en criant au dessus de la plage des Bossilles/de la Borgne le 10/10 (D.R. & V.A.). L'espèce est donc sans doute beaucoup plus régulière aux deux passages que ne le laissent supposer les quelques observations réalisées sur l'île. Ces données sont en cours d'examen par le comité d'homologation vendéen (CH85).

Il s'agit seulement des 9 et 10ème fois que l'espèce est observée sur l'île après celles d'un individu le 17/04/1995 posé sur l'aérodrome (M.-P. & X. Hindermeyer), d'un individu le 05/09/2009 près de la Pierre à Monsieur (O. Pénard), d'un individu le 19/09/2009 près de la pointe du Châtelet (F. Caloin), d'un individu en vol le 16/10/2011 depuis la pointe du But (G. Ouigre), d'un individu du 30/10 au 04/11/2012 sur la plage et la dune de la plage de la Tourette (M.-P. & X. Hindermeyer et al.*), d'un individu le 23/10/2013 au même endroit (M.-P., A. & X. Hindermeyer), d'un individu le 20/04 (M.-P., A. & X. Hindermeyer) puis de deux individus le 22/04/2015 (V. Auriaux) sur la dune de la Grande Conche.*

PIPIT ROUSSELINE *Anthus campestris* (122/9)
Le Pipit rousseline est observé cette année en petit nombre aux deux passages. Au printemps, l'espèce est notée en avril et 1 individu tardif est observé le 26/05 pointe de la Tranche (M.-P. & X.H.). A l'automne, le passage postnuptial s'étale du 22/08 au 23/09 avec par exemple 2 individus près de la Pierre Tremblante puis pointe de la Père le 25/08 (M.-P., A. & X.H.). Toutes les observations ne concernent qu'un ou, plus rarement, deux individus. Cette tendance à la diminution est encore à confirmer dans les années qui viennent.

PIPIT DES ARBRES *Anthus trivialis* (386/57)
L'espèce est observée cette année aux deux passages. Le passage prénuptial s'étale du 09/04 - 5 individus posés dans la dépression de la dune de la Grande Conche (M.-P.H.) - au 23/05 - 1 individu dans la dépression de la dune de la Grande Conche (F.P.). Le passage postnuptial débute le 14/08 avec 1 individu pointe des Corbeaux (S.R.) et se poursuit en septembre et octobre - dernier oiseau le 05/10 en migration active au dessus de la station d'épuration (F.P.). Il s'agit souvent d'oiseaux en vol en

migration active mais également d'oiseaux posés. Les maxima sont notés lors du passage postnuptial avec par exemple 11 individus posés dans les prairies de Ker Bossy le 19/08 (M.-P. & X.H.).

PIPIT FARLOUSE *Anthus pratensis* (3839/697)
L'espèce est commune et nicheuse sur l'île. Elle y est observée toute l'année, y compris en hiver. Pas de décompte précis des oiseaux nicheurs mais l'espèce est à surveiller dans les années qui viennent puisqu'elle est désormais classée comme vulnérable dans la dernière liste rouge des espèces menacées en France (UICN France, MNHN, LPO, SEOF & ONCFS, 2011) et en danger de disparition dans la liste rouge des oiseaux nicheurs des Pays de la Loire (Marchadour *et al.*, 2014). Comme tous les ans, un net passage est noté à l'automne avec par exemple plus de 1 140 individus comptés en migration active en 1h05 le 03/10 et plus de 850 individus en 55 minutes le 04/10 au dessus de la dune de la Grande Conche (F.P.).

PIPIT À GORGE ROUSSE *Anthus cervinus* (13/1)**
Nouvelle observation de cette espèce rare sur l'île avec 1 individu en brève halte migratoire près du phare des Corbeaux le 04/10 (F.P.). Cette donnée est en cours d'examen par le comité d'homologation vendéen (CH85).

PIPIT MARITIME *Anthus petrosus* (1392/204)
L'espèce est nicheuse sur l'île et y est observée toute l'année. Pas de comptage des couples nicheurs sur la côte sauvage. L'espèce est à surveiller dans les années qui viennent puisqu'elle est désormais classée comme vulnérable dans la liste rouge des oiseaux nicheurs des Pays de la Loire (Marchadour *et al.*, 2014). Un petit passage est noté en fin d'hiver avec plus de 20 individus le 23/02 plage du Loubinou (M.-P. & X.H.). L'augmentation du nombre d'oiseaux à l'automne et en hiver correspond très certainement à des oiseaux plus nordiques. A noter, de nouveau cette année, l'observation au printemps d'un individu adulte de la sous-espèce *littoralis* le 16/03 plage de la Pulante (F.P.).

BERGERONNETTE GRISE *Motacilla alba* (2784/352)
La sous-espèce type *Motacilla alba alba* est commune et nicheuse sur l'île, notamment à Port-Joinville et à la carrière. Elle y est observée toute l'année. Le passage prénuptial est noté en mars avec par exemple 54 individus comptés le 16/03 en différents points de l'île (F.P. & V.A.). Le passage postnuptial est perceptible dès le début septembre et se poursuit jusqu'en novembre. Il est net en octobre avec par exemple 58 individus comptés le 03/10 sur l'île (F.P. & D.R.) ou encore 30 individus le 16/10 sur la seule plage des Bossilles/de la Borgne (A.L.). Quelques individus ont hiverné de nouveau cette année sur les plages de la côte nord de l'île - par exemple 1 individu plage de la Tourette le 23/12 (B.I.).
La sous-espèce *Motacilla alba yarrellii* est observée seulement jusqu'au 15/03 - avec par exemple 5 individus plage de la Tourette (F.P.) - et à partir du 25/09 avec au moins 1 individu à l'école primaire publique du Ponant (F.S.). Le nombre d'individus ensemble n'excède presque jamais la dizaine, excepté 23 individus posés plage des Bossilles/de la Borgne le 13/03 (M.-P.H.).

BERGERONNETTE PRINTANIÈRE *Motacilla flava* (658/79)
L'espèce est observée aux deux passages. Le passage prénuptial, peu marqué, a lieu en avril et mai - maximum 8 individus pointe des Corbeaux le 29/04 (L.Ch.). Le passage postnuptial s'étale du 22/08 au 16/10 avec encore un individu dans les marais de la Guerche (A.L.). Les groupes les plus importants sont notés à l'automne avec par exemple 17 individus posés sur la dune de la Grande Conche le 30/08 (M.-P. & X.H.). La sous-espèce *Motacilla flava flavissima* (flavéole) est presque uniquement observée lors du passage prénuptial - par exemple 10 individus le 29/04 posés avec les moutons au Marais Salé (M.-P., A. & X.H.) - exceptés 4 individus le 27/09 à Ker Poiraud (D.R.).

BERGERONNETTE DES RUISSEAUX *Motacilla cinerea* (392/24)
L'espèce est peu notée cette année et presque uniquement lors du passage d'automne (du 16/09 au 17/11) qui concentre la très grande majorité des données. Toutes les observations ne concernent qu'un à trois individus, souvent en migration active. A noter deux observations en hiver avec 1 individu le 12/02 près de la caserne des pompiers (S.D.) et 1 individu le 18/12 à Cadouère (V.A.).

TROGLODYTE MIGNON *Troglodytes troglodytes* (2016/282)
L'espèce est commune et nicheuse sur l'île où elle semble très bien se porter. Elle y est observée toute l'année.

Photo © Olivier Penard

ACCENTEUR MOUCHET *Prunella modularis* (2154/316)
L'espèce est commune et nicheuse sur l'île. Elle y est observée toute l'année. On note une augmentation très nette du nombre d'oiseaux à l'automne.

Photo © Olivier Penard

ROUGEGORGE FAMILIER *Erithacus rubecula* (2965/528)
L'espèce est commune et nicheuse sur l'île. Elle y est observée toute l'année. Le premier jeune est noté le 30/04 au Marais Salé (M.-P. & X.H.). On note une augmentation très nette du nombre d'oiseaux à l'automne.

ROSSIGNOL PHILOMÈLE *Luscinia megarhynchos* (42/2)
Année classique pour cette espèce peu commune sur l'île avec deux observations lors du passage postnuptial : 1 individu le 01/09 à Ker Viroux (D.R.) et 1 individu le 03/09 au Chiron Moreau (V.A.). Pas d'indice de reproduction.

GORGEBLEUE À MIROIR *Luscinia svecica* (15/2)
Deux nouvelles observations de cette espèce à l'automne : 1 individu dans le bois des Sapins le 13/08 (S.R.) et 1 individu de 1ère année dans les marais de la Guerche le 25/08 (M.-P. & X.H.). L'espèce, qui reste assez rare sur l'île, doit donc très souvent passer inaperçue.

ROUGEQUEUE NOIR *Phoenicurus ochruros* (1514/241)
L'espèce est commune sur l'île où elle peut être observée presque toute l'année. Le passage prénuptial a lieu en mars et est bien marqué - par exemple 63 individus comptés en différents points de l'île le 11/03 (M.-P.H. & V.A.). Pas de preuve de reproduction certaine cette année même si l'espèce s'est très probable reproduite au moins à Port-Joinville. Le passage postnuptial est peu marqué cette année et a lieu fin octobre-début novembre. Quelques oiseaux hivernent sur l'île - 1 individu pointe de la Père le 28/12, 1 individu pointe du Château Maugarni le 29/12 et 1 mâle plage des Bossilles/de la Borgne le 30/12 (M.-P., A. & X.H.).

Photo © Olivier Penard

ROUGEQUEUE Á FRONT BLANC *Phoenicurus phoenicurus* (350/30)
L'espèce est beaucoup observée cette année aux deux passages. Le passage prénuptial a lieu du 16/03 - 1 femelle posée dans les prairies de Perdrette (F.P.) - au 29/04. Il n'est pas très marqué avec tout de même 1 mâle au Marais Salé (M.-P., A. & X.H.), 1 mâle pointe du But et une femelle dans les prairies de Perdette (F.P.) le 21/04. Le passage postnuptial, plus net, débute le 15/08 avec 1 individu à la Chèvrerie (M.-P. & X.H.) et s'achève le 25/10 avec 1 individu à la Bergerie (F.P.). Les maxima sont notés en septembre avec par exemple plus de 5 individus à Ker Bossy et 2 individus dans les prairies de Perdrette le 23/09 (M.-P. & X.H.).

TARIER DES PRÉS *Saxicola rubetra* (1104/138)
L'espèce est observée cette année aux deux passages. Le passage prénuptial s'étale du 08/04 - 2 premiers individus pointe de la Gournaise (M.-P.H.) - au 30/04 avec au maximum plus de 10 individus ensemble le 21/04 dans les marais de la Guerche (M.-P. & X.H.). Le passage postnuptial, beaucoup plus marqué, débute le 15/08 avec 1 individu dans les marais de la Guerche (M.-P. & X.H.) et s'achève en octobre - dernier oiseau le 25/10 pointe du Châtelet (F.P.). Les maxima sont notés fin août avec plus de 65 individus comptés sur l'île le 22/08 (M.-P., A. & X.H., D.R.).

TARIER PÂTRE *Saxicola torquatus* (1568/308)
L'espèce est assez commune sur l'île où elle est observée presque toute l'année. Deux indices seulement de nidification certaine cette année : 1 adulte et 2 poussins pointe de la Tranche le 25/05 et 2 poussins pointe de la Père le 04/06 (M.-P., A. & X.H.). Les maxima sont classiquement notés lors du passage postnuptial (en octobre) avec par exemple plus de 39 individus comptés le 06/10 (F.P.).

Photo © Olivier Penard

TRAQUET MOTTEUX *Oenanthe oenanthe* (3414/579)
L'espèce est commune et nicheuse en petit nombre sur l'île. Elle y est observée du mois de mars - premiers oiseaux le 09/03 en différents points de l'île (S.D.) - au mois de novembre - dernier oiseau le 04/11 plage des Bossilles/de la Borgne (M.-P., A. & X.H.). Le passage prénuptial est surtout noté en avril avec par exemple plus de 176 individus comptés sur l'île le 17/04 (M.-P., A. & X.H.). La petite population reproductrice insulaire étant la dernière de la région Pays de la Loire (Hindermeyer & Hindermeyer, 2014a), l'espèce est classée "en danger critique" dans la liste rouge des oiseaux nicheurs des Pays de la Loire (Marchadour *et al.*, 2014). Elle fait donc l'objet d'un suivi attentif en période de reproduction. Ainsi, au moins 12 couples nicheurs ont été dénombrés cette année sur la côte sauvage, même si le décompte exact n'est pas simple. Le nombre de couples nicheurs semble donc stabilisé à un niveau très bas. Cela reste toutefois à confirmer dans les années qui viennent... Le passage postnuptial est peu marqué cette année encore avec par exemple plus de 50 individus autour de la seule pointe de la Père le 16/09 (V.A.).

Photo © Olivier Penard

MERLE Á PLASTRON *Turdus torquatus* (210/30)

Le Merle à plastron est observé cette année en nombre aux deux passages. Au printemps, les observations ont toutes lieu en avril avec par exemple 18 individus en vol puis posé près de la dune de la Grande Conche le 17/04 et 9 individus dans les prairies de Perdrette le 21/04 (M.-P., A. & X.H.). Le passage postnuptial, moins marqué, a lieu en octobre - maximum 5 individus le 30/10 dans le vallon des Soux (F.L.G.) - et jusqu'à début novembre.

MERLE NOIR *Turdus merula* (2292/330)

L'espèce est très commune et nicheuse sur l'île. Elle y est observée toute l'année.

GRIVE LITORNE *Turdus pilaris* (265/39)

L'espèce est notée cette année en mars et avril puis en octobre, novembre et décembre. Le passage postnuptial est surtout perceptible fin octobre-début novembre avec par exemple 39 individus le 31/10 (O.Pe.) et 35 individus le 13/11 au dessus de la dépression de la dune de la Grande Conche (V.A.). Une donnée en début d'hiver avec 3 individus le 01/12 toujours au dessus de la dépression de la dune de la Grande Conche (V.A.).



Photo © Jean-Marc Guilpain

GRIVE MUSICIENNE *Turdus philomelos* (1994/307)
L'espèce est commune et nicheuse sur l'île. Elle y est observée presque toute l'année (un peu moins de données en hiver). Premier chanteur dès le 09/02 derrière la plage de la Tourette (M.-P.H.). Pas de passage marqué au printemps. Le passage postnuptial est surtout perceptible fin octobre-début novembre avec plus de 100 individus les 31/10 (B.I.) et 01/11 (L.Ch.) dans les marais de la Guerche.

Photo © Jean-Marc Guilpain

GRIVE MAUVIS *Turdus iliacus* (488/83)
L'espèce est notée cette année en février et mars - plus de 80 individus le 16/03 dans les marais de la Guerche (F.P.) - puis en octobre, novembre et décembre. Le passage postnuptial est bien marqué cette année avec par exemple plus de 200 individus le 31/10 dans les marais de la Guerche (B.I.) et 265 individus le 15/11 en migration active au dessus de la dune de la Grande Conche (V.A.).

Photo © Jean-Marc Guilpain

GRIVE DRAINE *Turdus viscivorus* (178/28)
L'espèce, nicheuse sur l'île en petit nombre, est principalement observée lors du passage postnuptial. Pas d'indice certain de nidification cette année. A l'automne les observations sont toutes effectuées en octobre et novembre avec par exemple 9 individus depuis la dune de la Grande Conche le 06/11 et 7 individus en migration active pointe du Porteau le 13/11 (V.A.).

BOUSCARLE DE CETTI *Cettia cetti* (2808/427)
La Bouscarle de Cetti est un des oiseaux les plus typiques de l'avifaune islaise aussi bien en milieu humide qu'en milieu plus sec. Elle peut y être observée toute l'année (moins de données en hiver toutefois).

CISTICOLE DES JONCS *Cisticola juncidis* (20/4)
L'espèce, qui n'est plus présente depuis l'hiver 1985, n'a pas encore réussi à recoloniser l'île. Après une année blanche, la Cisticole des joncs est de nouveau notée cette année : 1 individu dans les marais de la Guerche les 29/08 (M.-P. & X.H.) et 03/11 (O.Pe.) et 1 individu près du phare des Corbeaux les 30/09 (B.I.) et 30/10 (L.Ch.).

PHRAGMITE DES JONCS *Acrocephalus schoenobaenus* (86/8)
L'espèce est observée cette année uniquement lors du passage postnuptial du 21/08 au 02/10. Il s'agit à chaque fois d'un ou deux individus - par exemple 2 oiseaux dans les marais de la Guerche les 26 et 30/08 (M.-P. & X.H.). Enfin, un individu au plumage déroutant est noté le 02/10 dans la carrière (F.P.).

ROUSSEROLLE EFFARVATTE *Acrocephalus scirpaceus* (290/13)
L'espèce est observée sur l'île d'avril - deux premiers chanteurs le 17/04 dans les marais de la Croix (M.-P. & X.H.) - à octobre - dernière le 04/10 dans la dépression de la dune de la Grande Conche (F.P.). Comme tous les ans, quelques oiseaux se sont reproduits dans les marais de la Croix (au moins 4 couples). Les premiers migrateurs postnuptiaux sont notés à partir du 15/08 avec 2 individus près de la mare du But (S.R.).

HYPOLAÏS ICTÉRINE *Hippolais icterina* (14/1)**
Un seul individu de 1ère année est découvert lors du passage postnuptial le 20/09 dans la dépression de la dune de la Grande Conche (F.P.). L'Hypolaïs ictérine, même s'il reste encore peu commun, semble donc assez régulier sur l'île à l'automne. Cette donnée est en cours d'examen par le comité d'homologation vendéen (CH85).

HYPOLAÏS POLYGLOTTE *Hippolais polyglotta* (37/5)
L'espèce est observée cette année aux deux passages. Au printemps, 1 individu chanteur est noté les 22 et 23/05 dans les marais de la Guerche (F.P.). A l'automne, 1 individu est découvert le 12/08 dans la saulaie des Poupounes (G.B.) puis 2 individus le 22/08 dans la dépression de la dune de la Grande Conche (D.R.) et 1 individu le 29/08 au Marais Salé (M.-P. & X.H.).

FAUVETTE Á TÊTE NOIRE *Sylvia atricapilla* (2296/316)
L'espèce est commune et nicheuse sur l'île. Elle y est observée toute l'année (peu de données toutefois en hiver). Le nombre de couples nicheurs est très difficile à estimer mais l'île doit en accueillir sans doute plusieurs centaines. Petit passage noté en octobre avec par exemple plus de 9 individus à Ker Bossy le 07/10 (M.-P. & X.H.) et 12 individus impasse de la Borgne le 20/10 (A.L.).

FAUVETTE DES JARDINS *Sylvia borin* (320/15)
L'espèce est nicheuse assez peu commune sur l'île mais le nombre de couples semble en progression. Les deux premiers oiseaux chanteurs sont notés le 30/04 à la Galiote et près du port de plaisance (M.F., J.G. & L.Ch.). Le passage postnuptial est quasi inexistant avec seulement quelques oiseaux notés à partir d'août - premier le 16/08 dans la dépression de la dune de la Grande Conche (S.R.) - et jusqu'en octobre - dernier le 04/10, également dans la dépression de la dune de la Grande Conche (F.P.).

FAUVETTE GRISETTE *Sylvia communis* (1192/173)
L'espèce est commune et nicheuse sur l'île. Le nombre de couples nicheurs est très difficile à estimer mais semble en diminution (tendance qui reste à confirmer dans les années qui viennent). Le premier oiseau est noté le 07/04 dans la dépression de la dune de la Grande Conche (M.-P.H.). Le dernier individu, très tardif, est observé le 03/11 plage de la Tourette (O.Pe.).

FAUVETTE PITCHOU *Sylvia undata* (789/176)
L'espèce est assez commune et nicheuse sur l'île. Elle y est observée presque toute l'année (peu de données en hiver). Pas de décompte de mâles chanteurs réalisé cette année mais l'île accueille plus d'une centaine de couples nicheurs, ce qui constitue la quasi-totalité de la population vendéenne (Hindermeyer & Hindermeyer, 2014b). Ceci confirme donc la responsabilité très importante de l'île d'Yeu pour la conservation de l'espèce qui est classée "vulnérable" dans la liste rouge régionale (Marchadour *et al.*, 2014).

Photo © Olivier Penard

POUILLOT À GRANDS SOURCILS *Phylloscopus inornatus* (197/49)**
Encore une bonne année pour cette espèce sibérienne désormais très régulière à l'automne. En effet, au moins 22 individus différents sont observés du 04/10 au 04/11. Les deux premiers oiseaux sont trouvés le 04/10 dans la dépression de la dune de la Grande Conche (F.P.) et le dernier le 04/11 dans la saulaie de Saint-Sauveur (J.-M.G.). Pas plus de 4 individus différents observés sur une journée avec un maximum de 2 oiseaux ensemble.

Photo © Olivier Penard

POUILLOT DE BONELLI *Phylloscopus bonelli* (5/1)**

Nouvelle observation lors du passage postnuptial d'un individu le 13/08 dans le bois des Sapins (S.R.). L'espèce reste rare sur l'île. Cette donnée est en cours d'examen par le comité d'homologation vendéen (CH85).

Il s'agit de la 6ème mention de l'espèce sur l'île après celles du 20/09/1987 (D. Desmots), du 19/04/2006 dans les marais de la Croix (M.-P. & X. Hindermeyer), du 30/08/2007 dans les marais de la Guerche (M.-P., A. & X.

Hindermeyer), du 28/08/2010 en bordure du camping (M.-P., A. & X. Hindermeyer) et du 28/08/2015 dans la dépression de la dune de la Grande Conche (M.-P., A. & X. Hindermeyer).

POUILLOT SIFFLEUR *Phylloscopus sibilatrix* (3/1)

Une nouvelle observation de Pouillot siffleur sur l'île d'Yeu à l'automne : 1 individu est observé en migration rampante avec d'autres pouillots le 06/10 dans la dépression de la dune de la Grande Conche (F.P.). L'espèce reste très rare sur l'île.

Il s'agit seulement de la 4ème mention de l'espèce sur l'île après 1 individu le 03/09/2002 dans la pinède derrière la plage de la Petite Conche (M.-P. & X. Hindermeyer), 1 individu le 10/10/2012 dans la dépression de la dune de la Grande Conche (L. Jomat et al.*) et 1 individu le 11/09/2016 dans la dépression de la dune de la Grande Conche (M.-P., A. & X. Hindermeyer).*

POUILLOT VÉLOCE *Phylloscopus collybita* (3577/590)

L'espèce est commune et nicheuse sur l'île. Elle y est observée toute l'année (moins de données en hiver). Pas de net passage au printemps. Le passage postnuptial est noté dès le mois d'août - par exemple plus de 50 individus dans la seule saulaie des Poupounes le 12/08 (G.B.) - mais surtout en octobre avec par exemple plus de 180 individus comptés le 26/10 en différents points de l'île (F.P., V.A., M.-P., A. & X.H.).

Photo © Olivier Penard

POUILLOT FITIS *Phylloscopus trochilus* (1303/191)

L'espèce est classiquement observée aux deux passages. Le passage prénuptial débute le 10/03 avec 2 individus dans les marais de la Guerche (M.-P.H.) et s'achève fin avril. Le passage postnuptial, plus marqué, débute le 07/08 avec 1 individu à la pointe du But (D.R.) et se poursuit jusqu'au 01/11 avec encore 1 individu plage du Marais Salé (F.P. & J.-M.G.). Les maxima sont notés fin août avec par exemple plus de 30 individus le 26/08 dans les seuls marais de la Guerche (M.-P. & X.H.).

ROITELET HUPPÉ *Regulus regulus* (375/18)

L'espèce est observée uniquement lors du passage postnuptial cette année du 30/09 au 17/11 avec un dernier oiseau dans les marais de la Croix (F.P.). Le passage est faible avec 1 à 3 individus ensemble au maximum - exceptés 5 individus le 30/09 près du phare des Corbeaux (B.I.). Aucun indice de reproduction n'est rapporté cette année.

ROITELET Á TRIPLE BANDEAU *Regulus ignicapilla* (2055/362)
L'espèce est commune et nicheuse sur l'île. Elle y est observée toute l'année (moins de données en hiver). Les premiers jeunes sont notés le 04/06 à Ker Chiron (M.-P. & X.H.). Pas de passage très net, ni au printemps, ni à l'automne.

Photo © Olivier Penard

GOBEMOUCHE GRIS *Muscicapa striata* (386/44)
L'espèce est observée cette année aux deux passages. Le passage prénuptial est très peu marqué avec seulement quelques oiseaux en mai - 1 individu au Moulin du calvaire et 1 individu dans les prairies de Perdrette le 14/05 (M.-P., A. & X.H.). Le passage postnuptial, beaucoup plus net, s'étale du 15/08 au 18/10 avec 1 individu tardif dans le vallon des Broches (A.L.). Il s'agit le plus souvent d'un à quatre oiseaux exceptés 10 individus autour de la décharge le 22/08, 8 individus à Ker Bossy le 25/08 et 7 individus au Marais Salé le 29/08 (M.-P. & X.H.). Plus de preuve de reproduction sur l'île.

GOBEMOUCHE NOIR *Ficedula hypoleuca* (489/34)
L'espèce est observée cette année aux deux passages. Une seule donnée lors du passage prénuptial avec 1 mâle le 08/04 dans un jardin de la plage de Ker Châlon (J.D.L.). Le passage postnuptial s'étale du 16/08 au 03/10. Il s'agit le plus souvent de 1 à 4 individus - maximum 10 individus ensemble dans les prairies de Perdrette le 23/08 (M.-P., A. & X.H.).

MÉSANGE Á LONGUE QUEUE *Aegithalos caudatus* (1051/152)
L'espèce est commune et nicheuse sur l'île. Elle y est observée toute l'année. La première famille est notée seulement le 04/06 dans les marais de la Croix (M.-P. & X.H.). Quelques oiseaux en migration active sont observés à l'automne - par exemple 13 individus depuis la pointe du But le 04/11 (M.-P. & X.H.).

MÉSANGE NOIRE *Periparus ater* (122/10)
Un petit passage est noté à l'automne du 23/10 - avec 1 individu dans les marais de la Guerche (F.P.) - au 14/11 avec 2 individus dans les marais de la Croix (V.A.). Ce passage ne concerne que quelques individus - maximum 3 oiseaux ensemble dans le camping le 25/10 (M.-P. & X.H.).

Photo © Jean-Marc Guilpain

Photo © Olivier Penard

MÉSANGE BLEUE *Cyanistes caeruleus* (1692/194)
L'espèce est commune et nicheuse sur l'île. Elle y est observée toute l'année. La première famille est notée le 27/05 au Marais Salé (M.-P., A. & X.H.).

MÉSANGE CHARBONNIÈRE *Parus major* (1607/218)
L'espèce est commune et nicheuse sur l'île. Elle y est observée toute l'année. La première famille est notée le 14/05 au Marais Salé (M.-P., A. & X.H.).

SITTELLE TORCHEPOT *Sitta europaea* (2/1)
Enfin une nouvelle mention certaine de l'espèce sur l'île avec 1 individu posé derrière la plage du Marais Salé le 16/03 (D.Du. *fide* V.A.). L'oiseau ne sera pas retrouvé le lendemain. La Sittelle torchepot n'avait pas été vue sur l'île de puis près de 24 ans!

Il s'agit seulement de la 3ème mention certaine de l'espèce sur l'île après celle d'un individu les 12 et 13/09/1987 au camping (C. Vallin) et d'un individu le 09/081993 dans les pinèdes de la côte nord (A. Larousse). La donnée d'un individu le 18/05/1990 (G.O.V.) est douteuse et n'a pas été retenue.

RÉMIZ PENDULINE *Remiz pendulinus* (14/1)
Une seule observation cet automne pour cette espèce qui reste assez rare sur l'île : 1 individu le 04/10 en migration active en 1h30 au dessus de la dépression de la dune de la Grande Conche (F.P.).

LORIOT D'EUROPE *Oriolus oriolus* (67/8)
L'espèce est observée uniquement lors du passage prénuptial en avril. Quelques oiseaux sont notés en migration active depuis la dune de la Grande Conche : 3 individus (2 mâles et 1 femelle) le 22/04 et 2 mâles en 1 heure le 29/04 (M.-P. & X.H.). Les autres oiseaux sont observés les 23, 29 et 30/04 dans les marais de la Guerche (M.-P. & X.H., L.Ch.). Beau rassemblement le 23/04 avec 13 individus posés ensemble dans les marais de la Guerche (M.-P.H.). Aucun indice de nidification.

PIE-GRIÈCHE ÉCORCHEUR *Lanius collurio* (55/2)
La Pie-grièche écorcheur, qui ne niche plus sur l'île, n'est observée cette année que lors du passage postnuptial : 1 individu de 1ère année le 05/09 près de la carrière (V.A.) et 1 individu également de 1ère année le 07/10 dans la dépression de la dune de la Grande Conche (M.-P. & X.H.).

PIE-GRIÈCHE À TÊTE ROUSSE *Lanius senator* (31/9)**
La Pie-grièche à tête rousse est observée cette année aux deux passages. Au printemps, une femelle est trouvée le 11/04 à la pointe du But (J.D.L.). A l'automne, 1 individu de 1ère année est noté le 19/08 dans les prairies de Perdrette puis un autre, également de 1ère année, tous les jours du 23 au 28/08 au Marais Salé (M.-P., A. & X.H.).
La sous-espèce *Lanius senator badius* est observée pour la première fois sur l'île lors du passage postnuptial avec 1 individu de 1ère année le dans les prairies de Perdrette le 21/08 (M.-P. & X.H., D.R., VA.). Ces données sont en cours d'examen par le comité d'homologation vendéen (CH85).

Photo © Marie-Paule Hindermeyer

PIE BAVARDE *Pica pica* (1543/127)
L'espèce, nicheuse sur l'île, y est observée toute l'année. Le nombre maximum d'individus observé ensemble est seulement de 9 le 02/11 à la Bergerie (J.M.G.). Le nombre de couples nicheurs, en nette diminution depuis quatre ans, semble désormais stabilisé mais avec un effectif très faible, sans doute entre 5 et 7 couples actuellement. Affaire à suivre dans les années qui viennent…

CRAVE À BEC ROUGE *Pyrrhocorax pyrrhocorax* (50/9)**
L'individu de 2ème année découvert le 25/08/2016 dans les prairies de Ker Bossy (M.-P., A. & X.H.), et revu ensuite vu régulièrement jusqu'à la fin du mois de décembre, a poursuivi son séjour sur l'île (d'abord sur la côte sauvage puis à la Bergerie) jusqu'au 16/03, date de sa dernière observation à la Bergerie (F.P.). Ces données sont en cours d'examen par le comité d'homologation vendéen (CH85).

Photo © Frédéric Portier

CORNEILLE NOIRE *Corvus corone* (2044/235)
L'espèce est commune et nicheuse sur l'île. Elle y est observée toute l'année. Le plus gros groupe est observé à la Bergerie avec plus de 34 individus le 16/03 (F.P.).

ÉTOURNEAU SANSONNET *Sturnus vulgaris* (1887/232)
L'espèce est assez commune et nicheuse sur l'île. Elle y est observée toute l'année. Les plus gros groupes sont observés à l'automne avec par exemple plus de 250 individus le 11/11 à Ker Châlon (M.-P.H.).

ÉTOURNEAU ROSELIN *Pastor roseus* (71/4)**
L'Étourneau roselin est observé sur l'île à l'automne où il est désormais annuel. Un individu de 1ère année est noté le 08/10 impasse de la Borgne puis plage des Bossilles/de la Borgne (M.-P. & X.H.). Il sera revu le 12/10, toujours plage des Bossilles/de la Borgne (D.R.). Un autre individu, également de 1ère année, est découvert le 01/11 à Ker Gigou (F.P.). Ces données sont en cours d'examen par le comité d'homologation vendéen (CH85).

MOINEAU DOMESTIQUE *Passer domesticus* (1497/148)
L'espèce est très commune et nicheuse sur l'île. Aucune observation particulière cette année.

PINSON DES ARBRES *Fringilla coelebs* (2261/391)
L'espèce est très commune et nicheuse sur l'île. Elle y est observée toute l'année y compris en hiver. Le passage d'automne, assez marqué, est surtout perceptible en octobre et novembre avec par exemple 410 individus en migration active en 25 minutes le 26/10 au dessus de la dépression de la dune de la Grande Conche (F.P.), 400 individus posés à la Bergerie le 29/10 (B.I.) et plus de 566 individus en migration active au dessus de la dune de la Grande Conche et de la pointe des Corbeaux le 03/11 (M.-P. & X.H.).

PINSON DU NORD *Fringilla montifringilla* (179/73)
L'espèce est beaucoup observée cette année mais uniquement lors du passage postnuptial du 18/10 - au moins 2 individus à Ker Pierre Borny (D.R.) - au 18/11. Il s'agit pour la plupart d'oiseaux en migration active - 14 individus en 25 minutes le 26/10 au dessus de la dépression de la dune de la Grande Conche (F.P.) - mais également de quelques oiseaux posés - par exemple 1 mâle à Ker Viroux le 27/10 et un autre plage des Bossilles/de la Borgne le 03/11 (M.-P. & X.H.) mais aussi 5 individus chemin de la Messe le 01/11 (O.Pe.). Les maxima sont notés les 03/11 avec plus de 20 individus en migration active au dessus de la dune de la Grande Conche et 14/11 avec 25 individus au dessus des marais de la Croix (V.A.). Quelques oiseaux sont présents en début d'hiver : 1 individu près des Roses (V.A.) et 3 individus à la Bergerie (M.-P. & X.H.) le 03/12.

SERIN CINI *Serinus serinus* (681/142)
L'espèce est commune et nicheuse sur l'île où elle est observée toute l'année. On note une arrivée importante d'oiseaux en février avec plus de 25 individus près du camping le 21/02 (M.-P. & X.H.). A l'automne un petit passage est noté avec par exemple 30 individus le 23/10 plage de la Tourette et 2 individus en migration active en 1h05 le 25/10 au dessus de la dune de la Grande Conche (F.P.).

VERDIER D'EUROPE *Carduelis chloris* (1338/211)
L'espèce est assez commune et nicheuse sur l'île. Elle y est observée presque toute l'année (moins de données toutefois en hiver). Les maxima sont classiquement notés à l'automne avec par exemple plus de 350 individus à la Bergerie le 01/10 (F.P.).

CHARDONNERET ÉLÉGANT *Carduelis carduelis* (1674/278)
L'espèce est commune et nicheuse sur l'île. Elle y est observée presque toute l'année (moins de données toutefois en hiver). Quelques rassemblements postnuptiaux avec plus de 30 individus à Ker Bossy les 24 et 31/08 (M.-P. & X.H.). Le passage d'automne est noté cette année en octobre et novembre avec par exemple plus de 66 individus le 03/11 au dessus de la pointe des Corbeaux (M.-P. & X.H.) et 70 individus le 15/11 au dessus de la dune de la Grande Conche (V.A.).

TARIN DES AULNES *Carduelis spinus* (297/116)
Beaucoup d'observations de Tarin des aulnes cette année. Une donnée seulement au printemps avec 1 individu dans les marais de la Croix le 21/04 (F.P.). Toutes les autres observations ont lieu lors du passage postnuptial entre le 30/09 - une vingtaine d'individus en migration active au dessus de la pointe des Corbeaux (B.I.) - et le 17/11. Le passage concerne surtout des oiseaux en migration active mais aussi quelques oiseaux posés - 14 individus le 02/11 plage de la Tourette (O.Pe.). Les maxima sont notés fin octobre-début novembre avec plus de 50 individus en migration active le 25/10 au dessus du terrain d'aéromodélisme (D.R.) et le 30/10 au dessus de la dépression de la dune de la Grande Conche (F.L.G.) puis plus de 96 individus en migration active entre la dune de la Grande Conche et la pointe des Corbeaux le 03/11 (M.-P. & X.H.).

LINOTTE MÉLODIEUSE *Carduelis cannabina* (1730/271)
L'espèce est commune et nicheuse sur l'île. Elle y est observée de mars à novembre. Après des regroupements importants en avril - par exemple 150 individus le 09/04 sur la dune de la pointe de la Grande Conche (J.D.L.) et plus de 200 individus sur la dune de la pointe de la Gournaise le 15/04 (M.-P., A. & X.H.) - les nicheurs se répartissent sur la côte sauvage. L'espèce est à surveiller puisqu'elle est classée comme vulnérable dans la dernière liste rouge des espèces menacées en France (UICN France, MNHN, LPO, SEOF & ONCFS, 2011) et dans la liste rouge des oiseaux nicheurs des Pays de

la Loire (Marchadour *et al.*, 2014). A l'automne le passage, peu marqué, est surtout noté en octobre avec par exemple plus de 119 individus en migration active en 1h30 au dessus du phare des Corbeaux le 04/10 et 75 individus en 25 minutes au dessus de la dépression de la dune de la Grande Conche le 26/10 (F.P.).

BEC-CROISÉ DES SAPINS *Loxia curvirostra* (48/2)
Deux données seulement cet automne pour cette espèce qui n'est pas notée tous les ans sur l'île : 2 individus (les mêmes ?) le 30/09 en migration active au dessus de la plage de la Grande Conche (B.I.) et chemin de la Roche à Robion (F.P.).

ROSELIN GITHAGINE *Bucanetes githagineus* (1/2)*
L'une des belles surprises de l'année! Un probable mâle de 1ère année est découvert posé puis en vol le 25/05 vers 9h00 sur le chemin côtier en arrivant sur la pointe de la Tranche (M.-P. & X.H.). Il sera retrouvé le soir presque au même endroit et bien observé (M.-P.H. & V.A.). L'oiseau ne sera pas retrouvé les jours suivants. Il s'agit de la seconde mention de l'espèce sur l'île (9 ans après la première) et de la troisième mention vendéenne. Cette donnée a été homologuée par le comité d'homologation national (S. Reeber, comm. pers.).

Il s'agit seulement de la 2ème mention de l'espèce sur l'île après celle d'un mâle de 1ère année le 02/05/2008 sur la dune de la Grande Conche (C. Lanzani, M.-P. & X. Hindermeyer).

Photo © Marie-Paule Hindermeyer

BOUVREUIL PIVOINE *Pyrrhula pyrrhula* (1207/268)
Devenue très rare dans le reste du département, l'espèce est encore bien présente et nicheuse sur l'île. Elle peut y être observée toute l'année. La grande discrétion des oiseaux en période de reproduction empêche tout décompte précis des couples nicheurs et toute indication fiable d'une tendance démographique. Un suivi précis de l'espèce serait à mettre en place puisqu'elle est désormais classée comme vulnérable dans la dernière liste rouge des espèces menacées en France (UICN France, MNHN, LPO, SEOF & ONCFS, 2011) et en danger de disparition dans la liste rouge des oiseaux nicheurs des Pays de la Loire (Marchadour *et al.*, 2014). A l'automne, les observations concernent

également des migrateurs comme ces 3 individus en migration active au dessus de la dépression de la dune de la Grande Conche le 26/10 (F.P.).

GROSBEC CASSE-NOYAUX *Coccothraustes coccothraustes* (15/52)
Année tout à fait exceptionnelle pour cette espèce (comme sur le reste du territoire national) qui était jusque là assez rare sur l'île. Un premier oiseau est observé dès le 06/09 au centre équestre des Violettes (V.A.). Ensuite les nombreuses observations (une cinquantaine) s'étalent du 08/10 au 03/12. Il s'agit aussi bien d'oiseaux en migration active que d'oiseaux qui stationnent plusieurs jours sur l'île. Les maxima sont notés près du camping et dans les marais de la Guerche avec au moins 10 individus les 16/10 (A.L.), 27/10 (M.-P. & X.H.) et 31/10 (B.I.).

Photo © Frédéric Portier

BRUANT DES NEIGES *Plectrophenax nivalis* (70/12)
Une femelle est découverte posée pointe du But le 27/10 (M.-P., A. & X.H.). Elle y sera revue jusqu'au 31/10 (M.-P. & X.H., V.A., J.-M.G., B.I., L.Ch, O.Pe., M.F.).

Photo © Olivier Penard

Photo © Marie-Paule Hindermeyer

BRUANT JAUNE *Emberiza citrinella* (16/1)
Une nouvelle observation au printemps pour ce bruant, toujours rare sur l'île, avec 1 individu précoce noté 16/03 en migration active au dessus de la dune de la Grande Conche (F.P.).

BRUANT ORTOLAN *Emberiza hortulana* (70/4)**
Le Bruant ortolan est observé cette année en très faible nombre aux deux passages. Au printemps, 1 mâle adulte est observé posé près de la carrière le 29/04 (M.-P. & X.H.) et un autre les 30/04 et 01/05 posé à la Galiote (M.F., L.Ch., B.I. & J.G.). Le passage postnuptial est presque inexistant avec seulement 1 individu de 1ère année posé le 22/08 dans les prairies de Ker Bossy (M.-P. & X.H.). Ces données sont en cours d'examen par le comité d'homologation vendéen (CH85).

BRUANT DES ROSEAUX *Emberiza schoeniclus* (290/19)
L'espèce est observée cette année aux deux passages en petit nombre. Le passage prénuptial a lieu classiquement en mars avec par exemple 3 individus le 11/03 dans la dépression de la dune de la Grande Conche (M.-P.H.) et le 16/03 dans les marais de la Guerche (F.P.). À noter un oiseau tardif le 29/04 dans les marais de la Guerche (L.Ch.). Le passage postnuptial a lieu en octobre et novembre - premier individu le 04/10 en migration active au dessus de la dune de la Grande Conche (F.P.) et deux derniers oiseaux le 03/11 à Ker Viroux (M.-P. & X.H.). Il s'agit à chaque fois d'un à trois individus sauf le 26/10 avec 4 individus en migration active en 1h25 au dessus de la dune de la Grande Conche (F.P.). Aucune donnée en hiver.

DROITS ET CITATIONS

Les données présentées restent la propriété entière de leurs observateurs. Elles doivent être citées comme telles dans la littérature : **Roselin githagine** - 1 individu le 25 mai 2017 pointe de la Tranche, L'Île d'Yeu - 85 (M.-P. & X. Hindermeyer, V. Auriaux, *in* Hindermeyer & Hindermeyer, 2017).

TRANSMISSION DES DONNÉES

Depuis 1990, nous avons entrepris de rassembler toutes les observations ornithologiques effectuées sur l'île d'Yeu depuis le début du siècle. L'ensemble de ces données a été transféré dans une base de données "YEU" réalisée sous MS Access. Afin de ne perdre aucune observation effectuée sur l'île ou dans ses eaux, nous remercions chaque observateur de bien vouloir nous transmettre ses observations après un séjour sur l'île. Depuis le début de l'année 2009, la LPO Vendée met à disposition une base de données en ligne sur laquelle il est possible de saisir toutes les observations faites en Vendée (http://www.faune-vendee.org). Une simple extraction permet ensuite de nous transmettre celles-ci sans les saisir une nouvelle fois mais nous acceptons aussi les données sous n'importe quelle autre forme.

DIFFUSION

La synthèse est envoyée à tous les observateurs de l'année en cours (sauf adresse inconnue) ainsi qu'à des ornithologues connus pour fréquenter l'île régulièrement. Elle est également adressée à la mairie de l'île d'Yeu.
Elle est disponible sur le site faune-vendée de la LPO Vendée (http://www.faune-vendee.org). Toutes les données sont intégrées à notre base de données "YEU".

BIBLIOGRAPHIE

BUGEON C., 2013. *Mémento des oiseaux observés à l'île d'Yeu de 1907 à fin 2012 (inventaire actualisé en 2013)*. Les dossiers du patrimoine. Editions Les Sévenelles, 120 p.

HINDERMEYER X. & HINDERMEYER M.-P., 2014a. Le Traquet mottteux. *In* Marchadour B. (coord.). *Oiseaux nicheurs des Pays de la Loire*. Coordination régionale LPO Pays de la Loire, Delachaux et Niestlé, Paris, 2014 : p. 366-367.

HINDERMEYER X. & HINDERMEYER M.-P., 2014b. La Fauvette pitchou. *In* Marchadour B. (coord.). *Oiseaux nicheurs des Pays de la Loire*. Coordination régionale LPO Pays de la Loire, Delachaux et Niestlé, Paris, 2014 : p. 408-411.

MAGAUD D'AUBUSSON L., 1909 - Excusions ornithologiques aux îles d'Yeu et d'Oléron. *Le Naturaliste*, 31, 2e série : 101-103, 115-117.

MARCHADOUR B., BEAUDOIN J.-C., BESLOT E., BOILEAU N., MONTFORT D., RAITIÈRE W., TAVENON D. & YÉSOU P., 2014. *Liste rouge des oiseaux nicheurs des Pays de la Loire*. Coordination régionale LPO Pays de la Loire, Bouchemaine, 24 p.

UICN France, MNHN, LPO, SEOF & ONCFS, 2011. *La liste rouge des espèces menacées en France - Chapitre Oiseaux de France métropolitaine.* Paris, France, 28 p.