

SYNTHÈSE ORNITHOLOGIQUE ÎLE D'YEU



Volume 13
Année 2019

Rédaction :
Marie-Paule HINDERMEYER
Xavier HINDERMEYER
Collaboration :
Frédéric PORTIER, Valérie AURIAUX
& Jean-Marc GUILPAIN

Photo de couverture : Paruline à gorge orangée © *Bertrand ISAAC*

Référence bibliographique du document :

HINDERMEYER M.-P. & HINDERMEYER X., 2020 - *Synthèse ornithologique - Ile d'Yeu*.
Vol. 13, Année 2019, 73 p.

SYNTHÈSE DES OBSERVATIONS ORNITHOLOGIQUES FAITES SUR L'ÎLE D'YEU AU COURS DE L'ANNÉE 2019

AVRIL 2020

RÉDACTION

Marie-Paule & Xavier HINDERMEYER

Mél : xavier.hindermeyer@gmail.com

COLLABORATION

Frédéric PORTIER, Valérie AURIAUX & Jean-Marc GUILPAIN

LISTE DES OBSERVATEURS

Véronique AUJARD (V.Au.), Valérie AURIAUX (V.A.), Sébastien BATARD (S.Ba.), Jean-Michel BERSON (J.-M.B.), Dominique BIELLMANN (D.Bi.), Nicolas BIRON (N.B.), Claude BUGEON (C.Bu.), Luc CHAILLOT (L.Ch.), Anthony CHAILLOU (A.Ch.), Mireille CHAILLOU (M.Ch.), Raymond CHAILLOU (R.Ch.), Justin CHAMBRELIN (J.Ch.), Simon CLAUDE (S.C.), Christophe COÏC (C.C.), Camille CONDETTE (C.Co.), Léa DAURES (L.D.), Philippe DELLA VALLE (P.D.V.), Laurène DEMANGE (L.De.), Sandrine DESMAREST (S.D.), Didier DESMOTS (D.D.), Marie DOUARRE (M.Do.), Paul DUFOUR (P.D.), Perrine DULAC (P.Du.), Valérie DULAC (V.Du.), Fabrice DUSERRE (F.D.), Célia EL HASSANI (C.E.H.), Matthieu FAVEYRIAL (M.F.), Sandra FLEURY (S.Fl.), Johan GARDON (J.G.), Quentin GIQUET (Q.G.), Aurélie GIROD (A.Gi.), Rémi GIROD (R.Gi.), Jean-Marc GUILPAIN (J.-M.G.), François HALLIGON (F.H.), Alix HINDERMEYER (A.H.), Marie-Paule HINDERMEYER (M.-P.H.), Xavier HINDERMEYER (X.H.), Bertrand ISAAC (B.I.), Frédérique JACQUEMONT (F.J.), Emmanuel JAVOUREZ (E.Ja.), Sylvie KOLP (S.K.), Franck LATRAUBE (F.L.), Christine LAVERGNE (C.La.), Anthony LE GUEN (A.L.G.), Jérôme de LINARES (J.D.L.), Albin LOUSSOUARN (A.Lo.), Anthony LUCAS (A.Lu.), Denis MATTHEY (D.M.), Marc MERLET (M.Me.), Franck METAIS (F.Me.), Olivier PASQUET (O.Pa.), Olivier PENARD (O.Pe.), James PELLOQUIN (J.P.), Gilles PEREZ (G.P.), Frédéric PORTIER (F.P.), Blaise RAYMOND (B.R.), Jean-Guy ROBIN (J.-G.R.), André ROBERT (A.R.), Alain ROCHETTE (A.Ro.), Eric ROIRAND (E.Ro.), Martin ROMET (M.R.), Catherine ROUSSEAU (C.R.), Corinne SIBLET (C.R.), Jean-Philippe SIBLET (J.-P.S.), Frédéric SIGNORET (F.Si.), Didier SIMON (D.S.), Laurent SPANNEUT (L.S.), Frantz STORCK (F.St.), Julien SUDRAUD (J.S.), Alain TROFFIGUÉ (A.T.), Anthony TURBÉ (A.Tu.), François VARENNE (F.V.) & Théophile YOU (T.Y.).

REMERCIEMENTS

Un grand merci, tout d'abord, à Frédéric PORTIER qui assure le suivi ornithologique de l'île avec nous depuis plus de seize ans et qui a fait une relecture critique de cette synthèse.

Nous tenons également, comme chaque année, à remercier Claude BUGEON pour les observations inédites et les précieuses informations qu'il nous a communiquées, la famille SAGE, Fernand VOISIN, Aurélie et Rémi GIROD qui nous ont autorisés à observer sur les terrains qu'ils exploitent et avec qui nous avons eu, comme toujours, des échanges très fructueux. Un grand merci aussi à Valérie AURIAUX, Jean-Marc GUILPAIN, Sandrine DESMAREST, Alain MOUSNIER et Didier SIMON, observateurs locaux particulièrement actifs et qui relaient souvent des observations réalisées par d'autres islais.

Toute notre gratitude va ensuite aux observateurs qui se sont succédés sur l'île au cours de l'année 2019 et qui nous ont transmis leurs données, en particulier Sébastien BATARD, Nicolas BIRON, Luc CHAILLOT, Anthony CHAILLOU, Justin CHAMBRELIN, Simon CLAUDE, Léa DAURES, Philippe DELLA VALLE, Didier DESMOTS, Marie DOUARRE, Paul DUFOUR, Fabrice DUSERRE, Matthieu FAVEYRIAL, Johan GARDON, Quentin GIQUEL, François HALLIGON, Bertrand ISAAC, Franck LATRAUBE, Christine LAVERGNE, Anthony LE GUEN, Jérôme de LINARES, Albin LOUSSOUARN, Anthony LUCAS, Denis MATTHEY, Franck METAIS, Olivier PASQUET, James PELLOQUIN, Olivier PENARD, Gilles PEREZ, Blaise RAYMOND, Jean-Guy ROBIN, André ROBERT, Eric ROIRAND, Martin ROMET Catherine ROUSSEAU, Jean-Philippe SIBLET, Frédéric SIGNORET, Frantz STORCK, Julien SUDRAUD, François VARENNE & Théophile YOU.

Un très grand merci à ceux qui nous ont permis d'illustrer cette synthèse grâce à leurs photographies mises gracieusement à notre disposition : Valérie & Iris AURIAUX, Jean-Marc GUILPAIN, François HALLIGON, Bertrand ISAAC, Christine LAVERGNE, Jérôme de LINARES, Olivier PENARD, Frédéric PORTIER, Jean-Philippe SIBLET & Didier SIMON.

Cette synthèse est la treizième édition. Toutes vos remarques/observations pour l'améliorer dans les années qui viennent restent les bienvenues.

LES FAITS MARQUANTS DE L'ANNEE 2019


Une **année ornithologique exceptionnelle** pour l'île d'Yeu avec notamment une première française (une Paruline en plus !). L'île constitue de plus en plus une destination ornithologique incontournable, notamment au printemps et à l'automne (Hindermeyer *et al.*, 2017).

Le nombre de données collectées en 2019 (17 176) est stable (-0,3%) par rapport à 2018 et il s'agit tout de même du troisième chiffre le plus élevé depuis le début du suivi. En revanche, le nombre d'espèces observées (197) est en nette augmentation (+6,5%) par rapport à 2018 (cf. Fig. 1).

L'essentiel de ces données a été saisi sur la base de données en ligne mise à disposition par la LPO Vendée depuis 2009 (www.faune-vendee.org) mais quelques données nous ont encore été transmises directement.

Le nombre total de données figurant dans notre base au 31 décembre 2019 était de 191 769.

Fig. 1 : Nombre annuel d'espèces et de données




Le nombre d'observateurs est en nette augmentation (+19,7%) avec un chiffre de 73 (en réalité beaucoup plus si nous comptons tous les membres des groupes qui ont fréquenté l'île), signe que l'île d'Yeu attire de plus en plus d'ornithologues mais aussi que les islais s'intéressent de plus en plus aux oiseaux.

Le nombre de jours d'observation est en légère diminution cette année avec un chiffre de 286 (-4,3% par rapport à 2018). C'est un chiffre tout de même important puisqu'il signifie que pendant plus de 78% des jours de l'année une personne a observé sur l'île d'Yeu et a transmis ses données.

Les observations sont toujours assez bien réparties sur l'année. Ainsi, elles sont faites tous les mois de l'année. Pour la première fois depuis le début du suivi c'est le mois d'avril qui est le mois le plus riche en données (3 265). Il est suivi des mois d'octobre (2 984), septembre (2 558) et mai (1 879) qui en fournissent également un nombre important. Viennent ensuite les mois d'août (1 370), de janvier (1

241) et de février (948). La répartition sur l'année de ces jours d'observation ainsi que le nombre de données collectées associées sont illustrés ci-dessous (cf. Fig. 2).

Fig. 2 - Importance et répartition journalière des données en 2019



Les nouvelles espèces

L'année 2019 est, encore une fois, marquée par l'observation de quatre nouvelles espèces. La liste islaie (qui devrait être achevée dans les prochaines semaines) compte désormais 326 espèces. Il sera maintenant de plus en plus difficile d'observer de nouvelles espèces sur l'île.

Il s'agit, tout d'abord, de deux groupes d'Oie à bec court (*Anser brachyrhynchus*) fin avril-début mai sur la côte sauvage et près de la Bergerie puis d'une Sterne élégante (*Sterna elegans*) posée pointe des Corbeaux le 22/06.

De plus, une nouvelle sous-espèce de Bergeronnette printanière, la Bergeronnette d'Italie (*Motacilla flava cinereocapilla*), est observée pour la première fois en avril et mai.

C'est, ensuite, les observations, à l'automne, d'une Paruline à gorge orangée (*Setophaga fusca*) le 02/10 près du phare des Corbeaux (première vendéenne et française !) puis d'un Pouillot verdâtre (*Phylloscopus trochiloides*) le 08/10 près du camping.

A noter, enfin, cette année l'observation d'un Bernache nonnette sans doute d'origine férale (*Branta leucopsis f. domestica*) dans la carrière en juillet.

Les autres observations marquantes

Parmi les espèces et sous-espèces très rares sur l'île, on note cette année :

- une donnée de Busard pâle (*Circus macrourus*), en octobre (2^{ème} mention pour l'île) ;
- deux données de Gobemouche nain (*Ficedula parva*), en octobre (2 et 3^{ème} mentions pour l'île) ;
- une donnée de Faucon d'Eléonore (*Falco eleonora*), en septembre (3^{ème} mention pour l'île) ;
- une donnée de Fuligule milouin (*Aythya ferina*), en janvier (4^{ème} mention pour l'île) ;
- deux données de Petit Gravelot (*Charadrius dubius*), en mai (4 et 5^{ème} mentions pour l'île) ;
- une donnée d'Autour des palombes (*Accipiter gentilis*), en octobre (5^{ème} mention pour l'île) ;
- une donnée de Roselin cramoisi (*Carpodacus erythrinus*), en septembre (5^{ème} mention pour l'île) ;
- quatre données de Cigogne blanche (*Ciconia ciconia*), en août (5 à 8^{ème} mentions pour l'île) ;

- une donnée de Grue cendrée (*Grus grus*), en octobre (6^{ème} mention pour l'île) ;
- une donnée d'Aigle botté (*Aquila pennata*), en septembre (7^{ème} mention pour l'île) ;
- trois données de Bergeronnette printanière nordique (*Motacilla flava thunbergi*), en mai, juin et octobre (7 à 9^{ème} mentions pour l'île) ;
- deux données de Bruant proyer (*Emberiza calandra*), en avril (8 et 9^{ème} mentions pour l'île) ;
- quatre données de Guêpier d'Europe (*Merops apiaster*), en avril et mai (9 à 12^{ème} mentions pour l'île) ;
- une donnée de Milan royal (*Milvus milvus*), en septembre (10^{ème} mention pour l'île) ;
- six données de Balbuzard pêcheur (*Pandion haliaetus*), en avril, mai, août, septembre et octobre (10 à 15^{ème} mentions pour l'île).

LISTE SYSTÉMATIQUE

Dans la liste ci-dessous, chaque nom d'espèce est suivi de deux chiffres entre parenthèses. Le premier chiffre représente, pour l'espèce considérée, le nombre de données islaïses enregistrées dans la base de données jusqu'au 31 décembre 2019 (statistique obtenue sur un total de 191 769 données). Le deuxième chiffre représente le nombre de données du 1^{er} janvier au 31 décembre 2019, soit 17 176 au total.

Les espèces **en rouge** suivies d'un astérisque (*) sont soumises à homologation nationale et celles **en bleu** suivies de deux astérisques (**) sont soumises à homologation départementale.

OIE À BEC COURT *Anser brachyrhynchus* (0/8)*

Belle surprise avec la découverte de deux groupes d'Oie à bec court au printemps : un premier groupe de 4 individus près de la carrière (M.-P.H., V.A. & J.-M.G., B.I., C.R., L.Ch. *et al.*) et un second groupe de 3 individus près de la Bergerie (L.Ch., B.I., C.R. *et al.*, M.-P.H., V.A. & J.-M.G.) le 27/04. Le premier groupe sera revu pointe du Châtelet (M.-P.H. & J.-M.G.) et les deux groupes, presque au complet (6 oiseaux sur 7), près de la carrière (D.S.) le 28/04. Enfin, 1 individu du second groupe restera dans les prairies de la Bergerie jusqu'au 01/05 (J.-M.G. & X.H.). Il s'agit de la première mention de cette espèce sur l'île. Ces données sont en cours d'examen par le comité d'homologation national (CHN).





Photos © Jean-Marc Guilpain

OIE CENDRÉE *Anser anser* (62/10)

L'Oie cendrée est observée cette année en février, mars et avril puis en octobre et novembre. Il s'agit souvent d'oiseaux en migration active qui passent au dessus de l'île - par exemple 1 individu en vol au-dessus du phare des Corbeaux le 16/02 (M.-P. & X.H.) et 38 individus au-dessus de la dune de la Grande Conche le 30/10 (M.-P. & X.H.). Enfin, un individu a séjourné au Marais Salé du 30/03 au 16/04 au moins (M.-P. & X.H., F.P., V.A. & J.-M.G.). Il s'agit d'un oiseau sauvage qui a été récupéré blessé cet hiver, a séjourné rue Saint-Amand, et qui a repris sa liberté.

BERNACHE NONNETTE FÉRALE *Branta leucopsis f. domestica* (0/2)

Un individu volant et non bague est observé posé dans la carrière les 26 et 27/07 (M.-P. & X.H.). Quelle est la provenance de cet oiseau arrivé et reparti de l'île par ses propres moyens ? Il est probable qu'il s'agisse d'un individu d'origine férale.

BERNACHE CRAVANT *Branta bernicla* (127/10)

La sous-espèce type *Branta bernicla bernicla*, régulière sur l'île en petit nombre, est observée cette année presque uniquement en hiver avec par exemple 3 individus sur les plages de la côte nord le 01/01 (N.B., M.-P. & X.H.), 4 individus sur la côte sauvage entre la Croix et les Tchinettes le 02/01 et 1 individu plage de la Tourette le 30/12 (M.-P., A. & X.H.). À l'automne, un seul oiseau est observé en vol près de l'héliport le 25/11 (B.I.).

TADORNE DE BELON *Tadorna tadorna* (1259/105)

L'espèce est observée de février à juillet sur l'île où elle se reproduit - 2 premiers oiseaux le 14/02 pointe de la Gournaise (M.-P., A. & X.H.). Les maxima sont notés au printemps avec par exemple 26 individus près de l'aérodrome le 28/05 (D.S.). L'essentiel des couples reproducteurs est noté entre Port-Joinville et la pointe du But et sur la côte sauvage mais sans décompte précis. Pas de reproduction certaine dans la carrière et les marais de la Guerche. Un seul indice certain de nidification est rapporté cette année, avec 1 poussin de quelques jours dans un site improbable (une grande mare au fond d'un jardin juste derrière la plage de la Tourette) le 30/05 (V.A. & J.-M.G., M.-P. & X.H.). Le premier oiseau est de retour dès le 21/12 plage de Ker Châlon (V.A. & J.-M.G.).



Photo © Frédéric Portier

CANARD SIFFLEUR *Anas penelope* (39/6)

L'espèce n'est observée cette année qu'en hiver. Ainsi, 1 femelle est découverte posée devant les plages de la Tourette et de Ker Châlon le 01/01 (M.-P. & X.H., N.B.). Un individu (le même ?) est noté dans les marais de la Guerche le 03/01 (N.B.) puis 1 mâle au Marais Salé du 04 au 07/01 (M.-P. & X.H., V.A.). Aucune donnée à l'automne.

SARCELLE D'HIVER *Anas crecca* (59/1)

L'espèce est très peu observée cette année avec seulement 1 mâle pointe de Gilberge le 01/01 (N.B.).

CANARD COLVERT *Anas platyrhynchos* (600/91)

Comme les années précédentes, beaucoup d'observations cette année, y compris plusieurs en hiver. Il est difficile de connaître exactement le nombre de couples nicheurs mais on peut estimer qu'au moins 4 ou 5 couples se sont reproduits dans les marais de la Guerche. L'espèce s'est très probablement reproduite également au Marais Salé et dans les marais de la Croix. Les premiers poussins sont observés le 06/04 dans les marais de la Guerche (S.K.). Pas de passage noté à l'automne.

CANARD PILET *Anas acuta* (29/2)

Une femelle est observée en hiver, posée plage de la Tourette le 01/01 (N.B.). Plus classiquement, l'espèce est notée lors du passage postnuptial avec 22 individus en vol (avec d'autres anatidés) au-dessus de la dune de la Grande Conche le 30/10 (M.-P. & X.H.).

CANARD SOUCHET *Anas clypeata* (29/6)

Le Canard souchet est observé cette année aux passages pré et postnuptial. Au printemps, 16 individus sont notés au passage pointe du But le 27/3 (F.Si.) et une femelle posée sur la mare des Broches les 27 et 28/03 (V.A. & J.-M.G.). À l'automne, 7 individus sont observés en vol depuis la pointe du But le 08/09 (X.H.) puis 1 individu en vol (avec d'autres anatidés) au-dessus de la dune de la Grande Conche le 30/10 (M.-P. & X.H.) et, enfin, 22 individus en vol depuis la pointe du But le 31/10 (M.-P. & X.H.). Aucune donnée en hiver.



Photo © Jean-Marc Guilpain

FULIGULE MILOUIN *Aythya ferina* (3/1)

Le Fuligule milouin est très rare sur l'île. La femelle observée posée pointe Gauthier le 31/12/2018 est revue le 01/01 pointe des Corbeaux (M.-P. & X.H.).

Il s'agit seulement de la 4^{ème} mention de l'espèce sur l'île après celle d'un mâle posé le 08/02/2006 dans les marais de la Guerche (X. Hindermeyer), d'un autre posé sur la mare des Broches le 08/01/2013 (A. Mousnier fide S. Desmarest) et d'une femelle posée pointe Gauthier le 31/12/2018 (N. Biron).

MACREUSE NOIRE *Melanitta nigra* (385/21)

L'espèce est assez commune dans les eaux de l'île. Elle y est observée en janvier, mars et avril puis de septembre à décembre. La majorité des observations est faite depuis la côte nord - 30 individus en vol devant la plage des Ovaies le 30/10 (M.-P. & X.H.). Il s'agit souvent d'oiseaux en vol même si quelques oiseaux sont posés - par exemple 2 individus devant la plage des Vieilles le 06/11 (V.A. & J.-M.G.). Pas d'hivernage important d'oiseaux noté entre la pointe des Corbeaux et le continent.

MACREUSE BRUNE *Melanitta fusca* (12/1)

Une seule observation de Macreuse brune cette année : 1 individu en vol depuis la plage de la Petite Conche le 04/01 (N.B.). L'espèce reste rare dans les eaux de l'île.

HARLE HUPPÉ *Mergus serrator* (165/8)

Le Harle huppé est observé cette année uniquement en janvier et décembre. Il s'agit à chaque fois d'un seul individu (une femelle) sur la côte nord de l'île.

PERDRIX ROUGE *Alectoris rufa* (415/67)

L'espèce est observée de janvier à mai puis d'août à octobre et en décembre. Elle semble se maintenir sur l'île grâce aux lâchers d'oiseaux d'élevage. Un seul indice de reproduction certain rapporté cette année avec 2 adultes et 4 jeunes le 29/08 sur la dune de la Grande Conche (X.H. & J.-P.S.).

PERDRIX GRISE *Perdix perdix* (11/4)

La Perdrix grise est rare sur l'île et l'origine des oiseaux qui y sont notés est inconnue. Pour la première fois la reproduction de l'espèce sur l'île a été prouvée : 1 adulte et 15 poussins le 27/06 pointe du Porteau, 1 individu de 1^{ère} année le 11/07 à Saint-Sauveur (C.Bu.) et 2 adultes et au moins 1 poussin le 03/09 près de la carrière (O.Pe.). Enfin, 1 individu est observé le 28/12 près de la plage des Iliaux (M.-P. & X.H.).

FAISAN DE COLCHIDE *Phasianus colchicus* (1404/103)

L'espèce est bien présente sur l'île où elle est observée toute l'année. Plusieurs preuves de nidification sont rapportées cette année notamment dans les marais de la Croix - 1 femelle avec 4 poussins le 25/05 (L.Ch.) - la dune de la Grande Conche, la côte sauvage entre la Croix et les Tchinettes, Ker Bossy et les prairies de Perdrette. Comme pour la Perdrix rouge, des lâchers réguliers d'oiseaux d'élevage sont effectués pour la chasse.

PLONGEON CATMARIN *Gavia stellata* (341/28)

Le Plongeon catmarin est le plongeon le plus commun en hiver autour de l'île. Toutefois, comme les années précédentes, assez peu d'oiseaux sont notés cette année. Il est observé de janvier à mars puis en décembre. Les oiseaux fréquentent principalement la côte nord. Les maxima, qui restent modestes, sont notés en mars et décembre avec 14 individus entre les plages des Ovaires et de la Grande Conche le 19/03 (V.A. & J.-M.G.) et 11 individus le long de la côte nord le 30/12 (M.-P. & X.H.).

PLONGEON ARCTIQUE *Gavia arctica* (98/4)

Le Plongeon arctique est régulier mais reste assez peu commun autour de l'île. Cette année quatre données concernant deux individus seulement : le premier, découvert le 29/10 plage des Ovaires (A.L.G.), est présent jusqu'au 01/11 au moins (M.-P. & X.H.) et le second est observé en vol puis posé pointe du But le 31/12 (M.-P. & X.H.).

PLONGEON IMBRIN *Gavia immer* (380/37)

L'espèce est notée de janvier à mars - dernier oiseau le 30/03 plage des Ovaires (M.-P. & X.H.) - puis à partir de novembre avec un premier oiseau le 23/11 plage de la Tourette (V.A. & J.-M.G., B.I.). En décembre, on dénombre entre 3 et 5 individus hivernants - 5 individus le 10/12 plage des Iliaux (V.A. & J.-M.G., M.-P.H.). Les observations ont uniquement lieu sur la côte nord de l'île (principalement de Port-Joinville à la pointe des Corbeaux).



Photo © Jean-Marc Guilpain

GRÈBE CASTAGNEUX *Tachybaptus ruficollis* (181/8)

Peu de données cette année. On note une diminution des effectifs ces dernières années. Premier retour noté dès le 14/02 avec 1 individu entendu au Marais Salé (M.-P. & X.H.). Pas de preuve formelle de nidification même s'il est très probable que l'espèce se soit reproduite, comme les années précédentes, dans les marais de la Croix - 1 individu noté le 16/05 (F.P.).

GRÈBE JOUGRIS *Podiceps grisegena* (35/17)**

Le Grèbe jougris est observé en janvier, février et mars sur les plages de la côte nord de l'île - 2 derniers oiseaux le 19/03 pointe du Porteau et plage des Ovaires (V.A. & J.-M.G.). Au maximum 3 individus sont notés en même temps - 1 individu plage des Sapins, 1 individu plage du Marais Salé et 1 individu plage des Iliaux le 18/02 (M.-P. & X.H.). Ces données sont en cours d'examen par le comité d'homologation vendéen (CH85).



Photo © Valérie Auriaux

GRÈBE HUPPÉ *Podiceps cristatus* (1198/73)

L'espèce, qui hiverne dans les eaux de l'île, y est observée cette année de janvier à mai - dernier oiseau le 08/05 plage de la Tourette (J.D.L.) - puis à partir de novembre - premier oiseau le 23/11 plage de la Petite Conche (V.A. & J.-M.G., B.I.). La totalité des observations est faite sur la côte nord. Le maximum, très faible cette année, est noté le 19/01, lors du comptage Wetlands International, avec seulement 9 individus dénombrés le long de la côte nord (M.-P. & X.H.).

GRÈBE ESCLAVON *Podiceps auritus* (74/19)

Le Grèbe esclavon est de nouveau observé beaucoup plus régulièrement sur l'île. De 1 à 2 individus sont observés de janvier à mars - dernière observation d'un individu le 19/03 plage des Iliaux (V.A. & J.-M.G.) - sur les plages de la côte nord (presque uniquement de Port-Joinville à la pointe de Gilberge). L'espèce est de retour sur l'île à partir du 23/11 avec 1 individu plage de la Tourette (B.I., V.A. & J.-M.G.) puis 2 individus en décembre - 1 individu pointe de Gilberge et 1 individu plage des Iliaux le 10/12 (V.A. & J.-M.G., M.-P.H.).

GRÈBE A COU NOIR *Podiceps nigricollis* (104/28)

Beaucoup d'observations de nouveau cette année pour cette espèce qui n'est pas notée tous les ans dans les eaux de l'île. De 1 à 3 individus sont observés régulièrement de janvier à mars - dernière observation d'un individu le 19/03 plage de la Tourette (V.A. & J.-M.G.) - sur les plages de la côte nord (uniquement de Port-Joinville à la pointe de Gilberge). Le Grèbe à cou noir est de retour sur l'île à partir de décembre, où au moins 3 individus différents sont comptés à la Galiote et plage de la Tourette - 3 individus plage de la Tourette le 30/12 (B.I. & M.Do.).

FULMAR BORÉAL *Fulmarus glacialis* (158/9)

Le Fulmar boréal est observé principalement au printemps cette année du 08/03 - 1 individu devant la pointe du Châtelet (V.A. & J.-M.G.) - au 08/06 - 1 individu tardif devant la pointe du But (V.A. & J.-M.G.). Une seule donnée lors du passage postnuptial avec 1 individu en vol le 07/09 devant la pointe du But (X.H.). Il s'agit à chaque fois d'un ou deux individus, exceptés 3 individus devant la plage des Broches le 21/04 (V.A. & J.-M.G.).

PUFFIN CENDRÉ *Calonectris diomedea* (128/4)

Très peu d'observations de Puffin cendré cette année. Les premiers oiseaux sont notés en juin avec 2 individus au passage en 45 minutes depuis la pointe du But le 22/06 (X.H.) et 1 individu au passage en 30 minutes depuis la pointe des Corbeaux le 30/06 (M.-P.H.). Ensuite, 1 individu est observé au passage devant la pointe du But le 25/08 (M.-P. & X.H., J.-P. & C.S.) et 1 individu au passage en 50 minutes devant la pointe des Corbeaux le 29/09 (X.H.).

PUFFIN FULIGINEUX *Puffinus griseus* (143/10)

L'espèce est observée cette année du 27/07 - 1 individu précoce depuis la pointe des Corbeaux (M.-P. & X.H.) - au 19/10 - 1 individu au passage en 55 minutes depuis la pointe du But (X.H.). Ces observations ne concernent qu'un à trois individus à chaque fois, exceptés 13 individus au passage en 2h25 le 06/10 devant la pointe du But (X.H., B.I., J.-M.G., J.G. & L.Ch.).

PUFFIN DES ANGLAIS *Puffinus puffinus* (280/21)

Le Puffin des Anglais est observé cette année du 27/04 au 17/05 puis du 27/07 au 19/10. Les maxima sont notés classiquement en avril - 14 individus au passage devant la pointe du But le 27/04 (M.-P.H.) - et en août - 11 individus au passage en 1h35 devant la pointe du But le 29/08 (X.H. & J.-P.S.).

PUFFIN DES BALÉARES *Puffinus mauretanicus* (1120/54)

Le Puffin des Baléares reste, de loin, le puffin le plus commun dans les eaux de l'île. L'espèce y est observée à partir d'avril - premier oiseau noté au passage en 30 minutes depuis la pointe du But le 27/04 (M.-P.H.). Un petit passage est noté en juillet - 173 individus au passage depuis la pointe du But et 262 individus en 1h15 depuis la pointe des Corbeaux le 27/07 (M.-P. & X.H.) - et en octobre - 177 individus au passage devant la pointe du But le 01/10 (B.I. & M.F.). Les 15 derniers oiseaux sont notés le 04/11 depuis la pointe des Corbeaux (V.A. & J.-M.G.). Pas d'observation hivernale.

Enfin, deux observations de Puffin sp. en juillet et septembre concernent probablement cette espèce.

OCÉANITE TEMPÊTE *Hydrobates pelagicus* (196/4)

L'espèce est très peu observée cette année, seulement en juin et septembre dans les eaux de l'île. Les maxima sont notés le 07/06 avec 13 individus depuis la digue du port de Port-Joinville (V.A. & J.-M.G.) et le 29/09 avec plus de 35 individus au passage en 2h25 devant la pointe du But (X.H., J.-M.G., B.I., J.G. & L.Ch.). Les observations de plusieurs individus d'Océanite sp. les 08/06 et 01/10 depuis la pointe du But (S.D.) se rapportent sans doute également à cette espèce.





Photos © Jean-Marc Guilpain

FOU DE BASSAN *Morus bassanus* (3430/286)

L'espèce, commune, est observée presque toute l'année autour de l'île. Les maxima sont notés en été - plus de 200 individus le 30/06 (M.-P.H.) et plus de 300 individus le 06/07 en pêche au large de la pointe des Corbeaux (S.C.) - et lors du passage postnuptial avec par exemple 298 individus (dont 214 en 30 minutes) le 07/09 (X.H.) et plus de 380 individus en 1h30 le 01/11 au passage devant la pointe du But (M.-P. & X.H.).

GRAND CORMORAN *Phalacrocorax carbo* (4475/396)

L'espèce est observée toute l'année autour de l'île où elle est commune. Plus de 60 oiseaux hivernants seulement sont dénombrés sur l'île le 19/01 lors du comptage Wetlands International (M.-P. & X.H.). Les groupes les plus importants sont notés au printemps et en automne - maximum 19 individus posés ensemble entre l'anse des Soux et l'anse des Fontaines le 30/05 (M.-P. & X.H.) et 20 individus pointe du But le 19/10 (X.H.).

CORMORAN HUPPÉ *Phalacrocorax aristotelis* (1087/134)

Le Cormoran huppé est observé presque tout au long de l'année autour de l'île. Pas d'indice de nidification cette année. Presque toutes les observations concernent 1 à 5 oiseaux, exceptés 8 individus posés sur le rocher du Crabe le 01/01 (M.-P. & X.H.). Plusieurs oiseaux bagués "couleur" ont été observés sur l'île cette année (5 lectures concernant 3 individus différents). Il s'agit, comme très souvent, d'oiseaux de 1^{ère} ou 2^{ème} année bagués poussins dans l'archipel d'Houat-Hoëdic (M. Leicher, comm. pers.).

HÉRON GARDEBŒUFS *Bubulcus ibis* (30/6)

Après une année blanche, retour de l'espèce sur l'île. Le Héron gardeboeufs est noté à plusieurs reprises au printemps : 1 individu au Marais Salé le 09/04 (V.A. & J.-M.G.), 4 individus plage du Cours du Moulin puis au Marais Salé le 23/04 (V.A. & J.-M.G., D.S.), 1 individu à la Bergerie le 27/04 (M.-P.H.) et 1 individu près du vallon du Jars le 14/05 (S.D.). A l'automne, 1 seul individu est observé au Marais Salé le 23/11 (V.A. & J.-M.G., B.I.). Le Héron gardeboeufs est de plus en plus régulier sur l'île.



Photo © Jean-Marc Guilpain

AIGRETTE GARZETTE *Egretta garzetta* (3599/237)

L'espèce est présente toute l'année sur les plages et dans les marais de la côte nord de l'île (principalement ceux de la Guerche), plus rarement sur la côte sauvage et à l'intérieur de l'île. L'Aigrette garzette ne s'est pas reproduite cette année sur l'île. Les oiseaux sont le plus souvent dispersés sur l'île et il est donc presque impossible d'avoir une idée exacte de l'effectif présent simultanément. Le plus gros groupe noté cette année est seulement de 7 individus posés pointe de la Gournaise le 28/09 et dans les marais de la Guerche le 16/09 (X.H.).

GRANDE AIGRETTE *Ardea alba* (20/3)

Trois nouvelles observations cette année de cette espèce, toujours peu commune sur l'île mais de plus en plus régulière, au printemps et à l'automne : 1 individu posé au Marais Salé le 09/04 (V.A. & J.-M.G.), 1 individu en vol depuis la pointe de la Gournaise le 12/05 (M.-P.H.) et 1 individu en vol depuis le camping le 08/10 (F.P.).



Photo © Jean-Marc Guilpain

HÉRON CENDRÉ *Ardea cinerea* (2542/171)

L'espèce est présente en petit nombre toute l'année sur les plages et dans les marais de la côte nord de l'île. La reproduction du Héron cendré sur l'île qui était annuelle n'a pas pu être confirmée cette année avec certitude, y compris dans les marais de la Guerche. On note un petit passage à l'automne avec par exemple 6 individus en migration active au-dessus de la rue Georges Clemenceau à Port-Joinville le 07/09 (V.A. & J.-M.G.) et 5 individus depuis la pointe Gauthier le 26/10 (J.D.L.).

HÉRON POURPRÉ *Ardea purpurea* (49/1)

Une seule observation cette année lors du passage prénuptial : 1 individu précoce le 30/03 se pose quelques instants au Marais Salé et repart (M.-P. & X.H.).

CIGOGNE BLANCHE *Ciconia ciconia* (4/4)

Plusieurs nouvelles observations de Cigogne blanche (sans doute toutes du même groupe) sur l'île lors du passage postnuptial : 1 individu adulte en vol au-dessus du vallon des Sabias (O.Pe.), 1 individu posé aux Nates qui rejoint 3 autres individus en vol (R.Gi.), 2 individus de 1^{ère} année posés sur un arbre dans les marais de la Croix le 28/08 et 2 individus (les mêmes) décollant des marais de la Croix et filant plein sud le 29/08 (J.-P.S. & X.H.). Les 2 individus posés dans marais de la Croix étaient bagués. Ils font partie d'un programme anglais de réintroduction et ont été relâchés le 14/08 au Cotswold Wildlife Park (West Sussex) www.whitestorkproject.org. L'espèce reste très rare sur l'île.

Il s'agit seulement des 5 à 8^{ème} mentions certaines de l'espèce sur l'île après celle d'un individu (probablement posé auparavant dans les marais de la Guerche) en vol le 31/08/2002 (M.-P. & X. Hindermeyer), celle d'un individu posé dans les prairies de Ker Viroux le 17/04/2013 (N. Chauvet fide S. Desmarest), celle d'un individu le 03/04/2016 en vol depuis la pointe de Gilberge, longeant le bord de mer en direction de la pointe des Corbeaux (V. Auriaux) et celle de 2 individus en vol depuis Chiron Moreau le 16/06/2017 (V. Auriaux). Plusieurs autres observations nous ont toutefois été rapportées (notamment celle d'un individu posé sur le toit de l'école) mais à chaque fois sans date ou lieu précis.



Photo © Jean-Philippe Siblet



Photo © Olivier Penard

SPATULE BLANCHE *Platalea leucorodia* (31/1)

L'espèce, peu commune sur l'île même si elle y est de plus en plus régulière, est de nouveau observée cette année à l'automne : 28 individus en vol lors de la traversée Fromentine-Yeu le 14/09 (B.I.).

BONDRÉE APIVORE *Pernis apivorus* (117/33)

L'espèce est beaucoup observée cette année, presque uniquement à l'automne. Au printemps, 1 seul individu est noté en vol au-dessus des marais de la Guerche le 24/05 (C.E.H.). Le passage postnuptial est très net cette année. Il commence le 23/08 avec 1 individu au-dessus de la cueillette du Champ Rouit (M.-P.H.) et se poursuit jusqu'au 15/09 avec 1 individu au-dessus de la Bergerie (B.I. & X.H.) et 1 individu au-dessus de la dune de la Grande Conche (X.H.). Le maximum d'oiseaux notés en une journée est de 12 le 11/09 (F.P., M.-P.H., V.A. & J.-M.G.). Presque toutes les observations concernent des oiseaux en migration active sauf 1 individu posé dans les marais de la Croix le 14/09 (X.H.).



Photo © Olivier Penard



Photo © Jean-Marc Guilpain

MILAN NOIR *Milvus migrans* (20/8)

Le Milan noir, peu commun sur l'île, est observé en nombre tout à fait inhabituel cette année au printemps : 1 individu en migration active au-dessus de la dune de la Grande Conche le 16/04 (M.-P. & X.H.), 1 individu (sans doute le même) au-dessus des marais de la Guerche (M.-P. & X.H.) puis de l'anse des Soux (F.St.) le 18/04, 1 individu au-dessus de la rue Georges Clemenceau à Port-Joinville et 1 (autre ?) depuis la dune de la Grande Conche le 16/04 (V.A. & J.-M.G.), 1 individu au-dessus de Cadouère le 13/05 (V.A. & J.-M.G.), 1 individu tardif au-dessus du vallon de Belle-Maison le 17/06 et 1 individu (peut-être le même) au-dessus de la rue Georges Clemenceau le 18/06 (V.A. & J.-M.G.). L'espèce semble de plus en plus régulière sur l'île, notamment au printemps.

MILAN ROYAL *Milvus milvus* (9/1)

Une seule donnée cette année lors du passage postnuptial : 1 individu précoce le 03/09 en migration active au-dessus du vallon des Sabias (F.H.). L'espèce qui reste rare sur l'île semble de plus en plus régulière à l'automne.

Il s'agit seulement de la 10^{ème} mention de l'espèce sur l'île après celles d'un individu les 26 et 27/10/1991 pointe du Châtelet (Groupe ornithologique vendéen), d'un individu au-dessus de la carrière le 12/12/2010 (X. Hindermeyer), d'un individu au-dessus du Sémaphore le 02/10/2016 (V. Auriaux), d'un individu au-dessus de la pointe des Corbeaux le 13/10/2016 (M. Faveyrial), d'un individu en migration active au-dessus de la saulaie des Sabias le 22/10/2016 (M.-P., A. & X. Hindermeyer), d'un individu au-dessus du bois de la citadelle le 22/11/2016 (V. Auriaux), d'un individu au-dessus de la mare des Broches le 31/10/2017 (M.-P. Hindermeyer & F. Sarrazin) et d'un individu en migration active depuis la dune de la Grande Conche le 03/11/2018 (M.-P., A. & X. Hindermeyer).

BUSARD DES ROSEAUX *Circus aeruginosus* (1851/223)

L'espèce peut être observée toute l'année sur l'île mais elle est toutefois beaucoup moins fréquente en hiver. Au moins trois couples (sans doute quatre ou peut-être même cinq) se sont reproduits cette année sur l'île notamment dans les marais de la Croix, de la Guerche, peut-être de la Gorelle et sur la côte sauvage. Le succès reproducteur a été de 1 ou 2 jeunes à l'envol. Quelques oiseaux sont notés en

migration active à l'automne, par exemple 1 individu le 23/09 au-dessus de la plage de la Grande Conche (V.A. & J.-M.G.).

BUSARD SAINT-MARTIN *Circus cyaneus* (73/5)

Après une année blanche, retour de l'espèce sur l'île, classiquement lors du passage postnuptial : 1 femelle adulte le 03/09 au-dessus de la lande des Sabias (F.H. & O.Pe.), 1 type femelle le 21/10 au dessus de la dune de la Grande Conche et le 23/10 près du Trou d'Enfer (V.A. & J.-M.G.) puis 1 mâle adulte au-dessus de la plage de la Grande Conche le 05/11 (M.Do.).

BUSARD PÂLE *Circus macrourus* (1/1)**

Belle surprise cet automne avec une nouvelle observation de Busard pâle : 1 individu de 1^{ère} année est observé en migration active au-dessus de la plage de la Tourette le 10/10 (O.Pe.). Cette donnée est en cours d'examen par le comité d'homologation vendéen (CH85).

Il s'agit seulement de la 2^{ème} mention de l'espèce sur l'île après celle d'un individu de 1^{ère} année posé puis en vol le 04/10/2016 dans les marais de la Guerche (F. Portier).



Photos © Olivier Penard

AUTOUR DES PALOMBES *Accipiter gentilis* (4/1)

Une nouvelle observation d'Autour des palombes qui reste très rare sur l'île : 1 individu arrivant de la mer est observé le 07/10 depuis le phare des Corbeaux (F.P.).

Il s'agit seulement de la 5^{ème} mention certaine de l'espèce sur l'île après celles d'un individu en vol le 01/05/2009 au dessus des marais de la Croix (M.-P. & X. Hindermeyer), de 2 individus le 15/10/2012 au dessus des marais de la Guerche (F. Portier), d'un mâle en migration active le 23/04/2013 au-dessus des marais de la Guerche (F. Portier) et d'un mâle en vol le 01/09/2015 au-dessus des marais de la Guerche (F. Portier). Il convient tout de même de rappeler que plusieurs observations d'un couple de cette espèce avaient été effectuées sur l'île durant l'été 1992 (Hindermeyer & Hindermeyer, 2006) et la possibilité d'une nidification avait même été évoquée. Toutefois ces données n'avaient pas été retenues, une confusion avec l'Épervier d'Europe, bien présent sur l'île, ne pouvant pas être complètement écartée.

ÉPERVIER D'EUROPE *Accipiter nisus* (1247/79)

L'espèce est présente toute l'année sur l'île où elle se reproduit. Pas d'indice certain de reproduction cette année. Même s'il est souvent difficile de distinguer les migrateurs des oiseaux locaux, quelques oiseaux sont notés en migration active en septembre et octobre par exemple 3 individus au-dessus du Marais Salé le 16/09 (X.H.).



Photo © Didier Simon

BUSE VARIABLE *Buteo buteo* (492/81)

La Buse variable peut désormais être observée toute l'année sur l'île. Encore beaucoup de données cette année, y compris au printemps. Un couple s'est de nouveau reproduit sur l'île dans les prairies de Perdrette et peut-être un second couple au centre de l'île. L'espèce est également observée aux deux passages - par exemple 6 individus le 30/04 au-dessus du terrain d'aéromodélisme (V.A. & J.-M.G.) et 3 individus le 28/10 au-dessus de la Pierre à Monsieur (A.L.G.).

AIGLE BOTTÉ *Aquila pennata* (6/1)**

Nouvelle observation lors du passage postnuptial pour cette espèce qui reste très rare sur l'île : 1 individu de forme sombre le 03/09 au-dessus de la lande des Sabias (F.H.). L'espèce n'avait plus été

notée sur l'île depuis 5 ans. Cette donnée est en cours d'examen par le comité d'homologation vendéen (CH85).

Il s'agit seulement de la 7^{ème} mention de l'espèce sur l'île après celle d'un individu de forme claire le 13/09/1992 au dessus du village de la Croix (X. Hindermeyer & le Centre d'études biologiques de Chizé), d'un individu de forme claire le 31/08/2007 au dessus des marais de la Guerche, d'un autre de forme sombre le 16/09/2007 au dessus du Marais Salé (X. Hindermeyer), d'un individu de forme claire le 29/08/2011 au dessus des Violettes (A. Sournia), d'un individu de forme claire le 02/09/2013 au dessus du village de la Croix (F. Portier) et d'un individu de forme claire posé sur un cyprès le 06/09/2014 dans les prairies de Perdrette (M.-P. & X. Hindermeyer).

BALBUZARD PÊCHEUR *Pandion haliaetus* (9/6)

Six nouvelles observations (un record !) de cette espèce, rare sur l'île mais qui semble annuelle au passage depuis quelques années : 1 individu en vol depuis l'anse des Broches le 21/04 (V.A. & J.-M.G.), 1 individu en vol depuis la dune de la Grande Conche les 01/05 (X.H. & J.-M.G.), 29/08 (J.-P.S.) et 09/09 (V.A. & J.-M.G.), 1 individu en vol depuis l'anse du Jars le 19/09 (V.A. & J.-M.G.) et 1 individu en vol depuis la dune de la Grande Conche le 02/10 (F.P.).

Il s'agit seulement des 10 à 15^{ème} mentions certaines de l'espèce sur l'île après celles d'un individu le 14/09/2006 au dessus de la pointe de la Gournaise (F. Portier & X. Hindermeyer), d'un individu le 08/07/2010 en migration active depuis la pointe du But (F. Portier), d'un individu le 27/03/2011 au dessus du vallon de Belle Maison (F. Portier & V. Auriaux), d'un individu posé puis en vol le 13/10/2013 derrière la plage du Loubinou (F. Portier), d'un individu en migration active le 07/09/2014 devant la plage des Vieilles (V. Auriaux), d'un individu en vol le 06/10/2015 au dessus des Sapins (O. Penard), d'un individu en vol depuis la plage des Roses le 09/09/2016 (V. Auriaux), d'un individu en vol depuis la plage des Sapins le 09/08/2017 (G. Bruneau) et d'un individu en vol depuis la plage de la Pulante le 24/09/2017 (M.-P. & X. Hindermeyer). C. Bugeon signale également dans sa synthèse sur l'avifaune de l'île (2013) une observation ancienne (vraisemblablement de la fin des années 1970) rapportée par P. Paulian et V. Pontoizeau (l'oiseau aurait été tué) et une observation personnelle d'un individu pêchant devant la plage des Conches vers la fin des années 1990.



Photo © Jean-Marc Guilpain

FAUCON CRÉCERELLE *Falco tinnunculus* (3244/253)

L'espèce est présente toute l'année sur l'île où elle se reproduit. Une seule preuve de reproduction près de la carrière le 16/04 (M.-P., A. & X.H.) et une reproduction très probable près du Grand Phare (S.D.). Pas de passage marqué, ni au printemps, ni à l'automne.



Photo © Jean-Philippe Siblet

FAUCON ÉMERILLON *Falco columbarius* (209/17)

L'espèce est observée cette année aux deux passages. Un seul individu noté lors du passage prénuptial le 26/03 au-dessus de la dune de la Grande Conche (V.A. & J.-M.G.). Le passage postnuptial débute le 15/09 avec 1 mâle près de la carrière (X.H.) et se poursuit jusqu'au 12/10 avec 1 individu près de la Pierre à Monsieur (A.Ch.). Il s'agit à chaque fois d'un seul oiseau, excepté 2 individus (un mâle et une femelle) le 10/10 près de la Pierre à Monsieur (O.Pe.). Aucune observation en hiver.



Photo © Didier Simon

FAUCON HOBEREAU *Falco subbuteo* (681/50)

Le Faucon hobereau est présent sur l'île à partir du mois d'avril - 1 individu le 16/04 dans les marais de la Croix (M.-P. & X.H.) - jusqu'au mois d'octobre - dernier oiseau le 09/10 aux Nates (F.P.). Un seul indice de reproduction cette année dans les marais de la Croix (avec un ou deux couples) mais visiblement sans succès.

FAUCON D'ÉLÉONORE *Falco eleonora* (2/1)**

Belle surprise avec l'observation d'un nouvel individu (le second en deux ans !) depuis la rue Georges Clemenceau à Port-Joinville le 07/09 (V.A. & J.-M.G., X.H.). L'oiseau, repéré haut dans le ciel, n'a pas été identifié tout de suite (même si les principaux critères avaient été notés) mais sur les photographies prises lors de son passage au-dessus de la maison. Cette donnée est en cours d'examen par le comité d'homologation vendéen (CH85).

Il s'agit seulement de la 3^{ème} mention de l'espèce sur l'île après celle d'un immature (deuxième année) le 03/07/2011 près du phare des Corbeaux (F. Portier) et d'un individu de forme claire autour de la pointe des Corbeaux le 22/08/2018 (M.-P. & X. Hindermeyer & D. Simon).



Photo © Jean-Marc Guilpain

FAUCON PÈLERIN *Falco peregrinus* (51/4)

Le Faucon pèlerin est observé cette année surtout au printemps. Un premier oiseau (une femelle immature) est noté depuis la dune de la Grande Conche le 19/04 (B.I. & X.H.) puis 1 individu depuis le Grand Phare le 13/05 (S.D.) et, enfin, 1 individu au dessus de l'héliport à Port-Joinville le 16/05 (Q.G.). A l'automne, un seul individu en vol à Port-Joinville le 29/09 (B.I., J.G. & L.Ch.).

RÂLE D'EAU *Rallus aquaticus* (624/21)

Le nombre de données de Râle d'eau est en diminution, notamment en période de reproduction. L'espèce est pourtant présente toute l'année sur l'île où elle se reproduit au moins dans les marais de la Croix (peut-être également dans les marais de l'Ilia et de la Gorette). En dehors de ce site, des observations sont faites, le plus souvent à l'automne et en hiver, dans les marais de la Guerche - 2

individus le 16/09 (X.H.) et 3 individus le 10/10 (O.Pe.) - et dans des milieux beaucoup moins humides comme à Chiron Bureau - 1 individu dans un jardin le 04/09 (V.A. & J.-M.G.).



Photo © François Halligon

GALLINULE POULE-D'EAU *Gallinula chloropus* (1557/92)

L'espèce est présente toute l'année sur l'île où elle se reproduit notamment dans les marais de la Croix, de l'Ilia, au Marais Salé et dans la carrière. Le maximum, très faible, est noté en automne au Marais Salé avec seulement 10 individus le 11/09 (F.P.).

GRUE CENDRÉE *Grus grus* (5/1)

Une nouvelle donnée de Grue cendrée sur l'île d'Yeu : 3 individus en migration active au-dessus de la Pierre à Monsieur le 28/10 (A.L.G.). L'espèce reste rare sur l'île mais ce manque de données masque sans doute une réalité un peu différente.

Il s'agit seulement de la 6^{ème} mention connue de l'espèce sur l'île après celle d'un immature en vol depuis la plage du Cours du Moulin le 05/04/2007 (F. Portier), d'un adulte en vol depuis la chapelle de la Meule le 19/02/2009 (M.-P., A. & X. Hindermeyer), de 15 individus en migration active au-dessus des marais de la Croix le 26/11/2016 (X. Hindermeyer) de plus de 15 individus en migration active au-dessus du village des Marines à Ker Châlon et 19 individus (peut-être le même groupe) au-dessus des Tchinettes le 29/10/2018 (M.-P., A. & X. Hindermeyer). Des chasseurs de l'île et plusieurs autres observateurs ont simplement mentionné l'espèce mais sans donner de date précise (C. Bugeon, comm. pers.).

HUÎTRIER PIE *Haematopus ostralegus* (344/26)

L'espèce est notée principalement d'avril à septembre tout autour de l'île. Il est très probable que l'espèce se soit reproduite sur la côte sauvage de l'île cette année, avec trois couples potentiels - par exemple 2 individus adultes près du Vieux Château le 16/04 (M.-P. & X.H., V.A. & J.-M.G.) revus à plusieurs reprises jusqu'en août - même si aucune preuve formelle n'a pu être apportée - tout de même 3 individus (1 adulte et 1 1^{ère} année au moins) posés pointe de la Père le 06/09 (X.H., O.Pe., V.A. & J.-M.G.). Pas de passage net, ni au printemps, ni à l'automne. Une observation de fin d'hiver avec 1 individu le 17/02 plage des Ovaires (M.-P. & X.H., J.-M.G.)

ÉCHASSE BLANCHE *Himantopus himantopus* (28/6)

Après une année sans, une nouvelle observation d'Échasse blanche au printemps avec 1 mâle posé dans la mare des Broches du 23 au 26/04 (V.A. & J.-M.G., S.D. & M.-P.H.). L'espèce est de plus en plus régulière sur l'île.



Photo © Valérie Auriaux



Photo © Didier Simon

PETIT GRAVELOT *Charadrius dubius* (3/2)

Enfin deux nouvelles données de Petit Gravelot sur l'île : 1 individu est observé posé les 24 et 25/05 sur la plage de la Tourette (X.H. & J.-M.G.). L'espèce n'avait pas été observée sur l'île depuis plus de 12 ans !

Il s'agit seulement des 4 et 5^{ème} mentions certaines de l'espèce sur l'île après celles de deux individus pointe de Gilberge le 29/08/1989 (D. Vendromme & V. Cornuaille) et d'un individu les 09 et 12/04/2007 dans les marais de la Guerche (M.-P. & X. Hindermeyer). Deux autres données d'août 1992 sont incertaines.

GRAND GRAVELOT *Charadrius hiaticula* (2134/238)

L'espèce est observée de janvier à mai puis de fin juillet à décembre. Plus de 85 individus sont dénombrés sur l'île le 19/01 lors du comptage Wetlands International (M.-P. & X.H.). Les oiseaux quittent progressivement l'île à partir de fin février. Les derniers oiseaux sont observés en mai - 1 individu le 24/05 plage de la Tourette (X.H.). Le passage postnuptial qui commence dès juillet est net à partir d'août - déjà plus de 50 individus le 23/08 plage de la Pulante (M.-P.H.) - et se poursuit en septembre et octobre. Les maxima sont classiquement notés à l'automne avec par exemple plus de 150 individus le 07/10 plage de la Tourette (T.Y.). Deux oiseaux bagués "couleur" ont été observés cette année sur la côte nord. Le premier, noté d'août à décembre avait été bagué à Dazendorf (Schleswig-Holstein) en Allemagne le 09/05/2019 (M. Altemüller, comm. pers.) et le second, noté en décembre, avait été bagué sur la presqu'île de Hel en Pologne le 11/06/2018 (Polring : <http://ring.stornit.gda.pl>).



Photo © Jean-Philippe Siblet

GRAVELOT À COLLIER INTERROMPU *Charadrius alexandrinus* (145/3)

Le Gravelot à collier interrompu (1 individu) a hiverné tous les ans sur la côte nord de l'île de l'hiver 2006-2007 jusqu'en 2012. Plus rien ensuite si ce n'est l'observation d'un individu en janvier 2017 mais qui ne sera pas revu de tout l'hiver puis d'un individu en mai 2018. Trois nouvelles observations cette année en hiver avec 1 individu découvert posé plage de Ker Châlon le 20/12 (V.A. & J.-M.G.) qui sera revu plage de la Tourette les 29 et 30/12 (M.-P. & X.H.).

PLUVIER GUIGNARD *Charadrius morinellus* (40/10)**

Le Pluvier guignard est observé cette année lors du passage postnuptial. Un individu de 1^{ère} année est découvert le 24/09 sur la côte sauvage près de la pointe des Chancelles (D.S.). Il sera retrouvé au même endroit le 26/09 (D.S., V.A. & J.-M.G.) et revu jusqu'au 28/09 entre la pointe des Chancelles et la Pierre des Amporelles (X.H., S.D., B.I., J.G. & L.Ch.). Un individu adulte le rejoindra le 28/09

(X.H., S.D., B.I., J.G. & L.Ch.) et sera observé au même endroit jusqu'au 01/10 (F.P.). Ces données sont en cours d'examen par le comité d'homologation vendéen (CH85).



Photo © Frédéric Portier



Photo © Jean-Marc Guilpain

PLUVIER DORÉ *Pluvialis apricaria* (238/27)

L'espèce est observée en janvier, avril et mai puis de septembre à décembre. Il s'agit le plus souvent de 1 à 4 individus en vol ou posés sur la côte sauvage, les dunes ou même les plages de la côte nord - 3 individus posés plage des Bossilles/de la Borgne le 20/10 (X.H.). Un tout petit passage est noté en avril avec par exemple 6 individus sur l'aérodrome le 26/04 (V.A. & J.-M.G.).



Photo © Jean-Marc Guilpain

PLUVIER ARGENTÉ *Pluvialis squatarola* (280/40)

L'espèce est observée en janvier, février et mai - 2 individus le 13/05 plage de Ker Châlon (M.-P.H.) - puis d'octobre à décembre. Il s'agit presque à chaque fois de 1 à 2 individus, le plus souvent posés sur les plages de la côte nord, excepté 3 individus posés le 15/02 plage de la Tourette (M.-P. & X.H.).

VANNEAU HUPPÉ *Vanellus vanellus* (709/70)

La petite population nicheuse de cette espèce se maintient sur l'île. Cette année de nouveau au moins 10 couples nicheurs sont dénombrés sur l'aérodrome (et autour) et le premier poussin (de moins d'une semaine) est découvert le 29/04 près de la Pierre des Amporelles (B.I. & L.Ch.). Les autres observations sont effectuées en janvier et février - 1 individu sur l'aérodrome dès le 04/01 (M.-P. & X.H.) - puis en octobre et novembre, correspondant à des oiseaux de passage - par exemple 4 individus sur la dune de la Grande Conche le 29/10 (A.L.G.).



Photo © Didier Simon

BÉCASSEAU MAUBÈCHE *Calidris canutus* (146/10)

L'espèce est très peu notée cette année aux deux passages. Au printemps, 1 seul individu en plumage nuptial est observé le 17/05 entre les plages de la Pulante, du Cours du Moulin et des Bossilles/de la Borgne (F.P., V.A. & J.-M.G.). Lors du passage postnuptial, 1 individu de 1^{ère} année est découvert le 28/08 à la Galiote (O.Pe., X.H. & J.-P.S.) et sera revu jusqu'au 02/09 entre la plage de la Pulante et la plage des Bossilles/de la Borgne (X.H., J.-P.S., V.A. & J.-M.G.). Enfin, 1 individu (différent ?) est noté les 25 et 31/10 plage des Bossilles/de la Borgne (S.D., M.-P. & X.H.). Pas de donnée en hiver.



Photo © Jean-Marc Guilpain



Photo © Jean-Philippe Siblet

BÉCASSEAU SANDERLING *Calidris alba* (2120/282)

L'espèce, qui est en augmentation régulière depuis plusieurs années sur les rivages de l'île, est observée de janvier à mai puis de juillet à décembre. Toujours beaucoup d'oiseaux hivernants sur la côte nord de l'île - plus de 140 individus sont dénombrés sur l'île le 19/01 lors du comptage Wetlands International et plus de 180 individus le 18/02 plage de Ker Châlon (M.-P. & X.H.). Le passage prénuptial est net en avril avec par exemple plus de 200 individus le 18/04 pointe de la Gournaise (M.-P. & X.H.). Le passage postnuptial est noté dès juillet - déjà 22 individus le 22/07 plage des Bossilles/de la Borgne (M.-P. & X.H.) - et se poursuit jusqu'en novembre. Les maxima sont notés en septembre et octobre avec plus de 200 individus les 29/09 (X.H.) et 31/10 (M.-P. & X.H.) plage des Bossilles/de la Borgne. Deux individus bagués "couleur" sont observés les 17/05 plage du Cours du Moulin (F.P.) et les 23 et 24/08 (également porteur d'une balise) plage des Bossilles/de la Borgne (M.-P. & X.H.). Le premier avait été bagué le 22 mai 2016 en Islande (J. Reneerkens, comm. pers.) et pour le second le retour du bagueur ne nous est pas encore parvenu.



Photo © Jean-Marc Guilpain



Photo © Olivier Penard

BÉCASSEAU VIOLET *Calidris maritima* (950/77)

L'espèce, bien présente sur l'île, y est notée de janvier à mai puis de septembre à décembre. Le nombre exact d'hivernants est difficile à estimer mais 72 individus sont dénombrés sur l'île le 19/01

lors du comptage Wetlands International (M.-P. & X.H.). Le passage prénuptial, peu marqué, est noté en avril - plus de 35 individus posés le 19/04 pointe de la Gournaise (M.-P. & X.H.). Les premiers retours sont notés en septembre avec 2 individus posés le 15/09 pointe de la Gournaise (X.H.). Le passage postnuptial en octobre et novembre est très peu marqué de nouveau cette année - maximum 10 individus le 04/11 plage des Bossilles/de la Borgne (V.A. & J.-M.G.).



Photo © Jean-Marc Guilpain

BÉCASSEAU VARIABLE *Calidris alpina* (750/37)

Le Bécasseau variable est observé cette année aux deux passages. Le passage prénuptial a lieu en avril et mai avec par exemple 8 individus le 08/05 plage de la Tourette (J.D.L.) et encore 1 individu le 04/06 plage des Bossilles/de la Borgne (L.D.). Le passage postnuptial, très peu marqué, débute fin août avec 1 individu pointe du But le 25/08 (J.-P.S.) et se poursuit jusqu'en novembre - dernier oiseau le 04/11 plage des Bossilles/de la Borgne (V.A. & J.-M.G.). Un oiseau bagué couleur est observé les 31/10 et 01/11 plage des Bossilles/de la Borgne (M.-P. & X.H., J.D.L.). Il avait été bagué en Galice (O Grove, Pontevedra) en Espagne le 07/02/2019 (Antonio Fernández Cordeiro, comm. pers.). Aucune donnée en hiver.



Photo © Didier Simon

BÉCASSINE DES MARAIS *Gallinago gallinago* (207/13)

L'espèce est peu observée cette année. Une seule donnée au printemps avec 1 individu le 01/05 dans les marais de la Guerche (X.H.). Les autres observations ont lieu en septembre et octobre - par exemple 1 individu sur la dune de la Grande Conche le 21/10 (V.A. & J.-M.G.). La Bécassine des marais fréquente des lieux aussi diversifiés que les marais de la Guerche, la Bergerie, la dune de la Grande Conche, la plage de la Tourette, le Vieux Château et la pointe du Châtelet. A noter enfin une observation en hiver avec 1 individu à Ker Gigou le 15/12 (V.A. & J.-M.G.).

BARGE ROUSSE *Limosa lapponica* (150/3)

L'espèce est très peu observée cette année aux deux passages. Au printemps, deux observations seulement : 1 individu le 12/04 posé sur la côte sauvage près de la grotte du Bélier (V.A. & J.-M.G.) et 1 autre le 04/05 sur la plage de la Pulante (S.D.). Le passage postnuptial est quasi-inexistant avec au moins 1 individu entendu en migration nocturne le 29/08 à Ker Aura (J.-P.S.). Pas de donnée en hiver.



Photo © Jean-Marc Guilpain

COURLIS CORLIEU *Numenius phaeopus* (1791/140)

Classiquement, l'espèce est observée sur l'île aux deux passages prénuptial (du 11/04 au 25/05) et postnuptial (du 08/07 au 07/10). Les groupes les plus importants sont notés le 17/04 avec 14 individus posés plage des Sapins et 23 individus en vol le 27/07 pointe du But (M.-P., A. & X.H.). L'oiseau hivernant, observé en décembre 2018 sur les plages de la côte nord, a été revu le 04/01 plage de Ker Châlon (N.B.) puis à plusieurs reprises en février - par exemple le 17/02 plage des Iliaux et plage du Marais Salé (M.-P., A. & X.H., J.-M.G.).



Photo © Jean-Philippe Sibley

COURLIS CENDRÉ *Numenius arquata* (73/5)

Le Courlis cendré est observé cette année aux deux passages. Le passage prénuptial a lieu en avril avec par exemple 2 individus posés plage de Ker Châlon le 27/04 (L.Ch.). L'espèce est aussi notée en août - 1 individu près de la Pierre des Amporelles le 27/08 (J.-P.S. & X.H.) - et en décembre - 1 entendu au crépuscule près de la plage des Sapins le 30/12 (M.Do.).

CHEVALIER GAMBETTE *Tringa totanus* (166/16)

L'espèce, régulière sur l'île, est observée cette année aux deux passages. Le passage prénuptial débute le 23/03 avec 2 individus à la carrière (V.A. & J.-M.G.) et se poursuit jusqu'au 31/05 avec 1 individu pointe des Corbeaux (J.D.L.). Le passage postnuptial est noté du 23/08 - 1 individu plage des Bossilles/de la Borgne (M.-P.H.) - au 02/10 - 1 individu pointe des Corbeaux (F.P.). Ces observations ne concernent à chaque fois qu'un à trois individus, excepté 8 individus le 26/04 pointe du Porteau (M.-P.H., V.A. & J.-M.G.).



Photo © Jean-Marc Guilpain

CHEVALIER ABOYEUR *Tringa nebularia* (189/6)

Le Chevalier aboyeur, régulier sur l'île, est observé cette année aux passages pré et postnuptial. Au printemps, l'espèce est notée les 17/04 - 1 individu au-dessus de la dune de la Grande Conche (M.-P. & X.H.) - et 15/05 - 2 individus en vol au-dessus de Chiron Moreau (V.A. & J.-M.G.) et, probablement les mêmes au-dessus de la plage des Bossilles/de la Borgne (F.P.). Le passage postnuptial, très peu marqué cette année, a lieu en juillet, août et septembre - par exemple 1 individu le 26/08 au-dessus de la décharge (X.H., J.-P. & C.S.). Toutes les observations ne concernent qu'un ou deux individus toujours en migration active.

CHEVALIER CULBLANC *Tringa ochropus* (353/21)

L'espèce est observée aux deux passages. Le passage prénuptial, très marqué cette année, a lieu du 27/03 - 6 individus dans les marais de la Guerche (V.A. & J.-M.G.) - au 13/05 - 1 individu dans les marais de la Guerche (M.-P.H.). Le passage postnuptial, quasi-inexistant, a lieu en août avec 1 individu le 22/08 dans les marais de la Guerche (M.-P.H.) et 1 individu en vol au-dessus de la dune de la Grande Conche le 26/08 (X.H., J.-P. & C.S.). Une seule observation en hiver : 1 individu dans les marais de la Guerche le 03/01 (M.-P. & X.H.). Les marais de la Guerche constituent toujours le principal site d'observation avec plus de 80% des données.

CHEVALIER GUIGNETTE *Actitis hypoleucos* (1343/144)

L'espèce est observée sur les côtes de l'île et dans les marais presque toute l'année. Quelques oiseaux hivernent sur l'île - 1 individu le 04/01 plage de la Tourette (N.B.). Beaucoup d'observations entre

avril et octobre mais on ne note pas de groupes importants lors des passages pré et postnuptial - maximum 6 individus ensemble le 08/05 plage du Cours du Moulin (J.D.L.).

TOURNEPIERRE À COLLIER *Arenaria interpres* (3439/384)

L'espèce, commune, est observée presque toute l'année. Plus de 112 individus sont dénombrés sur l'île le 19/01 lors du comptage Wetlands International (M.-P. & X.H.). Pas de passage net noté au printemps. Le passage postnuptial, plus marqué, est noté dès juillet - déjà 10 individus pointe de la Gournaise le 06/07 (S.C.) - mais est surtout perceptible en septembre et octobre avec par exemple 220 individus le 23/09 plage de la Pulante (V.A. & J.-M.G.) et 230 individus le 10/10 plage des Bossilles/de la Borgne (O.Pe.).



Photo © Olivier Penard

PHALAROPE À BEC LARGE *Phalaropus fulicarius* (16/2)

Le Phalarope à bec large, toujours assez rare dans les eaux de l'île, est noté de nouveau cet automne : 1 individu est observé au passage le 12/10 (A.Ch.) et 1 autre individu le 31/10 (M.-P. & X.H.) devant la pointe du But.

LABBE POMARIN *Stercorarius pomarinus* (110/17)

L'espèce, peu abondante mais très régulière, est observée en petit nombre uniquement lors du passage postnuptial (du 10/08 au 04/11). Il s'agit à chaque fois d'un ou deux individus - maximum 3 individus au passage en 1h35 le 29/08 devant la pointe du But (X.H. & J.-P.S.). Pas de donnée en hiver.

LABBE PARASITE *Stercorarius parasiticus* (279/30)

L'espèce est observée cette année aux deux passages. Au printemps, le passage, presque inexistant, a lieu en avril avec 1 individu le 28/04 depuis la Pierre des Amporelles (M.-P.H., V.A. & J.-M.G.). Au contraire, à l'automne le passage (du 10/08 au 04/11) est très marqué. Il concerne de 1 à 8 individus à chaque fois, exceptés 10 individus au passage le 30/08 depuis la pointe des Corbeaux (X.H. & J.-P.S.) et 11 individus en 1h15 le 31/08 depuis la pointe du But (X.H.).

GRAND LABBE *Stercorarius skua* (670/39)

Le Grand Labbe est toujours le labbe le plus commun dans les eaux de l'île. Il y est observé cette année de janvier à mai puis de juillet à décembre - par exemple 2 individus au passage devant la carrière le 30/03 (M.-P. & X.H., J.-M.G.). Il s'agit le plus souvent de un à cinq oiseaux. Un passage

net est noté à l'automne avec par exemple 9 individus en 55 minutes le 19/10 (X.H.), 12 individus en 1h30 le 31/10 et 18 individus en 1h30 le 01/11 (M.-P. & X.H.).

MOUETTE MÉLANOCÉPHALE *Larus melanocephalus* (874/124)

L'espèce, désormais assez commune, est observée cette année en petit nombre (rarement plus de 10 individus) sur l'île de janvier à avril - 1 adulte le 13/04 posé pointe des Corbeaux (M.-P. & X.H.) - puis de juillet - 2 adultes pointe des Corbeaux le 01/07 (M.-P.H.) - à décembre. En fin d'hiver, on note un petit passage avec par exemple plus de 24 individus le 01/02 (M.-P.H.) et 15 individus (12 adultes, 2 2^{ème} année, 1 3^{ème} année) le 15/02 (M.-P. & X.H.) plage de Ker Châlon. Pas de passage marqué à l'automne. Plusieurs oiseaux bagués "couleur" ont été observés cette année en février et décembre sur les plages de la côte nord (3 lectures concernant 3 individus différents). Il s'agissait d'oiseaux bagués à Gdansk (Varsovie) en Pologne (M. Zielinska, comm. pers.), à Steinkirchen (Basse-Saxe) en Allemagne (A. Zours & M. Haupt, comm. pers.) et au polder de Sébastopol sur l'île de Noirmoutier en Vendée (C. Duponcheel, comm. pers.).

MOUETTE PYGMÉE *Hydrocoloeus minutus* (227/3)

Très peu d'observations cette année. La Mouette pygmée est notée seulement en avril - 3 individus de 2^{ème} année au passage pointe des Corbeaux le 27/04 (M.-P.H.) - puis en octobre et novembre - 2 adultes le 31/10 et 5 adultes le 01/11 (M.-P. & X.H.) au passage pointe du But.

MOUETTE DE SABINE *Xema sabini* (38/2)

Deux nouvelles observations à l'automne de cette espèce peu commune mais cependant régulière dans les eaux de l'île : 1 individu de 1^{ère} année le 27/09 (J.G.) et 1 individu le 01/10 (B.I., M.F., V.A. & J.-M.G.) au passage devant la pointe du But.

MOUETTE RIEUSE *Chroicocephalus ridibundus* (2807/203)

L'espèce est observée presque toute l'année sur l'île. Plus de 150 individus hivernent sur la côte nord. La majorité des oiseaux quitte l'île en février-mars même si quelques individus sont encore observés jusqu'en mai. Les premiers retours ont lieu dès fin juin-début juillet avec déjà 45 individus le 24/07 plage de la Tourette (M.-P. & A.H.). Pas de passage marqué à l'automne. L'oiseau bagué "couleur" observé l'année dernière, et bagué poussin à Kiskowo en Pologne le 10/06/2017 (Polring : <http://ring.stornit.gda.pl>), est revu les 29/08 (X.H.) et 14/09 plage des Bossilles/de la Borgne (S.D., X.H. & J.-M.G.).

GOÉLAND CENDRÉ *Larus canus* (499/84)

L'espèce, qui hiverne sur l'île, est observée de janvier à avril - encore 3 individus le 19/04 plage de la Grande Conche (B.I., M.-P. & X.H.) - puis d'octobre - premier oiseau adulte en vol devant la pointe de la Gournaise le 12/10 (M.-P. & X.H.) - à décembre. On note un petit passage en octobre avec par exemple 26 individus (5 adultes et 21 1^{ère} année) comptés en 1h30 devant la pointe du But le 01/11 (M.-P.H.). Les observations concernent le plus souvent moins de 20 individus. Les maxima sont notés en hiver avec 35 individus posés plage des Vieilles le 02/12 (V.A. & J.-M.G.) et plus de 74 individus dénombrés sur l'île le 19/01 lors du comptage Wetlands International (M.-P. & X.H.). Pour la première fois, deux oiseaux bagués "couleur" ont été observés en février cette année sur la côte nord. Le premier avait été bagué à Hamburg (Helgoland) en Allemagne le 17/06/2015 (S. Martens, comm. pers.) et le second près de Tarland (Aboyne) en Ecosse le 25/06/2016 (C. Campbell, comm. pers.).

GOÉLAND BRUN *Larus fuscus* (2107/136)

L'espèce est commune et nicheuse sur l'île où elle est observée toute l'année. Plus de 13 oiseaux hivernants seulement sont dénombrés sur l'île le 19/01 lors du comptage Wetlands International (M.-P. & X.H.). Au printemps, 566 couples de Goéland brun ont été dénombrés sur la côte sauvage les 30 et 31/05 (M.-P. & X.H., S.D., J.-M.G., V. & I.A.), soit une diminution de plus de 12% en deux ans. Les oiseaux arrivent tôt sur la côte sauvage avec déjà plus de 200 individus dans la carrière le 19/02 (M.-P. & X.H.). Pas de passage net au printemps et à l'automne. De nombreux oiseaux ont été bagués sur la côte sauvage de l'île dans le cadre du programme PERISCOPE (F. Latraube, comm. pers.). Plusieurs oiseaux bagués "couleur" ont été observés cette année (80 lectures concernant 63 individus

différents). Il s'agit d'oiseaux du programme PERISCOPE mais aussi d'oiseaux bagués à Zeebrugge (West-Vlaanderen) en Belgique (M. Van de Walle, comm. pers.) et sur la réserve naturelle nationale de Lilleau des Niges sur l'île de Ré en Charente-Maritime (J. Gernigon, comm. pers.).

La sous-espèce *Larus fuscus intermedius* est observée cette année : 1 adulte posé pointe de la Gournaise le 10/12 (V.A. & J.-M.G.).

GOÉLAND ARGENTÉ *Larus argentatus* (2642/257)

L'espèce est commune et nicheuse sur l'île où elle est observée toute l'année. Plus de 316 oiseaux hivernants sont dénombrés sur l'île le 19/01 lors du comptage Wetlands International (M.-P. & X.H.). Au printemps, 384 couples de Goéland argenté ont été dénombrés sur la côte sauvage les 30 et 31/05 (M.-P. & X.H., S.D., J.-M.G., V. & I.A.), soit une augmentation de plus de 14% en deux ans. Les oiseaux arrivent tôt sur la côte sauvage avec déjà plus de 300 individus dans la carrière le 19/02 (M.-P. & X.H.). Pas de passage net au printemps et à l'automne. Quelques oiseaux ont été bagués sur la côte sauvage de l'île dans le cadre du programme PERISCOPE (F. Latraube, comm. pers.). Plusieurs oiseaux bagués "couleur" ont été observés cette année (27 lectures concernant 17 individus différents). Il s'agit d'oiseaux bagués dans le cadre du programme PERISCOPE, sur la réserve naturelle nationale de Lilleau des Niges sur l'île de Ré en Charente-Maritime (J. Gernigon, comm. pers.) et à Guernesey (P. Veron, comm.pers.).



Photo © Frédéric Portier

GOÉLAND LEUCOPHÉE *Larus michahellis* (224/18)

Comme l'année dernière l'espèce niche très probablement de nouveau dans la carrière - un couple mixte (Goéland leucophée x Goéland argenté) le 01/05 (X.H.). Un couple de Goéland leucophée est suspecté en avril au même endroit mais pas retrouvé ensuite. Sinon l'espèce est observée de février à mai puis d'août à octobre. Ces observations ne concernent qu'un ou deux individus à chaque fois - excepté 3 individus le 16/05 plage de la Grande Conche (F.P.). L'espèce doit souvent passer inaperçue dans les grands groupes de laridés.

GOÉLAND PONTIQUE *Larus cachinnans* (14/7)**

Sept nouvelles observations de Goéland pontique cette année. Un premier oiseau de 3^{ème} année est découvert le 03/01 pointe de la Gournaise (M.-P. & X.H.). Ensuite, un second individu de 3^{ème} année est noté posé plage du Marais Salé le 14/02 et revu le 15/02 plage de la Grande Conche (M.-P., A. & X.H.). Un troisième individu de 2^{ème} année est observé le 16/02 pointe de la Gournaise et un quatrième oiseau de 2^{ème} année le 15/04 plage de la Tourette (M.-P. & X.H.). Enfin, deux nouveaux individus de 2^{ème} hiver sont trouvés les 10/12 plage du Cours du Moulin (V.A. & J.-M.G., M.-P.H.) et le 20/12

plage de Ker Châlon (V.A. & J.-M.G.). L'espèce semble de plus en plus régulière sur l'île. Ces données sont en cours d'examen par le comité d'homologation vendéen (CH85).



Photos © Valérie Auriaux

GOÉLAND MARIN *Larus marinus* (3187/284)

L'espèce est commune et nicheuse sur l'île où elle est observée toute l'année. Plus de 210 individus sont notés le 02/01 dans le port de plaisance (M.-P., A. & X.H.) et plus de 170 oiseaux hivernants sont dénombrés sur l'île le 19/01 lors du comptage Wetlands International (M.-P. & X.H.). Au printemps, 30 couples de Goéland marin ont été dénombrés sur la côte sauvage les 30 et 31/05 (M.-P. & X.H., S.D., J.-M.G., V. & I.A.), soit une augmentation de plus de 10% en deux ans. Les maxima sont notés à l'automne à Port-Joinville avec par exemple plus de 218 individus les 15/09 (P.D.V.) et 27/10 (M.-P., & X.H.). De très nombreux oiseaux bagués "couleur" ont été observés cette année (128 lectures concernant 45 individus différents). Il s'agit d'oiseaux bagués dans le cadre du programme PERISCOPE, sur la réserve naturelle nationale de Lilleau des Niges sur l'île de Ré en Charente-Maritime (J. Gernigon, comm. pers.), en Seine-Maritime, sur l'îlot du Ratier (G. Le Guillou, comm. pers.), sur l'archipel de Chausey dans la Manche (F. Gallien & S. Provost, comm. pers.) et sur l'île Looe (Cornouailles) en Angleterre (B. Taggart, comm. pers.).



Photo © Jean-Philippe Siblet

MOUETTE TRIDACTYLE *Rissa tridactyla* (928/44)

L'espèce est observée principalement de janvier à avril puis de septembre à décembre, excepté 1 individu de 2^{ème} année le 01/06 devant la pointe du But (M.-P. & X.H.). On note un petit passage en janvier avec plus de 105 individus comptés autour de l'île le 19/01 lors du comptage Wetlands International (M.-P. & X.H.). A l'automne, les premiers oiseaux sont notés seulement en octobre et le passage est très peu marqué - 11 individus au passage en 1h30 le 31/10 depuis la pointe du But (M.-P. & X.H.). Très peu d'oiseaux cet hiver autour de l'île - plus de 20 individus le 30/12 devant la pointe du But (M.-P. & X.H.).

STERNE NAINE *Sternula albifrons* (28/1)

Une seule nouvelle observation cette année pour cette sterne qui reste peu commune dans les eaux de l'île lors du passage postnuptial : 2 individus posés pointe du Cantin le 25/08 (J.-P.S.).

STERNE CAUGEK *Sterna sandvicensis* (3374/311)

L'espèce, commune sur l'île, peut y être observée toute l'année. Le passage prénuptial est peu marqué en avril avec par exemple 82 individus posés sur les bouées plage des Ovaires le 28/04 (B.I., L.Ch,

C.R. *et al.*). Pour la première fois, un nombre très important d'oiseaux est observé en juin - près de 1 000 individus sont comptés plage des Ovaires et pointe des Corbeaux le 22/06 (X.H.). Il s'agit d'oiseaux nicheurs sur la réserve naturelle nationale du banc d'Arguin à l'entrée du bassin d'Arcachon (Gironde) qui ont échoué cette année dans leur tentative de reproduction suite à une prédation très importante des œufs et poussins par les goélands. Ces oiseaux se sont dispersés vers le nord, ont stationné autour de l'île avant, pour une partie d'entre eux, de s'installer sur le polder de Sébastopol sur l'île de Noirmoutier. Le passage postnuptial a donc été un peu décalé et le maximum d'oiseaux a été noté le 27/08 avec plus de 500 individus posés plage de la Pulante (X.H.) et 125 individus pointe du But (X.H. & J.-P.S.). Enfin, l'espèce hiverne désormais en nombre tous les ans dans les eaux de l'île - par exemple plus de 78 individus dénombrés le long de la côte nord lors du comptage Wetlands International le 19/01 (M.-P. & X.H.).



Photo © Jean-Philippe Sibley

STERNE ÉLÉGANTE *Sterna elegans* (0/1)*

Enfin une observation de Sterne élégante sur l'île d'Yeu ! Bien que l'espèce se soit reproduite plusieurs fois sur le polder de Sébastopol à Noirmoutier (couple mixte avec une Sterne caugek), elle n'avait jamais été observée dans les eaux de l'île. C'est donc une belle surprise que la découverte d'un individu posé pointe des Corbeaux le 22/06 (X.H.) parmi des centaines de Sternes caugeks. Il s'agit d'un mâle adulte bagué sur le banc d'Arguin en 2007 (J. Gernigon, comm. pers.). Après l'échec de la reproduction sur Arguin, il a été vu au parc ornithologique du Teich (Gironde) le 04/06 puis sur le polder de Sébastopol à Noirmoutier le 19/06. Après sa brève escale sur l'île d'Yeu, il sera revu régulièrement sur le polder de Sébastopol à Noirmoutier où il tentera de se reproduire (D. Robard, comm. pers.). Cette donnée est en cours d'examen par le comité d'homologation national (CHN).

STERNE PIERREGARIN *Sterna hirundo* (487/29)

L'espèce est observée cette année aux deux passages. Le passage prénuptial a lieu en avril et mai avec par exemple 5 individus pointe des Corbeaux le 13/04 (M.-P. & X.H.). A noter plusieurs adultes

présents autour de l'île fin juin - 5 individus plage des Ovaires et 2 individus pointe des Corbeaux le 22/06 (X.H.). Il s'agit sans doute, comme pour la Sterne caugek, d'oiseaux ayant échoué dans leur reproduction. Le passage postnuptial est noté principalement en août - 26 individus (15 adultes et 11 1^{ère} année) pointe des Corbeaux le 22/08 (M.-P.H.) et 19 individus au passage en 1h35 devant la pointe du But le 29/08 (X.H. & J.-P.S.) et il se poursuit en septembre. Le dernier oiseau est observé à Port-Joinville le 01/10 (B.I. & M.F.).

STERNE ARCTIQUE *Sterna paradisaea* (95/4)

L'espèce est très peu observée cette année. Une seule donnée lors du passage prénuptial : 1 adulte tardif au passage le 08/06 devant la pointe du But (V.A. & J.-M.G.). Quelques oiseaux sont notés lors du passage postnuptial en septembre et octobre - 2 individus de 1^{ère} année depuis la pointe des Corbeaux le 29/09 (X.H.) et surtout 38 individus ensemble depuis la pointe du But le 01/10 (B.I. & M.F.).

GUIFETTE NOIRE *Chlidonias niger* (55/3)

Trois observations cette année, toutes lors du passage postnuptial : 2 individus au passage le 29/08 (J.-P.S. & X.H.) et 2 individus le 31/08 (X.H.) depuis la pointe du But puis 1 individu de 1^{ère} année (sombre mais la sous-espèce n'a pas pu être déterminée) le 19/10 au passage devant la pointe du But (X.H.). Aucune donnée au printemps.

GUILLEMOT DE TROÏL *Uria aalge* (622/47)

Le Guillemot de Troïl, qui se tient plus au large que le Pingouin torda, est noté cette année de janvier à mai puis en août et d'octobre à décembre. Le nombre d'individus est modeste avec le plus souvent moins d'une vingtaine d'individus. On note toutefois un net passage en avril avec plus de 70 individus posés au large de la pointe des Corbeaux le 13/04 (M.-P. & X.H.). À l'automne, le passage concerne surtout des alcidés sp. (Pingouin torda ou Guillemot de Troïl) et il est très marqué fin octobre-début novembre (cf. ci-dessous). En hiver, quelques rares oiseaux sont observés depuis la côte, par exemple 5 individus depuis le phare des Corbeaux le 30/12 (B.I.).

PINGOUIN TORDA *Alca torda* (1301/55)

Le Pingouin torda est bien présent dans les eaux de l'île de janvier à avril - derniers oiseaux le 28/04 au passage devant les pointes des Corbeaux et du But (M.-P.H., B.I. & L.Ch.) - puis de septembre - premier individu le 08/09 au passage devant la pointe du But (X.H.) - à décembre. À l'automne, le passage concerne surtout des alcidés sp. (Pingouin torda ou Guillemot de Troïl) et il est très marqué fin octobre-début novembre (cf. ci-dessous).

On note, cette année, un passage tout à fait remarquable d'alcidés (Pingouin torda/Guillemot de Troïl) fin octobre-début novembre avec par exemple plus de 1 500 individus (environ 60% de Pingouin torda et 40% de Guillemot de Troïl) en 1h30 le 01/11 devant la pointe du But (M.-P. & X.H.).

MACAREUX MOINE *Fratercula arctica* (53/1)**

Une seule donnée cette année mais d'un oiseau vivant ce qui est rare dans les eaux de l'île : 1 individu passe en vol près de la pointe des Corbeaux le 29/12 (X.H.). Cette donnée est en cours d'examen par le comité d'homologation vendéen (CH85).

PIGEON COLOMBIN *Columba oenas* (215/10)

L'espèce est observée cette année presque uniquement lors du passage postnuptial du 02/09 au 28/10. Ces observations concernent le plus souvent de 1 à 8 oiseaux, excepté 26 individus en migration active le 12/10 au dessus de la dune de la Grande Conche (A.Ch.). Moins classique, une observation au printemps avec 1 individu au-dessus de la dune de la Grande Conche le 17/04 (M.-P. & X.H., B.I.).

PIGEON RAMIER *Columba palumbus* (2315/227)

L'espèce est commune et nicheuse sur l'île où elle est observée toute l'année. Pas de passage noté à l'automne.

TOURTERELLE TURQUE *Streptopelia decaocto* (1773/176)

L'espèce est commune et nicheuse sur l'île principalement autour des zones urbanisées. Elle y est observée toute l'année. Pas de passage net ni au printemps, ni à l'automne. Le maximum d'oiseaux ensemble est noté le 31/12 à Ker Châlon avec 47 individus (B.I.).

TOURTERELLE DES BOIS *Streptopelia turtur* (656/73)

L'espèce, nicheuse de plus en plus rare sur l'île, est observée d'avril - premières le 17/04 en différents points de l'île (F.P.) - à octobre. Pas d'indice certain de nidification cette année. Le passage prénuptial, peu marqué, a lieu en avril et mai avec par exemple 70 individus en migration active en 50 minutes au-dessus de la dune de la Grande Conche et 69 individus en 20 minutes au-dessus du phare des Corbeaux le 16/05 (F.P.). Le passage postnuptial est quasi-inexistant avec seulement quelques oiseaux isolés en août, septembre et octobre - dernier individu impasse de la Borgne à Port-Joinville le 07/10 (V.A. & J.-M.G.).

COUCOU GRIS *Cuculus canorus* (861/65)

L'espèce, nicheuse sur l'île, est observée à partir de mars - premier individu chanteur le 22/03 dans la pinède devant la plage des Ovaires (S.D.) - jusqu'en juin - 1 individu dans les marais de la Guerche le 02/06 (M.-P. & X.H.). Le maximum de contacts auditifs et visuels a lieu à partir du 15 avril et en mai. Enfin, un oiseau de 1^{ère} année est observé posé sur les rochers, se nourrissant de chenilles le 27/07 (M.-P. & X.H.).

EFFRAIE DES CLOCHERS *Tyto alba* (154/6)

L'Effraie des clochers, nicheuse sur l'île, est notée en janvier, d'avril à juillet puis en décembre - par exemple 1 individu entendu chemin du Puits des Suisses le 16/04 (F.St.). Pas d'indice certain de nidification cette année après la destruction de son site de nidification près de l'école des pêches et même si l'espèce s'est probablement reproduite à la Citadelle - avec par exemple 1 individu entendu le 26/06 (R.Gi.).

PETIT-DUC SCOPS *Otus scops* (92/20)

Le Petit-duc scops fait désormais partie de l'avifaune nicheuse de l'île d'Yeu. Le premier chanteur est entendu dès le 30/03 aux Nates (M.-P. & X.H.), date la plus précoce de la base. Au moins un couple s'est très probablement reproduit de nouveau cette année à Chiron Bureau - 2 individus le 17/04 (M.-P. & X.H., F.P., V.A. & J.-M.G.). Un second couple s'est sans doute aussi reproduit près des Nates. Un petit passage prénuptial est noté cette année fin mai avec 8 individus chanteurs entre Chiron Bureau, les Nates et les marais de la Croix le 29/05 (M.-P. & X.H.). L'espèce est revue régulièrement jusqu'en septembre - dernier oiseau entendu le 14/09 aux Nates (R.Gi.). Les données de cette espèce sur l'île d'Yeu ne sont plus soumises à homologation par le comité d'homologation vendéen (CH85). Il est très probable que l'espèce progresse dans les années à venir mais le facteur limitant peut être le manque de sites de nidification favorables. Trois nichoirs ont été installés en 2016, sans succès pour l'instant.

HIBOU MOYEN-DUC *Asio otus* (96/2)

Très peu d'observations cette année. Le Hibou moyen-duc se reproduit toujours sur l'île comme en témoignent les observations de deux jeunes le 11/07 près du vallon des Soux (D.Bi.) et d'un autre le 10/08 derrière la dépression de la dune de la Grande Conche (F.L.).

HIBOU DES MARAIS *Asio flammeus* (43/1)

L'espèce, peu commune sur l'île, est observée classiquement lors du passage postnuptial : 1 individu en vol pointe de la Gournaise le 30/10 (M.-P.H.).

MARTINET NOIR *Apus apus* (1196/123)

L'espèce, nicheuse sur l'île, est observée du 17/04 - 1 individu au-dessus des marais de la Croix (F.P.) - au 03/09 - 1 individu au-dessus des marais de la Guerche (O.Pe.). Le principal site de reproduction (le bâtiment municipal près de l'école des pêches) a été détruit sans qu'aucune mesure de compensation (pose de nids artificiels par exemple) n'ait été mise en œuvre alors qu'il s'agit d'une

espèce protégée. Les oiseaux ont été très perturbés par cette absence de leur lieu de reproduction et l'impossibilité de se reporter ailleurs. La reproduction a probablement été très mauvaise cette année. Les observations deviennent plus rares à partir de mi-juillet. Pas de passage marqué au printemps et à l'automne.

MARTIN-PÊCHEUR D'EUROPE *Alcedo atthis* (924/85)

Le Martin-pêcheur d'Europe est observé cette année en janvier et février puis d'août à décembre. Pas d'observation au printemps. L'espèce est notée à partir du 24/08 avec un premier oiseau plage des Bossilles/de la Borgne (M.-P. & X.H.). La très grande majorité des observations est réalisée sur la côte nord de l'île et dans les marais. Les observations sur la côte sauvage sont beaucoup plus rares - 1 individu devant les Tchinettes le 18/09 (S.D.). Pas d'indice de reproduction.

GUÊPIER D'EUROPE *Merops apiaster* (8/4)

Quatre nouvelles données pour cette espèce qui reste rare sur l'île : 1 individu est aperçu en vol au-dessus du Grand Phare puis retrouvé posé près de Chiron Moreau le 20/04 (V.A. & J.-M.G., C.La.), 1 individu est entendu au Nates le 23/04 et 1 autre le 23/05 (R.Gi.) puis 4 individus sont observés posés chemin du Poiry le 09/05 (C.La.).

Il s'agit donc seulement des 9 à 12^{ème} mentions de l'espèce sur l'île après celle, rapportée par N. Mayaud (1944), de 4 individus le 12/06/1886 se tenant sur les rochers du bord de mer et qui ont tous été tués, celle d'une vingtaine d'individus le 29/08/2001 au-dessus du centre équestre des Violettes (A. Sourmia), d'un mâle posé près du Caillou Blanc le 13/06/2002 (F. Portier), d'au moins 8 individus en migration active au centre de l'île le 06/05/2004 (M.-P. Hindermeyer), d'un individu seulement entendu au-dessus de la mare du But le 04/07/2015 (E. Ouvrard), d'un individu posé les 20 et 21/05/2016 près du marais Mottou (V. Guilloteau, R. & A. Girod fide S. Desmarest) et d'un individu au Nates le 10/05/2018 (A. et R. Girod).



Photo © Christine Lavergne

HUPPE FASCIÉE *Upupa epops* (148/30)

L'espèce est observée cette année aux deux passages. Au printemps, le premier oiseau est noté le 21/03 aux Martinières (R.Gi.) et le dernier le 14/05 au Chiron Moreau (V.A. & J.-M.G.). Pas de preuve certaine de reproduction sur l'île cette année même s'il n'est pas impossible que la nidification d'un couple passe complètement inaperçu. A l'automne, quelques oiseaux sont observés en août et septembre - 1 individu posé derrière la plage du But le 15/09 (X.H., B.I., V.A. & J.-M.G.). Plus rare deux observations sont faites en fin d'automne - 1 individu posé à la Citadelle le 19/11 (F.J.) - et en hiver - 1 individu le 10/12 près de station d'épuration (D.S.). Cette dernière observation est à mettre en lien avec l'hivernage d'un ou plusieurs oiseaux en Vendée cette année.



Photo © Jean-Marc Guilpain

TORCOL FOURMILIER *Jynx torquilla* (101/7)

Le Torcol fourmilier est observé cette année en petit nombre aux deux passages. Au printemps, un seul individu est découvert près de la pointe du But le 15/04 (V.A. & J.-M.G.). A l'automne, les observations s'étalent du 24/08 - 1 individu à Ker Bossy (M.-P. & X.H.) - au 10/09 - 2 individus dans les marais de la Croix (F.P.). Il ne s'agit à chaque fois que d'un ou deux individus.

PIC ÉPEICHE *Dendrocopos major* (67/12)

Beaucoup d'observations cette année en février, avril puis en septembre et octobre. L'essentiel des observations a lieu à l'automne et correspond très probablement à des oiseaux venus du continent - par exemple 1 individu de 1^{ère} année dans les marais de la Guerche le 04/09 (O.Pe.) et 1 individu le 11/10 près de la Bergerie (O.Pe.). Toujours pas de preuve formelle de reproduction. Le Pic épeiche est aujourd'hui beaucoup plus régulier sur l'île.

ALOUETTE CALANDRELLE *Calandrella brachydactyla* (45/8)**

L'espèce n'est observée cette année que lors du passage postnuptial : un individu est découvert posé dans les laisses de mer de la plage de la Pulante le 28/10 (M.-P. & X.H.). Il y sera revu tous les jours jusqu'au 01/11 (M.-P. & X.H., A.L.G., J.D.L.). Ces données sont en cours d'examen par le comité d'homologation vendéen (CH85).





Photos © Jérôme de Linares

ALOUETTE LULU *Lullula arborea* (78/3)

L'espèce est très peu notée sur l'île cette année. Lors du passage prénuptial, 1 individu est observé à Ker Bossy le 24/02 et 1 individu tardif à Ker Gigou le 20/04 (V.A. & J.-M.G.). Le passage postnuptial est presque inexistant avec seulement 1 individu dune de la Grande Conche le 21/10 (V.A. & J.-M.G.).



Photo © Valérie Auriaux

ALOUETTE DES CHAMPS *Alauda arvensis* (1368/71)

L'espèce ne niche plus sur l'île depuis plusieurs années. Elle y est observée aux deux passages, principalement en février-mars et en octobre. Les passages sont, de nouveau, très peu marqués cette année au printemps et à l'automne avec seulement 16 individus près de la carrière le 25/02 (J.-M.G.), et plus de 25 individus sur la dune de la Grande Conche le 29 et 30/10 (A.L.G., M.-P. & X.H.). Quelques oiseaux sont présents en hiver avec par exemple 2 individus le 03/01 à la Bergerie et 4 individus le 29/12 pointe de la Père (M.-P. & X.H.).

HIRONDELLE DE RIVAGE *Riparia riparia* (404/46)

L'espèce est notée en petit nombre aux deux passages. Le passage prénuptial débute en mars - deux premiers oiseaux le 24/03 pointe de Gilberge (V.A. & J.-M.G.) - et se poursuit en mai. Il s'agit à chaque fois de moins de 10 individus - maximum seulement 9 individus en migration active au-dessus de la dune de la Grande Conche le 13/04 (M.-P. & X.H.). Le passage postnuptial, peu marqué, débute le 27/08 avec 1 individu au Moulin du Calvaire et à la Bergerie (X.H. & J.-P.S.) et se poursuit jusqu'en septembre - deux derniers individus plage de Ker Châlon le 29/09 (J.G. & L.Ch.).

HIRONDELLE RUSTIQUE *Hirundo rustica* (3739/519)

L'espèce est commune et nicheuse sur l'île. Elle y est observée aux deux passages. Le passage prénuptial débute en mars - deux premières le 22/03 à Ker Bossy (R.Gi.) - et se poursuit en avril et mai - plus de 50 individus dans les marais de la Guerche le 11/05 (M.-P.H.). Le passage postnuptial débute en juillet et se poursuit jusqu'en octobre - par exemple plus de 50 individus au passage au-dessus du phare des Corbeaux le 10/08 (F.L.) et 146 individus comptés au-dessus de la Pierre à Monsieur le 16/09 (X.H.). Le dernier oiseau est noté le 28/10 au-dessus de l'anse des Fontaines (V.A. & J.-M.G.).



Photo © Jean-Marc Guilpain

HIRONDELLE DE FENÊTRE *Delichon urbicum* (518/99)

L'espèce est observée aux deux passages. Le passage prénuptial est noté en avril et mai - deux premiers oiseaux le 09/04 au Marais Salé (V.A. & J.-M.G.). Il est surtout marqué en mai avec par exemple 50 individus ensemble le 15/05 dans les marais de la Guerche et plus de 16 individus en migration active en 50 minutes au-dessus de la dune de la Grande Conche le 16/05 (F.P.). La

reproduction avait été suspectée l'année dernière mais sans preuve formelle. Cette année deux sites de nidification sont découverts : le premier sur une maison près de la Galiote (avec au minimum 2 nids, peut-être 3) et le second sur le phare de la pointe des Corbeaux (avec 1 nid construit et occupé et 1 nid qui sera détruit). C'est une très bonne nouvelle, la reproduction n'avait pas été mise en évidence depuis 2010. Le passage postnuptial, peu marqué, débute en août, se poursuit en septembre - plus de 15 individus à la Bergerie le 08/09 (V.A. & J.-M.G.) - et s'achève en octobre - 2 derniers oiseaux à la Bergerie le 20/10 (X.H.).

PIPIT DE RICHARD *Anthus richardi* (10/2)**

Nouvelles observations de Pipit de Richard sur l'île à l'automne : 1 individu en vol à basse altitude au-dessus de la dune de la Grande Conche le 03/10 (P.D.) et 1 individu en vol au-dessus des jardins de Port-Joinville le 04/10 (B.I.). Les deux individus ont crié. L'espèce est donc sans doute beaucoup plus régulière aux deux passages que ne le laissent supposer les quelques observations réalisées sur l'île. Ces données sont en cours d'examen par le comité d'homologation vendéen (CH85).

PIPIT ROUSSELIN *Anthus campestris* (141/5)

Le Pipit rousselin n'est observé cette année que lors du passage postnuptial du 27/08 - 1 individu pointe du Châtelet (X.H. & J.-P.S.) - au 28/09 - 1 individu pointe de la Pèrre (V.A. & J.-M.G.). Toutes les observations ne concernent qu'un individu à chaque fois.

PIPIT DES ARBRES *Anthus trivialis* (520/76)

L'espèce est observée cette année aux deux passages. Le passage prénuptial s'étale du 12/04 avec 1 individu à Chiron Moreau (V.A. & J.-M.G.) - au 17/05 - 1 individu dans la dépression de la dune de la Grande Conche et 1 individu près du phare des Corbeaux (F.P.). Le passage postnuptial débute le 24/08 avec plus de 2 individus dans les prairies de Perdrette et 4 individus au-dessus de la dune de la Grande Conche (M.-P., A. & X.H.) et se poursuit en septembre et octobre - dernier oiseau le 28/10 au-dessus des jardins des Bossilles (A.L.G.). Il s'agit souvent d'oiseaux en vol en migration active mais également d'oiseaux posés. Les maxima sont notés lors du passage postnuptial avec par exemple 12 individus (3 posés et 9 en migration active) dune de la Grande Conche le 14/09 (X.H.).

PIPIT FARLOUSE *Anthus pratensis* (5161/641)

L'espèce est commune et nicheuse sur l'île. Elle y est observée toute l'année, y compris en hiver. Pas de décompte précis des oiseaux nicheurs mais l'espèce est à surveiller dans les années qui viennent, même si elle semble encore bien présente sur l'île. En effet, elle est désormais classée comme vulnérable dans la dernière liste rouge des espèces menacées en France (UICN France, MNHN, LPO, SEOF & ONCFS, 2011) et en danger de disparition dans la liste rouge des oiseaux nicheurs des Pays de la Loire (Marchadour *et al.*, 2014). Comme tous les ans, un passage est noté à l'automne avec par exemple plus de 300 individus comptés en migration active au-dessus de la dune de la Grande Conche le 21/10 (V.A. & J.-M.G.).



Photo © François Halligon

PIPIT À GORGE ROUSSE *Anthus cervinus* (14/1)**

Nouvelle observation de cette espèce rare sur l'île avec 1 individu en brève halte migratoire près de la pointe des Corbeaux le 21/10 (V.A. & J.-M.G.). Cette donnée est en cours d'examen par le comité d'homologation vendéen (CH85).

PIPIT SPIONCELLE *Anthus spinoletta* (11/1)

L'espèce est rare sur l'île. Elle y est observée cette année lors du passage postnuptial avec 1 individu posé près de la Bergerie le 20/10 (X.H.).

PIPIT MARITIME *Anthus petrosus* (1809/217)

L'espèce est nicheuse sur l'île et y est observée toute l'année. Pas de comptage des couples nicheurs sur la côte sauvage. L'espèce est à surveiller dans les années qui viennent puisqu'elle est désormais classée comme vulnérable dans la liste rouge des oiseaux nicheurs des Pays de la Loire (Marchadour *et al.*, 2014). L'augmentation du nombre d'oiseaux à l'automne et en hiver - plus de 25 individus sur les plages de la côte nord-ouest (de la plage des Broches à la plage des Bossilles/de la Borgne) le 18/02 (M.-P. & X.H.), correspond très certainement à des oiseaux plus nordiques.



Photo © Jean-Marc Guilpain

BERGERONNETTE PRINTANIÈRE *Motacilla flava* (848/116)**BERGERONNETTE PRINTANIÈRE NORDIQUE *Motacilla flava thunbergi* (6/3)******BERGERONNETTE PRINTANIÈRE D'ITALIE *Motacilla flava cinereocapilla* (0/4)****

L'espèce est observée aux deux passages. Le passage prénuptial, peu marqué, a lieu en avril, mai et juin - maximum 12 individus sur la dune de la Grande Conche le 18/04 (M.-P. & X.H.). Le passage postnuptial s'étale du 24/08 - 2 individus dans les prairies de Perdrette (M.-P. & X.H.) - au 26/10 - 1 individu près de la Pierre des Amporelles (V. A. & J.-M.G.). Les maxima sont notés en septembre avec par exemple 15 individus au-dessus du vallon du Jars le 11/09 (V. A. & J.-M.G.) et 19 individus sur la dune de la Grande Conche le 14/09 (X.H.).

La sous-espèce *Motacilla flava flavissima* (flavéole) est également notée aux deux passages mais avec des effectifs très faibles cette année - maximum 3 individus posés le 29/08 plage des Bossilles/de la Borgne (X.H.).

La sous-espèce *Motacilla flava thunbergi* (nordique) est observée de nouveau cette année : 1 individu posé sur la dune de la Grande Conche le 15/05 (F.P.), 4 individus (dont 2 mâles) dans les prairies de Perdrette le 01/06 (M.-P. & X.H.) et 1 mâle adulte à la Bergerie le 02/10 (F.P.). Ces données sont en cours d'examen par le comité d'homologation vendéen (CH85).

À noter cette année, l'observation de plusieurs individus (un mâle à chaque fois) de la sous-espèce *Motacilla flava cinereocapilla* (d'Italie) : 1 premier individu le 08/04 autour de la mare des Broches (V.A. & J.-M.G., D.S.), 1 individu les 14 et 15/04 sur la dune de la Grande Conche (M.-P. & X.H.) et 1 individu le 15/05 toujours sur la dune de la Grande Conche (F.P.). Il s'agit des premières mentions de cette sous-espèce sur l'île. Ces données sont également en cours d'examen par le comité d'homologation vendéen (CH85).



Photos © Frédéric Portier



Photo © Didier Simon

BERGERONNETTE DES RUISSEAUX *Motacilla cinerea* (436/25)

L'espèce est notée principalement lors du passage d'automne (du 02/09 au 05/11). Toutes les observations ne concernent qu'un ou deux individus. Les quelques observations réalisées en hiver - par exemple 1 individu le 03/01 plage des Illiaux et 1 individu le 10/12 à Ker Châlon (M.-P. & X.H.) - indiquent que l'espèce hiverne sur l'île.

BERGERONNETTE GRISE *Motacilla alba* (3525/346)

La sous-espèce type *Motacilla alba alba* est commune et nicheuse sur l'île, notamment à Port-Joinville, Ker Châlon et à la carrière. Elle y est observée toute l'année. Un petit passage prénuptial est noté en mars avec par exemple 21 individus plage des Bossilles/de la Borgne le 08/03 (V. A. & J.-M.G.). Le passage postnuptial est perceptible dès le mois de septembre et se poursuit jusqu'en novembre. Il est peu marqué cette année avec par exemple 25 individus le 11/09 plage de la Tourette (F.P.) et plus de 21 individus le 21/10 sur la dune de la Grande Conche (V. A. & J.-M.G.). Quelques individus ont hiverné de nouveau cette année sur les plages de la côte nord de l'île - par exemple 1 individu plage de la Pulante le 01/01 et 2 individus le 31/12 plage de la Tourette (M.-P. & X.H.).

La sous-espèce *Motacilla alba yarrellii*, migratrice et hivernante, est observée jusqu'au 01/05 - une femelle tardive à la carrière (X.H.) - et à partir du 08/10 avec 1 premier individu plage de la Tourette (O.Pe.). Pas de passage marqué cet automne avec par exemple seulement 7 individus plage du Cours du Moulin et plus de 5 individus plage des Bossilles/de la Borgne le 27/10 (M.-P. & X.H.).

TROGLODYTE MIGNON *Troglodytes troglodytes* (2552/218)

L'espèce est commune et nicheuse sur l'île où elle se porte bien. Elle y est observée toute l'année.

ACCENTEUR MOUCHET *Prunella modularis* (2768/252)

L'espèce est commune et nicheuse sur l'île. Elle y est observée toute l'année. On note une augmentation nette du nombre d'oiseaux à l'automne.

ROUGEGORGE FAMILIER *Erithacus rubecula* (4128/653)

L'espèce est commune et nicheuse sur l'île. Elle y est observée toute l'année. On note toutefois une augmentation très nette du nombre d'oiseaux à l'automne avec par exemple un chiffre tout à fait exceptionnel de plus de 100 individus près du phare des Corbeaux le 21/10 (V.A. & J.-M.G.).



Photo © Jean-Marc Guilpain

ROSSIGNOL PHILOMÈLE *Luscinia megarhynchos* (48/10)

L'espèce, peu commune sur l'île, est observée cette année aux deux passages. Au printemps, plusieurs chanteurs sont notés du 18/04 au 17/05 - par exemple 1 individu le 18/04 à la Croix (F.St.). Le passage postnuptial est noté du 26/08 - 3 individus dans la dépression de la dune de la Grande Conche (X.H., J.-P. & C.S.) - au 24/09 - 1 individu à Ker Bossy (V.A. & J.-M.G.). Pas d'indice de reproduction.



Photo © Jean-Marc Guilpain

ROUGEQUEUE NOIR *Phoenicurus ochruros* (1894/198)

L'espèce est commune sur l'île où elle peut être observée presque toute l'année. Le passage prénuptial, très peu marqué, a lieu en mars - 5 individus plage du Marais Salé le 16/03 (V.A. & J.-M.G.) et 6 individus au Marais Salé le 30/03 (M.-P.H.). Une seule preuve de reproduction certaine cette année avec 1 poussin le 22/06 près de la pointe du But (X.H.) même si l'espèce s'est très probablement également reproduite à Port-Joinville. Le passage postnuptial, plus marqué, est noté en octobre avec par exemple plus de 100 individus (sans doute beaucoup plus) en différents points de l'île le 22/10, 26 individus autour de la Bergerie et plus de 20 individus dans les rochers près du phare des Corbeaux le 24/10 (V.A. & J.-M.G.). Quelques oiseaux hivernent sur l'île - par exemple 1 individu plage de la Tourette, 1 individu plage du Marais Salé et 2 individus plage des Iliaux le 30/12 (M.-P., A. & X.H.).



Photos © Jean-Marc Guilpain

ROUGEQUEUE Á FRONT BLANC *Phoenicurus phoenicurus* (434/69)

L'espèce est beaucoup observée cette année aux deux passages. Le passage prénuptial débute le 14/04 avec un mâle sur la dune de la Grande Conche (M.-P. & X.H.) et un autre à la Bergerie (V.A. & J.-

M.G.) - et se poursuit jusqu'au 01/05 avec 1 individu à la Bergerie (X.H. & J.-M.G.). On compte au maximum 11 individus (5 mâles et 6 femelles) le 19/04 en différents points de l'île (M.-P. & X.H.). Le passage postnuptial s'étale du 23/08 avec 1 mâle à Ker Bossy (M.-P.H.) et s'achève le 30/10 avec 1 individu tardif entre la Croix et les Tchinettes (M.-P. & X.H.). Le maximum est noté le 15/09 avec un minimum de 19 individus en différents points de l'île (X.H. & B.I.).



Photos © Jean-Marc Guilpain

TARIER DES PRÉS *Saxicola rubetra* (1408/158)

L'espèce est observée cette année aux deux passages. Le passage prénuptial s'étale du 15/04 au 01/06 - 4 individus tardifs dans les marais de la Guerche (M.-P. & X.H.) - avec au maximum 25 individus le 18/04 dans les marais de la Guerche, les prairies de Perdrette et de Ker Bossy (M.-P. & X.H.). Le passage postnuptial débute le 22/08 avec 2 individus dans les marais de la Guerche (M.-P.H.) et s'achève en octobre - dernier oiseau le 29/10 plage de la Tourette (J.D.L.). Les maxima sont notés en septembre avec plus de 54 individus comptés sur l'île le 15/09 (X.H. & B.I.).



Photo © Didier Simon

TARIER PÂTRE *Saxicola rubicola* (2091/192)

L'espèce est assez commune sur l'île où elle est observée presque toute l'année. Un indice de nidification certaine cette année avec 2 adultes et 2 poussins le 13/05 près de la Pierre à Monsieur (M.-P.H.). L'espèce s'est aussi très probablement reproduite près de la carrière avec au moins 2 juvéniles le 27/07 (M.-P. & X.H.). Les maxima sont classiquement notés lors du passage postnuptial (en octobre) avec par exemple plus de 15 individus près du phare des Corbeaux le 21/10 (V.A. & J.-M.G.).

TRAQUET MOTTEUX *Oenanthe oenanthe* (4495/564)

L'espèce est commune et nicheuse en petit nombre sur l'île. Elle y est observée du mois de mars - trois premiers oiseaux (2 mâles et 1 femelle) le 09/03 près du Vieux Château (L.D.) - au mois de novembre - derniers oiseaux le 06/11 près du Vieux Château (M.Do.) et plage du Cours du Moulin (V.A. & J.-M.G.). Le passage prénuptial est surtout noté en avril avec par exemple plus de 200 individus comptés sur l'île le 17/04 (F.P., B.I., M.-P. & X.H.). La petite population reproductrice insulaire étant la dernière de la région Pays de la Loire (Hindermeyer & Hindermeyer, 2014a), l'espèce est classée "en danger critique" dans la liste rouge des oiseaux nicheurs des Pays de la Loire (Marchadour *et al.*, 2014). Elle fait donc l'objet d'un suivi attentif en période de reproduction. Ainsi, au moins 12-14 couples nicheurs ont été dénombrés cette année sur la côte sauvage, même si le décompte exact n'est pas simple. En effet, certains couples semblent faire une seconde ponte (ou bien

s'agit-il d'une ponte de remplacement) comme en témoignent, une nouvelle fois, le poussin encore en duvet observé le 25/08 près de la Pierre à Monsieur (M.-P. & X.H., J.-P. & C.S.). Le nombre de couples nicheurs semble donc stabilisé (ou peut-être en très légère augmentation) à un niveau très bas. Le passage postnuptial est peu marqué cette année encore avec par exemple plus de 50 individus ensemble sur la seule dune de la Grande Conche le 08/09 (X.H.).



Photo © Olivier Penard

MERLE À PLASTRON *Turdus torquatus* (248/28)

Le Merle à plastron est observé cette année aux deux passages. Au printemps, les observations ont toutes lieu en avril avec par exemple 5 individus (mâles) le 14/04 posés dans le vallon de l'aérodrome (M.-P. & X.H.) et 3 individus pointe du But et 1 individu pointe du Châtelet le 17/4 (F.P.). Le passage postnuptial, peu marqué, a lieu en octobre et début novembre - maximum plus de 4 individus pointe de la Père, 2 individus dans le vallon des Sabias (M.-P. & X.H.), 2 individus près de la Pierre Tremblante (V.A. & J.-M.G.) et 1 individu de 1^{ère} année sur l'aérodrome (A.L.G.) le 28/10.



Photo © Jean-Marc Guilpain

MERLE NOIR *Turdus merula* (2925/440)

L'espèce est très commune et nicheuse sur l'île. Elle y est observée toute l'année.

GRIVE LITORNE *Turdus pilaris* (327/26)

L'espèce est notée cette année en mars et avril puis d'octobre à décembre. Un petit passage est noté au printemps avec par exemple 5 individus dans les marais de la Guerche le 30/03 (V.A. & J.-M.G., M.-P.H.). Le passage postnuptial, très marqué, est surtout perceptible fin octobre avec par exemple plus de 130 individus dans les marais de la Guerche le 22/10 (S.D.) et plus de 250 individus au Marais Salé le 24/10 (V.A. & J.-M.G.). Enfin, quelques individus sont présents en hiver avec notamment 2 individus pointe des Corbeaux et 1 individu dans les marais de la Guerche le 11/12 (M.-P.H.).



Photo © Jean-Marc Guilpain



Photo © Valérie Auriaux

GRIVE MUSICIENNE *Turdus philomelos* (2595/196)

L'espèce est commune et nicheuse sur l'île. Elle y est observée presque toute l'année (un peu moins de données en hiver). Pas de passage noté au printemps. Le passage postnuptial est surtout perceptible en octobre - plus de 300 individus au-dessus de la dune de la Grande Conche le 21/10 (V.A. & J.-M.G.).

GRIVE MAUVIS *Turdus iliacus* (625/24)

L'espèce est notée cette année de janvier à mars - plus de 15 individus le 16/03 dans la pinède face à la plage de la Petite Conche (V.A. & J.-M.G.) - puis d'octobre à décembre. Le passage postnuptial est très peu marqué cette année avec seulement quelques dizaines d'oiseaux - par exemple 30 individus le 06/11 près du phare des Corbeaux (V.A. & J.-M.G.).

GRIVE DRAINE *Turdus viscivorus* (227/7)

L'espèce, nicheuse rare sur l'île, est principalement observée lors du passage postnuptial. Pas d'indice certain de nidification cette année. À l'automne les observations, rares cette année, sont toutes effectuées en septembre et octobre avec par exemple 2 individus près du terrain d'aéromodélisme le 26/10 (V.A. & J.-M.G.).

BOUSCARLE DE CETTI *Cettia cetti* (3601/450)

La Bouscarle de Cetti est un des oiseaux les plus typiques de l'avifaune islaire aussi bien en milieu humide qu'en milieu plus sec. Elle peut y être observée toute l'année (moins de données en hiver).

CISTICOLE DES JONCS *Cisticola juncidis* (24/1)

L'espèce, qui n'est plus présente depuis l'hiver 1985, n'a pas encore réussi à recoloniser l'île. Après une année blanche, la Cisticole des joncs est de nouveau notée cette année à l'automne : 1 individu sur la dune de la Grande Conche le 02/10 (F.P.).

PHRAGMITE DES JONCS *Acrocephalus schoenobaenus* (97/9)

L'espèce est observée cette année aux deux passages. Au printemps, quelques oiseaux sont notés du 15/04 - 1 individu près de la planche à Puare (V.A. & J.-M.G.) - au 24/05 - 1 individu dans les marais de la Guerche (F.V. & L.D.). Le passage postnuptial est peu marqué avec quelques oiseaux également du 22/08 - 1 individu dans les marais de la Guerche (M.-P.H.) - au 11/09 - 1 individu dans la dépression de la dune de la Grande Conche (F.P.).

ROUSSEROLLE EFFARVATTE *Acrocephalus scirpaceus* (331/30)

L'espèce est observée sur l'île d'avril - première le 12/04 dans les marais de la Croix (F.P.) - à début octobre - dernière le 03/10 dans le vallon du Jars (B.I., V.A. & J.-M.G.). Comme tous les ans, quelques oiseaux se sont reproduits dans les marais de la Croix (au moins 3 couples) et, pour la première fois, des oiseaux sont également observés dans les marais de la Guerche - par exemple 1 chanteur le 25/05 (F.St.). Les premiers migrateurs postnuptiaux sont notés à partir du 24/08 avec 1 individu à Ker Bossy (M.-P. & X.H.) et peuvent, à cette période, être observés presque n'importe où.

HYPOLAÏS POLYGLOTTE *Hippolais polyglotta* (42/4)

Après une année blanche, l'espèce est de nouveau observée sur l'île mais uniquement lors du passage postnuptial : 1 individu précoce le 24/07 dans les marais de la Guerche (M.-P.H.) puis 1 individu le 30/08 sur la dune de la Grande Conche (X.H. & J.-P.S.) et 2 individus le 11/09, le premier au Marais Salé (M.-P.H.) et le second dans le vallon de l'anse du Jars (V.A. & J.-M.G.).

FAUVETTE À TÊTE NOIRE *Sylvia atricapilla* (2865/316)

L'espèce est commune et nicheuse sur l'île. Elle y est observée toute l'année (peu de données toutefois en hiver). Le nombre de couples nicheurs est très difficile à estimer mais l'île doit sans doute en accueillir plusieurs centaines. Petit passage noté en septembre et octobre avec par exemple 10 individus dans les prairies de Perdette le 12/09 (M.-P.H.) et 9 individus dans la dépression de la dune de la Grande Conche le 21/10 (V.A. & J.-M.G.).

FAUVETTE DES JARDINS *Sylvia borin* (350/26)

L'espèce est nicheuse assez peu commune sur l'île. Le premier oiseau est observé le 14/04 à Ker Bossy (M.-P. & X.H.). Le passage postnuptial est noté du 28/08 avec 1 individu dans les marais de la Guerche (J.-P.S. & X.H.) au 08/10 avec 1 individu aux Nates (F.P.).

FAUVETTE GRISETTE *Sylvia communis* (1508/219)

L'espèce est commune et nicheuse sur l'île. Le nombre de couples nicheurs est très difficile à estimer mais semble en légère diminution (tendance qui reste à confirmer dans les années qui viennent). Les premiers oiseaux sont notés le 11/04 sur la côte sauvage entre la Croix et les Tchinettes et près des Pierres jumelles du Château (F.P.). Les maxima sont notés fin août-début septembre avec par exemple plus de 15 individus le 26/08 entre la dépression de la dune de la Grande Conche et la décharge (X.H., J.-P. & C.S.). Le dernier individu est vu le 08/10 aux Nates (F.P.).



Photo © Didier Simon

FAUVETTE PITCHOU *Sylvia undata* (1057/118)

L'espèce est assez commune et nicheuse sur l'île. Elle y est observée presque toute l'année (moins de données en hiver). Pas de décompte de mâles chanteurs réalisé cette année mais l'île accueille toujours environ une centaine de couples nicheurs, ce qui constitue la quasi-totalité de la population vendéenne (Hindermeyer & Hindermeyer, 2014b). Ceci confirme donc la responsabilité très importante de l'île d'Yeu pour la conservation de l'espèce qui est classée "vulnérable" dans la liste rouge régionale (Marchadour *et al.*, 2014).



Photo © Jean-Marc Guilpain

POUILLOT VERDÂTRE *Phylloscopus trochiloides* (0/1)*

Décidemment cet automne nous aura réservé de très belles surprises. C'est le cas de ce Pouillot verdâtre découvert le 08/10 près du camping (O.Pe.). Repéré au cri (typique) dans un jardin, l'oiseau, très furtif, est ensuite observé rapidement à découvert avant de disparaître. Il s'agit de la première mention de l'espèce pour l'île mais aussi pour la Vendée. Cette donnée est en cours d'examen par le comité d'homologation national (CHN).

POUILLOT À GRANDS SOURCILS *Phylloscopus inornatus* (299/11)

Très peu de données et d'oiseaux cette année pour cette espèce sibérienne désormais très régulière à l'automne. En effet, au mieux 6 individus différents seulement sont observés du 04 au 28/10. Le premier oiseau est découvert le 04/10 dans la dépression de la dune de la Grande Conche (M.-P.H.) et le dernier le 28/10 dans un jardin près de Ker Viroux (A.L.G.). Il ne s'agit à chaque fois que d'un seul individu, exceptés 2 oiseaux dans la dépression de la dune de la Grande Conche le 07/10 (F.P.). L'espèce n'est plus soumise à homologation sur l'île d'Yeu depuis le 1^{er} janvier 2018.



Photo © Olivier Penard

POUILLOT VÉLOCE *Phylloscopus collybita* (4714/451)

L'espèce est commune et nicheuse sur l'île. Elle y est observée toute l'année (moins de données en hiver). Pas de net passage au printemps. Le passage postnuptial est noté à partir de fin août mais est surtout net en octobre avec par exemple déjà plus de 70 individus uniquement autour du phare des Corbeaux le 24/10 (V.A. & J.-M.G.).

Enfin, un individu présentant les caractères de la sous-espèce sibérienne *Phylloscopus collybita tristis* a été observé le 24/10 près du phare des Corbeaux (V.A. & J.-M.G.). Un autre oiseau a été classé dans la catégorie Pouillot de type sibérien : 1 individu observé le 29/10 à Saint-Sauveur (A.L.G.).



Photo © Jean-Marc Guilpain

POUILLOT FITIS *Phylloscopus trochilus* (1650/210)

L'espèce est classiquement observée aux deux passages. Le passage prénuptial s'étale du 24/03 - 2 premiers individus dans les marais de la Guerche (V.A. & J.-M.G.) - au 01/06 avec un individu tardif chantant dans les marais de la Guerche (M.-P. & X.H.). Le passage postnuptial débute le 22/08 avec 2 individus dans les marais de la Guerche (M.-P.H.) et se poursuit jusqu'au 20/10 avec encore 1 individu dans la dépression de la dune de la Grande Conche (X.H.). Les maxima sont notés fin août avec par exemple plus de 54 individus en différents points de l'île le 24/08 (M.-P. & X.H.).



Photo © Olivier Penard

ROITELET HUPPÉ *Regulus regulus* (441/29)

L'espèce est observée cette année en janvier puis du 23/10 au 27/12. Le passage postnuptial est surtout perceptible en octobre, avec par exemple plus de 30 individus près du phare des Corbeaux le 23/10 (V.A. & J.-M.G.), mais des oiseaux sont régulièrement notés jusqu'à la fin de l'année avec par exemple 1 individu dans le vallon du Jars le 18/12 (V.A. & J.-M.G.). Aucun indice de reproduction n'est rapporté cette année.

ROITELET À TRIPLE BANDEAU *Regulus ignicapilla* (2646/186)

L'espèce est commune et nicheuse sur l'île. Elle y est observée toute l'année (moins de données en hiver). Pas de passage très net, ni au printemps, ni à l'automne.

GOBEMOUCHE GRIS *Muscicapa striata* (499/73)

L'espèce est observée cette année aux deux passages. Le passage prénuptial, peu marqué, débute le 23/04 avec 1 individu à Ker Châlon (M. & R.Ch.) et se poursuit jusqu'au 01/06 avec notamment 6 individus dans les prairies de Perdrette (M.-P. & X.H.). Le passage postnuptial, beaucoup plus net, s'étale du 23/08 au 19/10 - 1 individu tardif impasse de la Borgne (X.H.). Il s'agit le plus souvent de 1 à 6 oiseaux excepté plus de 15 individus à Ker Bossy le 24/08 (M.-P. & X.H.) et 9 individus autour du Moulin du Calvaire le 15/09 (X.H.). Plus de preuve de reproduction sur l'île.

GOBEMOUCHE NAIN *Ficedula parva* (1/2)**

Enfin deux nouvelles observations de Gobemouche nain sur l'île à l'automne : 1 1^{ère} année posé près du phare des Corbeaux le 03/10 (L.S., V.A. & J.-M.G., P.D., B.R., M.-P.H., S.D., B.I. *et al.*) et 1 adulte dans la dépression puis sur la dune de la Grande Conche le 17/10 (D.D.). Ces données sont en cours d'examen par le comité d'homologation vendéen (CH85).

Il s'agit seulement des 2 et 3^{ème} mentions de l'espèce sur l'île après celle d'un individu dans le camping le 05/10/2014 (J.-M. Guilpain, B. Isaac & F. Portier).





Photos © Jean-Marc Guilpain

GOBEMOUCHE NOIR *Ficedula hypoleuca* (590/122)

L'espèce est observée cette année aux deux passages. Le passage prénuptial, très peu marqué, débute le 18/04 avec 1 femelle à la Bergerie (B.I.) et se poursuit jusqu'au 01/06 avec 1 individu tardif dans les prairies de Perdrette (M.-P. & X.H.). Le passage postnuptial, très marqué, s'étale du 23/08 au 06/10 - encore 2 individus autour de la pointe des Corbeaux (F.P. & M.-P.H.). Le nombre d'oiseaux à la fin du mois d'août - par exemple plus de 12 individus dans la seule dépression de la dune de la Grande Conche (X.H., J.-P. & C.S.) - est tout à fait remarquable avec certains jours des oiseaux dans presque tous les buissons (sans doute plusieurs centaines d'oiseaux sur l'île).



Photo © Didier Simon

MÉSANGE À LONGUE QUEUE *Aegithalos caudatus* (1332/90)

L'espèce est commune et nicheuse sur l'île. Elle y est observée toute l'année.



Photo © Olivier Penard

MÉSANGE BLEUE *Cyanistes caeruleus* (2096/146)

L'espèce est commune et nicheuse sur l'île. Elle y est observée toute l'année. Les premiers jeunes volants sont notés dès le 12/05 à Ker Bossy (M.-P.H.).

MÉSANGE CHARBONNIÈRE *Parus major* (2050/214)

L'espèce est commune et nicheuse sur l'île. Elle y est observée toute l'année. Les premiers jeunes volants sont notés dès le 30/04 au Marais Salé (L.D.).

LORIOT D'EUROPE *Oriolus oriolus* (83/8)

L'espèce est observée uniquement lors du passage prénuptial du 17/04 au 01/05. Plusieurs groupes d'oiseaux sont notés en migration active depuis la dune de la Grande Conche : 15 individus en 2 groupes le 18/04 (M.-P. & X.H.). Les autres observations se répartissent entre les marais de la Croix, de la Guerche, Ker Aura, les prairies de Perdrette et la Bergerie et ne concernent qu'un individu à chaque fois. Aucun indice de nidification.

PIE-GRIÈCHE ÉCORCHEUR *Lanius collurio* (58/9)

La Pie-grièche écorcheur, qui ne niche plus sur l'île depuis plus de 20 ans, est observée cette année aux deux passages. Au printemps, 1 mâle est découvert le 14/05 près de la mare du But (V.A. & J.-M.G.). A l'automne, plusieurs oiseaux de 1^{ère} année sont notés : 1 premier individu à Ker Bossy les 23 et 24/08 (M.-P. & X.H.), 1 second individu dans les prairies de Perdrette le 24/08 (M.-P. & X.H.), 1 troisième individu au-dessus du vallon du Jars le 26/08 (X.H. & J.-P.S.), 1 individu près de la carrière le 15/09 (X.H.) et 1 dernier individu près du Vieux Château du 23 au 31/10 au moins (V.A. & J.-M.G., A.L.G., M.-P., A. & X.H.).



Photos © Jean-Marc Guilpain

PIE-GRIÈCHE À TÊTE ROUSSE *Lanius senator senator* (42/2)**

La Pie-grièche à tête rousse est observée cette année uniquement lors du passage prénuptial : 1 mâle *senator* les 19 et 20/04 sur la dune près des Petits Fradets (M.-P. & X.H., D.S., V.A. & J.-M.G.). Ces données sont en cours d'examen par le comité d'homologation vendéen (CH85).



Photo © Jean-Marc Guilpain

PIE BAVARDE *Pica pica* (1804/141)

L'espèce, nicheuse sur l'île, y est observée toute l'année. Le nombre maximum d'individus observé ensemble est seulement de 7 le 02/10 au Marais Salé (F.P.) et le 09/10 dans les prairies de Perdrette (T.Y.). Le nombre de couples nicheurs, en nette diminution depuis quelques années, semble désormais stabilisé mais avec un effectif faible, inférieur à 10 couples. Affaire à suivre dans les années qui viennent...

CORNEILLE NOIRE *Corvus corone* (2519/305)

L'espèce est commune et nicheuse sur l'île. Elle y est observée toute l'année. Le plus gros groupe est observé sur la dune de la Grande Conche avec 23 individus le 10/09 (F.P.).

ÉTOURNEAU SANSONNET *Sturnus vulgaris* (2373/237)

L'espèce est assez commune et nicheuse sur l'île. Elle y est observée toute l'année. Les plus gros groupes sont observés à l'automne avec par exemple plus de 300 individus le 06/10 impasse de la Borgne à Port-Joinville (M.-P.H.).

ÉTOURNEAU ROSELIN *Pastor roseus* (86/3)**

L'Étourneau roselin est observé sur l'île à l'automne où il est désormais annuel. Un individu de 1^{ère} année est découvert le 05/09 posé sur un cyprès à la Bergerie (O.Pe.). Un oiseau de 1^{ère} année (le même ?) est observé près de la gare maritime à Port-Joinville (X.H., V.A. & J.-M.G.). Aucune observation ensuite. Ces données sont en cours d'examen par le comité d'homologation vendéen (CH85).

MOINEAU DOMESTIQUE *Passer domesticus* (1811/146)

L'espèce est très commune et nicheuse sur l'île. Aucune observation particulière cette année.

PINSON DES ARBRES *Fringilla coelebs* (2984/343)

L'espèce est très commune et nicheuse sur l'île. Elle y est observée toute l'année y compris en hiver - plus de 100 individus à la Bergerie le 03/01 (M.-P. & X.H.). Le passage d'automne est surtout perceptible en octobre avec par exemple plus de 800 individus en migration active au-dessus de la dune de la Grande Conche le 21/10 (V.A. & J.-M.G.).

PINSON DU NORD *Fringilla montifringilla* (268/10)

Le Pinson du Nord est observé cette année aux deux passages. Il s'agit presque uniquement d'individus en migration active. Au printemps, l'espèce est notée en mars avec par exemple 1 individu au-dessus de la rue Georges Clemenceau à Port-Joinville le 23/03 et un cadavre dans les laisses de mer de la plage de la Pulante le 31/03 (V.A. & J.-M.G.). À l'automne, le passage est très peu marqué avec seulement de 1 à 3 oiseaux - par exemple 2 individus le 17/10 au-dessus de la pointe des Corbeaux (D.D.) et 3 individus le 06/11 au-dessus du phare des Corbeaux. Aucune observation en hiver.

SERIN CINI *Serinus serinus* (942/130)

L'espèce est commune et nicheuse sur l'île où elle est observée toute l'année. A l'automne un petit passage est noté avec par exemple plus de 20 individus sur la dune de la Grande Conche le 21/10 (V.A. & J.-M.G.). Comme l'année dernière un petit groupe d'oiseaux s'installe dès septembre au-dessus de la plage de la Tourette - plus de 20 individus les 28/09 (X.H.) - et y stationne jusqu'en décembre.

VERDIER D'EUROPE *Chloris chloris* (1645/114)

L'espèce est assez commune et nicheuse en petit nombre sur l'île. Elle y est observée presque toute l'année (moins de données toutefois en hiver). Très petit passage à l'automne avec plus de 50 individus au-dessus de la dune de la Grande Conche le 21/10 (V.A. & J.-M.G.).

CHARDONNERET ÉLÉGANT *Carduelis carduelis* (2209/229)

L'espèce est commune et nicheuse sur l'île. Elle y est observée presque toute l'année (moins de données toutefois en hiver). Quelques rassemblements postnuptiaux sont notés avec par exemple 20 individus sur la dune de la Grande Conche le 27/08 (J.-P.S. & X.H.). Pas de passage important à l'automne.



Photo © Didier Simon

TARIN DES AULNES *Spinus spinus* (432/20)

Le Tarin des aulnes n'est observé cette année que lors du passage postnuptial entre le 10/10 et le 06/11 - 22 individus plage des Vieilles (V.A. & J.-M.G.). Le passage concerne surtout des oiseaux en migration active. Le maximum est noté le 21/10 avec plus de 100 individus en migration active au-dessus de la dune de la Grande Conche (V.A. & J.-M.G.).

LINOTTE MÉLODIEUSE *Linaria cannabina* (2284/346)

L'espèce est commune et nicheuse sur l'île. Elle y est observée de fin mars - 10 individus le 22/03 près de la carrière (V.A. & J.-M.G.) - à début novembre - 7 individus près de la plage du But le 04/11 (M.Do.). Après des regroupements importants en avril - par exemple plus de 250 individus le 16/04 sur la dune de la Grande Conche (F.P.) et près de la mare des Broches (V.A. & J.-M.G.) - les nicheurs se répartissent sur la côte sauvage. L'espèce est à surveiller puisqu'elle est classée comme vulnérable dans la dernière liste rouge des espèces menacées en France (UICN France, MNHN, LPO, SEOF & ONCFS, 2011) et dans la liste rouge des oiseaux nicheurs des Pays de la Loire (Marchadour *et al.*, 2014). À l'automne le passage, très peu marqué, est surtout noté en octobre avec par exemple plus de 50 individus au-dessus de la dune de la Grande Conche le 21/10 (V.A. & J.-M.G.). Pas d'observation en hiver.

BEC-CROISÉ DES SAPINS *Loxia curvirostra* (51/11)

Petit afflux cet automne pour cette espèce qui n'est pas notée tous les ans sur l'île. Les 2 premiers individus passent en vol au-dessus de la rue Georges Clemenceau à Port-Joinville le 15/07 (V.A. & J.-M.G.). Ensuite, le Bec-croisé des sapins est observé en petit nombre d'août à octobre - dernier oiseau en migration active au-dessus du phare des Corbeaux le 07/10 (F.P.). Il s'agit le plus souvent de moins de 15 individus, excepté 33 individus au-dessus de la dune de la Grande Conche le 14/09 (X.H.).



Photo © Jean-Marc Guilpain

ROSELIN CRAMOISI *Carpodacus erythrinus* (4/1)*

Nouvelle donnée à l'automne par cette espèce qui reste très rare sur l'île : 1 individu de 1^{ère} année est entendu puis observé le 04/09 dans un jardin à Chiron Bureau (J.-M.G.). Cette donnée est en cours d'examen par le comité d'homologation national (CHN).

Il s'agit seulement de la 5^{ème} mention de l'espèce sur l'île après celles d'un individu de 1^{er} hiver le 24/10/2007 dans la dépression de la dune de la Grande Conche (F. Portier & X. Hindermeyer), d'un individu de 1^{er} hiver au même endroit le 25/10/2009 (X. Hindermeyer), d'un individu de 1^{er} hiver le 05/10/2013 dans la saulaie de l'impasse de la Borgne à Port-Joinville (M.-P. & X. Hindermeyer) et d'un individu précoce dans la dépression de la dune de la Grande Conche le 22/08/2016 (M.-P. & X. Hindermeyer).



Photo © Jean-Marc Guilpain

BOUVREUIL PIVOINE *Pyrrhula pyrrhula* (1659/171)

Devenue très rare dans le reste du département, l'espèce est encore bien présente et nicheuse sur l'île. Elle peut y être observée toute l'année. La grande discrétion des oiseaux en période de reproduction empêche tout décompte précis des couples nicheurs et toute indication fiable d'une tendance démographique. Un suivi précis de l'espèce serait peut-être à mettre en place puisqu'elle est désormais classée comme vulnérable dans la dernière liste rouge des espèces menacées en France (UICN France, MNHN, LPO, SEOF & ONCFS, 2011) et en danger de disparition dans la liste rouge des oiseaux nicheurs des Pays de la Loire (Marchadour *et al.*, 2014). À l'automne, les observations concernent également des migrateurs comme ces 15 individus notés en migration active depuis la dune de la Grande Conche le 21/10 (V.A. & J.-M.G.).



Photo © Olivier Penard

GROSBEC CASSE-NOYAUX *Coccothraustes coccothraustes* (73/1)

Une seule observation cette année lors du passage postnuptial : 2 individus sur la côte sauvage près des Loges le 24/10 (V.A. & J.-M.G.).

BRUANT LAPON *Calcarius lapponicus* (12/2)**

Deux nouvelles données pour cette espèce rare qui est loin d'être annuelle sur l'île (la dernière observation datait de 2013 !) : 1 individu posé sur les pelouses près de la pointe des Chancelles le 01/10 (B.I., M.F., V.A. & J.-M.G.) et 1 individu posé pointe de la Tranche le 05/10 (M.-P., V.A. & J.-M.G.). Ces données sont en cours d'examen par le comité d'homologation vendéen (CH85).



Photo © Jean-Marc Guilpain

BRUANT DES NEIGES *Plectrophenax nivalis* (82/3)

Deux observations seulement cette années à des dates classiques. Un individu est découvert sur la dune de la Grande Conche le 29/10 (A.L.G.). Un individu (le même ?) est observé sur la dune de la Grande Conche (M.Do.) puis près du phare des Corbeaux (V.A. & J.-M.G.) le 06/11.



Photo © Jean-Marc Guilpain

BRUANT ORTOLAN *Emberiza hortulana* (86/2)**

Le Bruant ortolan est observé cette année aux deux passages mais en très petit nombre : 1 mâle adulte posé sur la plage de la Grande Conche le 21/04 (V.A. & J.-M.G.) et 1 1^{ère} année posé sur la dune de la Grande Conche le 31/08 (J.-P.S. & X.H.). Ces données sont en cours d'examen par le comité d'homologation vendéen (CH85).



Photo © Valérie Auriaux

BRUANT DES ROSEAUX *Emberiza schoeniclus* (337/3)

L'espèce n'est observée cette année, pour la première fois, que lors du passage prénuptial : 1 individu au Marais Salé le 31/03 (V.A. & J.-M.G.), 1 mâle dans les marais de la Guerche le 16/04 (B.I., F.P., M.-P. & X.H.) et 1 mâle tardif à Ker Bossy le 01/05 (X.H.).



Photo © Jean-Marc Guilpain

BRUANT PROYER *Emberiza calandra* (7/2)

Deux nouvelles données pour cette espèce qui reste très rare sur l'île : 1 individu arrive en vol et se pose sur un buisson de la dune de la Grande Conche le 18/04 (M.-P. & X.H.) et 1 individu (le même ?) en vol puis posé sur la dune de la Grande Conche le 19/04 (M.-P. & X.H.).

Il s'agit seulement des 8 et 9^{ème} mentions de l'espèce sur l'île après celles de deux individus entre le 4 et le 19 juin 1974 à l'est de la pointe du But et de 2 individus en juin 1977 entre le Caillou Blanc et la pointe du But (P. Nicolau-Guillaumet), d'un individu le 05/11/1995 à la Bergerie (M.-P. Vignault & X. Hindermeyer), d'un individu le 17/04/2006 pointe de Gilberge (M.-P. & X. Hindermeyer), d'un individu le 18/03/2009 sur la dune de la Grande Conche (F. Portier), de 2 individus le 07/04/2014 au phare des Corbeaux (F. Portier) et d'un individu posé sur la dune de la Grande Conche le 03/11/2018 (M.-P., A. & X. Hindermeyer).

PARULINE À GORGE ORANGÉE *Setophaga fusca* (0/1)*

Extraordinaire découverte cet automne avec l'observation d'une Paruline à gorge orangée mâle de 1^{ère} année le 02/10 dans le petit bois près du phare des Corbeaux (B.I., M.F., A.T., F.P., V. & I.A., J.-M.G., S.D., D.S. & X.H.). L'oiseau n'a malheureusement pas été retrouvé le lendemain malgré des recherches intensives. Il s'agit de la première mention de cette espèce sur l'île mais également d'une première française. Cette donnée est en cours d'examen par le comité d'homologation national (CHN).





Photos © Jean-Marc Guilpain & Iris Auriaux



Photo © Frédéric Portier

DROITS ET CITATIONS

Les données présentées restent la propriété entière de leurs observateurs. Elles doivent être citées comme telles dans la littérature : **Pouillot verdâtre** - 1 individu le 8 octobre 2019 Camping, L'Île d'Yeu - 85 (O. Penard, *in* Hindermeier & Hindermeier, 2020).

TRANSMISSION DES DONNÉES

Depuis 1990, nous avons entrepris de rassembler toutes les observations ornithologiques effectuées sur l'île d'Yeu depuis le début du siècle. L'ensemble de ces données a été transféré dans une base de données "YEU" réalisée sous MS Access. Afin de ne perdre aucune observation effectuée sur l'île ou dans ses eaux, nous remercions chaque observateur de bien vouloir nous transmettre ses observations après un séjour sur l'île. Depuis le début de l'année 2009, la LPO Vendée met à disposition une base de données en ligne sur laquelle il est possible de saisir toutes les observations faites en Vendée (<http://www.faune-vendee.org>). Une simple extraction permet ensuite de nous transmettre celles-ci sans les saisir une nouvelle fois mais nous acceptons aussi les données sous n'importe quelle autre forme.

DIFFUSION

La synthèse est envoyée à tous les observateurs de l'année en cours (sauf adresse inconnue) ainsi qu'à des ornithologues connus pour fréquenter l'île régulièrement. Elle est également adressée à la mairie de l'île d'Yeu.

Elle est disponible sur le site faune-vendée de la LPO Vendée (<http://www.faune-vendee.org>). Toutes les données sont intégrées à notre base de données "YEU".

BIBLIOGRAPHIE

BUGEON C., 2013. *Mémento des oiseaux observés à l'île d'Yeu de 1907 à fin 2012 (inventaire actualisé en 2013)*. Les dossiers du patrimoine. Editions Les Sévenelles, 120 p.

HINDERMEYER M.-P. & HINDERMEYER X., 2006. Avifaune de l'île d'Yeu : synthèse ornithologique - partie 3. *La Gorgebleue*, 21/22 : 3-22.

HINDERMEYER X. & HINDERMEYER M.-P., 2014a. Le Traquet motté. *In* Marchadour B. (coord.). *Oiseaux nicheurs des Pays de la Loire*. Coordination régionale LPO Pays de la Loire, Delachaux et Niestlé, Paris, 2014 : p. 366-367.

HINDERMEYER X. & HINDERMEYER M.-P., 2014b. La Fauvette pitchou. *In* Marchadour B. (coord.). *Oiseaux nicheurs des Pays de la Loire*. Coordination régionale LPO Pays de la Loire, Delachaux et Niestlé, Paris, 2014 : p. 408-411.

HINDERMEYER M.-P., HINDERMEYER X. & PORTIER F., 2017. Points chauds. Une destination "ornitho" à part entière : l'île d'Yeu (Vendée). *Ornithos*, 24-1 : 17-33.

MARCHADOUR B., BEAUDOIN J.-C., BESLOT E., BOILEAU N., MONTFORT D., RAITIÈRE W., TAVENON D. & YÉSOU P., 2014. *Liste rouge des oiseaux nicheurs des Pays de la Loire*. Coordination régionale LPO Pays de la Loire, Bouchemaïne, 24 p.

MAYAUD N., 1944. Le Guêpier d'Europe à l'île d'Yeu. *L'Oiseau et la Revue Française d'Ornithologie*, Nouvelle Série, Volume XIV : 198-199.

UICN France, MNHN, LPO, SEOF & ONCFS, 2011. *La liste rouge des espèces menacées en France - Chapitre Oiseaux de France métropolitaine*. Paris, France, 28 p.