



La Courtilière

Gryllotalpa gryllotalpa

Appelée aussi Taupe-grillon ou Taupette, la Courtilière est un insecte proche des grillons.

D'apparence très caractéristique, elle est cependant difficile à voir, passant une bonne partie de son activité dans le sol ou cachée dans la végétation.

Elle se trahit le plus souvent par le chant des mâles, que l'on peut entendre surtout en mai et juin, en fin de journée et durant la nuit.

Ce dernier est composé d'un bourdonnement continu, plus ou moins strident, qui peut durer plusieurs minutes :

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/84/Gryllotalpidae_06-15.ogg

Assez caractéristique, il peut cependant être confondu avec le chant d'oiseaux comme les Locustelles ou avec celui des Crapauds calamites ou verts (ce dernier est absent de GE).

Autrefois répandue, cet insecte des milieux humides et des potagers s'est raréfié dans de nombreuses régions et nous faisons appel à vous pour mieux connaître sa répartition actuelle dans le bassin genevois.

Merci de faire part de vos données en précisant le mode d'observation (à vue / chant), la localisation précise et autant que possible le type d'habitat (jardin, cultures, prairies, pâturages, milieux humides, etc. dans « remarques ») et le nombre d'individus.

Un enregistrement du chant (par exemple à l'aide d'un smartphone) est très précieux et permet de s'assurer de la détermination. De même **une photo** est la bienvenue en cas d'observation à vue.

Vous pouvez d'ores et déjà transmettre vos observations sur le site de Faune Genève (www.faunegeneve.ch)

D'avance merci pour vos contributions !