

Capture d'un Pouillot à grands sourcils *Phylloscopus inornatus* à La Berra, dans les Préalpes fribourgeoises

Michel BEAUD

La Berra (46°40' N; 7°11'E), samedi 11 octobre 2003: il fait grand beau, nous sommes au soleil à 1600 m d'altitude, le plafond nuageux est situé 300 m plus bas. Au loin, nous devinons la chaîne du Jura; les Préalpes bernoises sont bien visibles.

La migration en montagne a repris de l'intensité après les importantes chutes de neige du week-end des 5 et 6 octobre. Tout présage une belle journée de migration. Parmi les observations de ce jour, nous mentionnerons: 17 Grands Cormorans *Phalacrocorax carbo*, 1 Milan royal *Milvus milvus*, 4 Buses variables *Buteo buteo*, 30 Pigeons ramiers *Columba palumbus*, 3 Alouettes lulus *Lullula arborea*, 7 Hirondelles rustiques *Hirundo rustica*, quelque 50 Etourneaux sansonnets *Sturnus vulgaris*, un grand passage de Merles noirs *Turdus merula*, la première Grive mau-

vis *T. iliacus* et aussi un bon passage de fringilles, Pinsons des arbres *Fringilla coelebs* et P. du Nord *Fr. montifringilla*, Chardonnerets élégants *Carduelis carduelis* et Tarins des aulnes *C. spinus*. Nous avons également capturé 253 oiseaux, entre autres: 61 Rougegorges *Erithacus rubecula*, 48 Roitelets huppés *Regulus regulus*, 44 Troglodytes *Troglodytes troglodytes*, 20 Merles noirs, 35 Accenteurs mouchets *Prunella modularis*, 15 Pouillots véloces *Phylloscopus collybita*, 8 Roitelets à triple bandeau *Regulus ignicapillus* et, à 22h, une Chouette de Tengmalm *Aegolius funereus*. Ce fut la meilleure journée de la saison, tant au niveau de la quantité que de la diversité (17 espèces).

A l'échelle de la Suisse, la spécialité de La Berra est indéniablement le baguage du Roitelet huppé (5261 captures à ce jour), soit un



M. Beaud

Pouillot à grands sourcils *Phylloscopus inornatus*. La Berra, 11 octobre 2003.

peu plus du quart du total des oiseaux pris au cours de la même période. Afin de mener notre étude sur cette espèce avec succès, nous avons équipé l'ensemble de la station de filets à mailles de 12 mm, ce qui nous permet d'optimiser les prises de ce petit passe-reau. Nous avons également remarqué que le nombre de prises d'oiseaux de petite taille, notamment le Troglodyte, avait fortement augmenté, ce qui prouve l'efficacité de ces filets (BEAUD 1999).

Il est 8h20 ce 11 octobre, lorsque Claude Perroud me signale qu'il y a « du spécial » dans la dernière tournée qu'il vient d'effectuer aux filets. En effet, peu de temps après, je sors du sac un passereau de petite taille, avec un joli sourcil jaune clair et deux bandes alaires. Tout d'abord un peu perplexes, nous consultons « l'Album Ornitho » (SVENSSON *et al.* 2000). Nous vérifions ensuite tous les critères, les formules alaires dans SVENSSON (1992), procédons à des mensurations et parvenons à la conclusion qu'il s'agit d'un Pouillot à grands sourcils *Phylloscopus inornatus*. La longueur d'aile de 58 mm nous suggère que nous sommes en présence d'un mâle mais nous ne nous prononcerons pas quant à la détermination de l'âge. Notre vedette du jour a été munie d'une bague, photographiée sous toutes les coutures et relâchée peu de temps plus tard. La littérature

mentionne que ce pouillot est souvent en compagnie d'autres *Phylloscopus* et de roitelets, ce qui explique peut-être sa présence à La Berra. L'oiseau en question a été signalé à la Station ornithologique de Sempach et l'observation acceptée par la Commission de l'avifaune suisse.

Si l'on considère que la limite de répartition occidentale du Pouillot à grands sourcils se situe dans la région de l'Oural (60°50' N; 55°50' E; CRAMP 1992), notre oiseau a parcouru au moins 3470 km avant de se prendre dans nos filets. Cette espèce hiverne habituellement dans le sud de l'Asie. Selon WINKLER (1999), il s'agit d'un hôte accidentel comptant seulement 5 mentions en Suisse jusqu'en 1992 (4 en octobre et 1 en septembre). Il s'agit évidemment de la sixième mention pour notre pays, de la première pour le canton de Fribourg et, comme nous aimons le relever en plaisantant, « de la première mention suisse du millénaire ».

Summary – Capture of a Yellow-browed Warbler *Phylloscopus inornatus* at La Berra in the foothills of the Alps, Canton of Fribourg – On 11 October 2003 a Yellow-browed Warbler was captured in nets at la Berra ringing station at 46°40' N, 7°11' E Switzerland. The site was specifically equipped for the capture of Firecrests and Goldcrests. This was the 6th sighting of this species in Switzerland. (Translation: M. Bowman)

Bibliographie

- BEAUD, M. (1999): Phénologie de la migration du Roitelet huppé *Regulus regulus* à La Berra de 1984 à 1995. *Nos Oiseaux* 46: 163-174.
- CRAMP, S. (1992): *Handbook of the Birds of Europe the Middle East and North Africa*. Vol. 6. Oxford University Press, Oxford.
- SVENSSON, L. (1992): *Identification Guide to Passerines*. Fourth revised and enlarged edition 1992. Heraldo Fournier SA, Vitoria, Spain.
- SVENSSON, L., K. MULLARNEY, D. ZETTERSTRÖM & P. J. GRANT (2000): *L'Album Ornitho*. Delachaux et Niestlé S.A., Lausanne et Paris.
- WINKLER, R. (1999): *Avifaune de Suisse*. *Nos Oiseaux*, suppl. 3.

Groupe de baguage de la Berra, p. a.: Michel BEAUD, Musée d'histoire naturelle, Ch. du Musée 6, CH-1700 Fribourg