

# Les Théclas (Rhopalocéra: Lycaenidae) en Deux-Sèvres

Reconnaissance et répartition



# *Satyrium* spp

La Thécla du prunier



La Thécla de l'yeuse



La Thécla de  
l'amarel



La Thécla de l'orme



# 'Les autres'




# La Thécla de la ronce, *Callophrys rubi*



- **Vol : 11 avril – 3 juin**
- **Habitat : broussailles et prairies bocagères, lisières et clairières, landes**
- **Pondent sur de nombreuses légumineuses – Lotier, Genêt des teinturiers, Genêt de balais – mais aussi Cornouiller sanguin, Hélianthème commun et Ronces**
- **Comportement : mâles sont territoriaux ; femelles volent juste au-dessus de la végétation et cherchent les plantes hôtes**
- **Butinent : Cornouiller sanguin, Lotier**

# Thécla de la ronce




Sources : N. Wilding, M. Boullant, N. Cotel, B. Rochelet (DSNE, mars 2008)

# La Thécla de prunier, *Satyrium pruni*



- **Vol : 22 mai – 4 juin**
- **Habitat : haies, fourrées et broussailles d'Epine noir, bien établi avec orientation sud/sud-ouest**
- **Pondent sur Epine noir et autres *Prunus* spp**
- **Comportement : active autour des arbustes à 1-3 m de hauteur, de 11h le matin en plein soleil**
- **Butinent : Troène et Cornouiller sanguin**

# Thécla du prunier



Sources : N. Wilding, M. Boullant, N. Cotrel, B. Rochelet (DSNE, mars 2008)

# La Thécla de l'yeuse, *Satyrium ilicis*



- **Vol : 3 - 30 juin**
- **Habitat : lisières et bois clairs de chênes**
- **Pondent sur plusieurs espèces de Chênes**
- **Comportement : active de 11 h le matin en plein soleil, souvent autour des arbustes à 1-2 m d'hauteur**
- **Butinent Ronces, Troène, *Sambucus ebulus*, Châtaignier**



# La Thécla de l'amarel, *Satyrium acaciae*



- **Vol : 2 – 25 juin**
- **Habitat : le long de haies ou de lisières et broussailles à Pruneliers peu entretenues**
- **Pondent sur Epine noir**
- **Comportement : active de 11h en plein soleil à 1 – 2 m d'hauteur**
- **Butinent surtout sur Troène, aussi sur Ronces et Orpins**

# Thécla de l'amarel




Sources : N. Wilding, M. Boullant, N. Cotrel (DSNE, mars 2008)

# La Thécla de l'orme, *Satyrium w-album*



- **Vol : 8 juin – 20 juillet**
- **Habitat : Lisières et haies avec de grands Ormes**
- **Pondent sur plusieurs espèces d'Orme (peuvent utiliser les rejets)**
- **Comportement : volent autour du sommet des grands Ormes mais descendent pour boire et butiner surtout avant 11h et après 18h**
- **Butinent: Troène, Ronce (ici sur Garance voyageuse)**

# Thécla de l'orme




Sources : N. Wilding, M. Boullant, N. Cotrel, B. Rochelet (DSNE, mars 2008)

# La Thécla du chêne, *Neozephyrus quercus*



- **Vol : 9 juin – 8 août**
- **Habitat : bois et bosquets de Chênes; Chênes individuels en haies**
- **Pondent sur espèces de Chêne**
- **Comportement : volent en groupes autour la tête d'un grand Chêne ou Frêne (l'arbre 'maître') ; se nourrissent de miellat de pucerons ; descendent pour boire et pour prendre des minéraux quand il fait chaud ; souvent actives le soir**
- **Ne butinent jamais les fleurs**

# Thécla du chêne



Sources : N. Wilding, M. Boullant, N. Cotrel, B. Rochelet (DSNE, mars 2008)

# La Thécla du bouleau, *Thecla betulae*



- **Vol : 26 juillet – 25 septembre**
- **Habitat : haies, jardins, lisières, bois clairs et broussailles mais toujours pas loin de grands arbres**
- **Pondent sur Epine noir et autres *Prunus spp***
- **Comportement : volent au sommet de grands arbres (souvent les Frênes) ; se nourrissent de miellat de pucerons ; mâles ne descendent jamais ; femelles descendent pour pondre et pour butiner**
- **Butinent: Eupatoire et autres Composées, Ronces**



# La Thécla des nerpruns, *Satyrium spini*



- **Vol : ?**
- **Habitat : lisières chaudes, pelouses sèches envahis de buissons**
- **Pondent sur Nerprun purgatif et Bourdaine**
- **Comportement : ?**
- **Butinent: Serpolet, Orpins et autres plantes basses**

# Thécla des nerpruns



Sources : N. Wilding, M. Boullant, N. Cotel (DSNE, mars 2008)

# Prospection



- 1 - Un habitat approprié?
- 2 - Plantes hôtes présentes?
- 3 - Fleurs à butiner présentes?

Si 'oui'

Cherchez à la bonne saison, en tenant compte du comportement de l'espèce