

LA BERRA 2025

Captures, généralités :

Les séances MoDem de printemps ont été réalisées le 5, 13 et 24 juillet, depuis cette année à l'emplacement sur lequel les filets sont posés en automne. **La session de printemps totalise 42 oiseaux bagués pour 16 espèces et nous donne le sentiment d'une faible année de reproduction.**

En automne, la station a été occupée 27 jours répartis sur 10 week-ends et une semaine de permanence du 7 octobre au 12 octobre. Les mauvaises conditions (bise, neige ou pluie) étaient au rendez-vous et les filets n'ont pas pu être utilisés de façon optimale !

Les filets sont tendus jusque tard dans la nuit ; ils sont ensuite ré-ouverts avant l'aube pour la « tombée du matin ». En fonction du nombre de personnes à disposition seuls certains groupes de filets ont parfois été ouverts. **34 espèces ont été capturées pour cette saison, il s'agit petite saison, 747 oiseaux bagués.** (1369 en 2023, 613 en 2024).

Parmi les captures particulières mentionnons celles de deux Pics noirs le 15 septembre et celle d'une Chevêchette d'Europe le 16 octobre.

Roitelet huppé :

182 Roitelets huppés ont été capturés de la saison : 116 mâles (63,7%) et 66 femelles (36.3 %). (Pour 39 en 2024). Le pic de passage a été remarqué le 18 octobre totalisant 65 captures (plus du 1/3) ce jour-là. Aucun cas de parasite « Collyriclum faba » décelé cette saison.

Analyse sommaire des résultats :

Les 5 espèces les plus représentées au niveau des captures (soit le 80 %) sont :

Rougegorge familier :	279	soit le	37,3 %
Roitelet huppé :	182	soit le	24,3 %
Roitelet à triple bandeau :	53	soit le	7,1 %
Troglodyte mignon :	47	soit le	6.3 %
Grive musicienne :	40	soit le	5.3 %

Reprise de la Berra :

Le 02.04.2024, reprise d'un **Rougequeue à front blanc** (B 686538) à Locarno (TI) : Oiseau contrôlé par un bagueur et relâché. Cet oiseau avait été bagué le 21.08.2022 à la Berra (FR) comme jeune mâle. **(Distance 142 km, laps de temps 590 jours soit environ 1 an et 8 mois).**

Observations commentées : (84 espèces répertoriées).

Du côté mammifère, une première, nous avons observé plusieurs nuits d'affilée au brâme du Cerf, une première : au moins 2 mâles et 6 femelles.

En plus des observations directes nous avons installé **un système d'écoute acoustique**. Celui-ci a non seulement confirmé nos observations mais a mis en évidence pour la première fois le passage du **Courlis cendré**, le 7 octobre et le passage régulier du Héron cendré.

Tétras lyre : 29 journées avec présence entre le 19 juillet et le 31 octobre : Le 11 Octobre : 10 individus dont 7 mâles (2 jeunes de l'année), 3 femelles. Le 12 octobre : 12 individus dont au moins 4 mâles posés sur la barrière au sommet Berra, 1 femelle au sol / 5 mâles signalés au Cousimbert.

Caille des blés : 2 chanteurs sur le bas du col, première mention pour la Berra, le 19 juillet.

Grand Cormoran : Un total de 77 oiseaux observés : 9 le 24 août, 42 le 7 octobre, 26 le 12 octobre.

Héron cendré : 6 passages nocturnes, au moins 6 individus entre le 19 juillet et le 14 octobre.

Bondrée apivore : Un total de 28 oiseaux observés : 2 le 30 août, 12 le 31 août, 1 le 3 septembre, 7 le 6 septembre, 6 le 14 septembre.

Milan noir : Un total de 6 oiseaux observés : 1 le 12 juillet, 2 le 13 juillet, 1 le 18 juillet, 2 le 19 juillet.

Milan royal : 23 journées avec présence entre le 5 juillet et le 7 octobre. Un total de 54 oiseaux observés ; plusieurs mentions à 5 individus.

Busard indéterminé : 11 individus entre le 7 septembre et le 14 septembre.

Busard des roseaux : Un total de 42 oiseaux observés entre le 22 août et le 30 septembre, journée record : 11 individus le 7 septembre. Au total au moins 5 mâles, les autres individus étaient du type femelle/jeune.

Busard cendré : 1 jeune au passage sur le col le 20 septembre à 12h46.

Autour des palombes : 1 individus le 10 août.

Épervier d'Europe : 26 journées avec présence avec un total de 99 oiseaux observés : passage marqué : 11 le 6 septembre, 13 le 7 octobre et 12 le 8 octobre.

Buse variable : 23 journées avec présence et un total de 99 oiseaux observés : avec un passage marqué : 16 le 6 septembre, 10 le 7 septembre, 20 le 28 septembre.

Aigle royal : 10 journées avec présence avec un total de 15 individus : couple avec un jeune le 5 juillet, 2 adultes le 12 juillet, 1 adulte et 1 jeune le 29 septembre.

Faucon crécerelle : 34 journées avec la présence et un total de 125 oiseaux observés, meilleures journées : 10 le 6 septembre et 13 le 29 septembre.

Faucon hobereau : Un total de 3 individus entre le 26 août et 6 septembre.

Bécasse des bois : 6 mentions d'observation entre 20 septembre et le 19 octobre, dont 2 individus le 19 octobre.

Courlis cendré : Un migrateur le 7 octobre à 18h48, première mention pour la Berra.

Pigeon ramier : 8 journées avec présence avec un total de 18 individus : 6 individus le 12 octobre. Nicheurs locaux et pas migrateurs.

Chouette hulotte : 11 nuits avec présence entre le 31 août et 14 octobre, couple régulier. Capture d'un individu le 8 octobre.

Hibou moyen-duc : 5 nuits avec présence entre le 19 septembre et le 17 octobre, 2 individus le 12 octobre.

Chouette de Tengmalm : 1 mention le 7 octobre.

Martinet noir : 3 mentions d'observation totalisant 6 oiseaux entre le 19 juillet et le 7 septembre.

Martinet à ventre blanc : 4 journées avec présence de martinets chassant sur le col avec au moins 50 individus le 16 août et 48 le 7 septembre.

Guêpier d'Europe : > 2 oiseaux observés le 5 septembre, au moins 1 individu le 6 septembre, respectivement 7^{ème} et 8^{ème} mention pour la Berra.

Torcol fourmilier : une observation le 20 septembre, soit la 8^{ème} mention pour la Berra.

Pic noir : 19 journées avec présence entre le 30 août et le 18 octobre. 2 captures le 15 septembre.

Pic épeiche : 19 journées avec présence entre le 5 juillet et le 29 octobre dont 3 individus les 6 et 8 octobre. 1 capture le 30 septembre.

Pic tridactyle : 2 observations : respectivement le 29 septembre et le 7 octobre.

Alouette lulu : Au moins 2 chanteurs nocturnes entre le 5 juillet et le 20 juillet (critère de nidification 3). Recolonisation vraisemblable de l'espèce qui nichait encore en 1955 (J. Strahm). Passage de 13 individus entre le 9 et le 19 octobre.

Alouette des champs : 21 journées avec présence, passage marqué 207 individus entre le 11 et le 19 octobre.

Hirondelle de rivage : Au moins 10 individus de passage mélangés avec les Hirondelles de fenêtre le 28 septembre. 5^{ème} mention pour la Berra.

Hirondelle rustique : 20 journées avec présence entre le 5 juillet et le 12 octobre. Oiseaux en quête de nourriture et de passage (plus de 500 individus à l'heure) les 6, 7 et 17 septembre.

Hirondelle de fenêtre : 18 journées avec présence entre le 16 août et le 13 octobre. De grands passages de plusieurs centaines entre le 6 septembre et le 8 octobre.

Pipit des arbres : 13 journées avec présence entre le 5 juillet et le 30 septembre. 47 individus le 17 septembre.

Pipit farlouse : 24 journées avec présence. Nidification : 1 famille le 19 juillet. 217 individus entre le 5 juillet et le 19 octobre. Passage marqué 95 individus entre le 11 et le 17 octobre.

Pipit spioncelle : Passage faible, 8 journées avec présence totalisant 34 individus.

Bergeronnette printanière : passage assez faible, 5 journées avec observation entre le 31 août et le 11 octobre totalisant 37 individus.

Bergeronnette des ruisseaux : 2 mentions avec un total de 5 individus, respectivement le 21 et le 29 septembre.

Bergeronnette grise : Nidification, au moins une famille le 6 juillet. 25 journées avec présence, au total 256 individus, passage un peu plus marqué entre le 15 septembre et le 19 octobre.

Troglodyte mignon : Au moins 19 journées avec présence entre le 5 juillet et le 19 octobre. Au total 50 captures.

Accenteur mouchet : Au moins 28 journées avec présence, passage peu marqué, 27 captures.

Rougegorge familier : présence quotidienne espèce la mieux représentée au niveau des captures mais nombre assez faible 283 individus.

Rougequeue noir : Nidifications mentionnées jusqu'au 27 août, passage peu marqué.

Rougequeue à front blanc : 3 mentions d'observations entre le 16 août et le 28 septembre.

Tarier des prés : observation d'un individu le 24 août.

Traquet motteux : Passage plus marqué qu'habituellement, 18 individus entre le 7 septembre et le 1 octobre.

Merle à plastron : réapparition de cette espèce peu observée les années précédentes. 31 individus mentionnés entre le 5 juillet et le 15 octobre. Pas de capture.

Merle noir : 19 journées avec présence, passage peu marqué.

Grive litorne : 4 mentions entre le 10 septembre et le 19 octobre totalisant 9 individus.

Grive musicienne : Espèce la plus représentée au niveau des captures avec 40 individus.

Grive mauvis : 4 mentions d'observation entre le 4 octobre (la première de la saison) et le 17 octobre. Capture d'un adulte le 11 octobre.

Grive draine : 23 journées avec présence et un total de 316 oiseaux avec un maximum de 85 oiseaux le 12 octobre.

Fauvette à tête noire : 1 individu le 8 octobre, 7 captures de la saison.

Fauvette des jardins : 1 individus le 19 juillet.

Fauvette babillarde : Nidification, famille le 5 juillet, 11 journées avec présence.

Pouillot véloce : mentions entre le 5 juillet et le 8 octobre, seules 24 captures.

Pouillot fitis : mentions entre le 16 août et le 17 septembre, seules 14 captures.

Roitelet huppé : Mentions quasi-quotidiennes, 182 captures dont 65 le 18 octobre.

Roitelet à triple bandeau : mentions entre le 15 septembre et le 17 octobre, 53 captures.

Gobemouche noir : Passage peu marqué, 6 mentions entre le 19 juillet et le 6 septembre.

Mésange alpestre : présence quasi-quotidienne.

Mésange huppée : présence quasi-quotidienne.

Mésange noire : Présence et passage peu marqués totalisant 151 individus.

Mésange bleue : 12 journées avec présence, 148 individus le 16 octobre et 80 le 19 octobre.

Mésange charbonnière : Présence faible entre le 5 juillet et le 19 octobre : 15 individus.

Grimpereau des bois : Jeunes fraîchement envolés le 5 juillet, Présence faible entre le 5 juillet et le 12 octobre.

Pie-grièche écorcheur : **Deuxième année de nidification** avec au moins 2 jeunes se faisant nourrir le 19 juillet, présence de 2 mâles dont un bagué (en 2024 ?) et d'une femelle.

Geai des chênes : 13 jours de présence entre le 24 août et le 11 octobre totalisant 17 oiseaux.

Cassenoix moucheté : 3 jeunes fraîchement envolés le 19 juillet : 33 journées de présence, avec souvent 4 individus, (5 le 17 août) qui transportent des réserves du flanc Nord au flanc Sud. (Selon nos observations très certainement des graines de Sapin blanc *Abies alba* : pives décortiquées). 1 capture le 30 septembre.

Corneille noire : 6 mentions d'observation entre le 10 août et le 31 octobre, au maximum 5 individus.

Grand Corbeau : 35 journées de présence, en plus du couple territorial, observations de rassemblement allant jusqu'à 50 individus liées très certainement à une source de nourriture (cadavre ?) entre le 20 août et le 16 septembre.

Étourneau sansonnet : Passage peu marqué : 7 journées avec présence entre le 13 juillet et le 18 octobre totalisant 250 individus.

Pinsons des arbres : 35 journées de présence, passage très peu marqué correspondant vraisemblablement à une mauvaise saison de nidification, les maximums : quelque 1400 individus le 4 et le 12 octobre.

Pinson du Nord : Passage peu marqué entre **première mention de la saison le 28 septembre** et le 29 octobre.

Serin cini : 7 individus entre le 8 et le 29 octobre.

Venturon montagnard : 1 observation le 12 octobre.

Verdier d'Europe : 2 mentions respectivement le 5 juillet et le 21 septembre.

Chardonneret élégant : 21 journées avec présence totalisant 297 oiseaux avec un maximum de 110 oiseaux le 12 octobre.

Tarin des aulnes : Passage très peu marqué, 13 journées avec présence totalisant 845 oiseaux avec un maximum de 322 oiseaux le 12 octobre. Aucune capture !

Linotte mélodieuse : 21 journées avec présence totalisant 191 oiseaux entre le 6 juillet et le 18 octobre.

Bec-croisé des sapins : Passage peu marqué : 29 journées avec présence totalisant 491 oiseaux, Un maximum de 74 individus le 4 octobre.

Bouvreuil pivoine : 25 journées avec présence de quelques individus, des locaux ? jusqu'à 7 oiseaux le 11 octobre.

Grosbec casse-noyaux : Très faible passage, 217 individus entre le 7 octobre et le 19 octobre. 1 capture le 18 octobre.


Bruant jaune : **Deuxième année de nidification pour le site**, au moins 2 territoires. 26 journées avec présence entre le 5 juillet et le 18 octobre.

Remerciements :

Nos remerciements vont aux familles Jean Brodard, à Mme Rita Wechsler et à Eric Marthe pour leur compréhension dans notre travail. Un merci tout spécial aux ornithologues du groupe de baguage de la Berra : Henri Vigneau, Armin Lehmann, Claude Perroud, Paul Ducry, Yann Schloeder, Christian Vaucher, Mathis et Nicolo et toutes les personnes qui sont venues nous rendre visite ou encore aidé lors des travaux d'entretien de la cabane (peinture de la façade et du toit).

Rapport terminé le 24.12.2025

Pour le groupe de baguage de la Berra,
Michel Beaud



*Bruant jaune, jeune reconnaissable à la commissure du bec bien marquée ;
2^{ème} année de nidification prouvée pour la Berra, le 24 août 2025 (M. Beaud).*



Roitelet à triple bandeau, un mâle, le 28 septembre 2025 (M. Beaud).

Annexe : Pupipares

La collecte de Pupipares (diptère hématophage) parasite des oiseaux a été réalisée dès 1994 à la Berra. Une récente publication a mis en évidence la relation entre les parasites et leurs hôtes. Ainsi 58 parasites prélevés sur le site appartiennent à 3 espèces réparties sur 18 hôtes, le tableau ci-dessous en donne la répartition.

Espèces	Hôtes	nombre
Stenepteryx hirundinis	Hirondelle rustique	1
Pupipare de l'hirondelle de fenêtre		
Ornithomya avicularia	Chouette de Tengmalm	7
Pupipare des oiseaux	Hibou moyen-duc	4
	Chouette hulotte	1
	Epervier d'Europe	1
	Geai des chênes	1
	Merle noir	1
	Grive musicienne	2
	Rougegorge familier	1
	Accenteur mouchet	1
Ornithomya fringillina	Roitelet huppé	18
Pupipare des mésanges	Roitelet à triple bandeau	8
	Grimpereau des bois	6
	Mésange noire	2
	Mésange alpestre	1
	Mésange bleue	1
	Mésange à longue queue nordique	1
	Accenteur mouchet	1



Ornithomya avicularia en cours de détermination sous le binoculaire (M. Beaud).

Référence : ENTOMO HELVETICA 18 : 121- 130, 2025

Quelles mouches ont piqué nos oiseaux ?

Découvertes intéressantes sur les Hippoboscides (Diptera) de la collection Beaud du Musée d'histoire naturelle de Fribourg. Nina Perret-Gentil, Michel Beaud & Sophie Giriens.

La Berra 2025

Espèces	sam	dim	dim	dim	sam	dim	sam	me	sam	dim	sam	dim	lu	ma	sa	di	lu	ma	me	je	ve	sam	dim	je	ve	sa	di	Total	MoDem	MoDem	MoDem
	16,8	18	24,8	31,8	6,9	7,9	15,9	17,9	21	21,9	28	29	30	31	4,10	5,10	6,10	7,10	8,10	9,10	10,10	11,10	12,10	16,10	17,10	18,10	19,10		05.07.25	13.07.25	24.07.25
Epervier d'Europe															1													1			
Tétras lyre										1																		1			
Chevêchette d'Europe																								1				1			
Chouette hulotte																			1									1			
Pic noir							2																					2			
Pic épeiche														1														1			
Cassenoix moucheté								1						1														2			
Mésange charbonnière																			1									1			
Mésange bleue										1													1					2			
Mésange noire								2						1			1										1	5	1		1
Mésange huppée	2							1																				3	1		1
Mésange alpestre							1		1																			2			
Grimpereau des bois			1										1		1			2					1					6	3		
Troglodyte mignon		1	1	1	1	2	6	7	2	5			3				2	3	2	1		1	3			3	3	47		3	
Rougegorge familier	4	1	1	7	4	5	18	18	22	30	2	9	55	16	6			2	12	2		16	11	4	3	23	8	279	1	2	1
Rougequeue noir				2		1																						3			
Rougequeue à front blanc	1					1		1																				3			
Merle noir						1	1		2					1				2	2	3			3	1			2	19		2	
Grive mauvis																						1						1			
Grive musiciennne				1			1	6	2	3		1	7	5								2	4	1		4	3	40			1
Fauvette à tête noire				1		1			2	1												1		1				7			3
Fauvette babillarde	1																											1	3		
Pouillot fitis	1		1	1		3	3	5																				14			
Pouillot véloce			1						4	1		3		1	1				5					1		6	1	24	2		2
Roitelet huppé, mâle							2	2	1	1	6	1			1		4	2		2	5	9	16	6	6	41	11	116			4
Roitelet huppé, femelle				1	1					2					2		3	1	2		4	1	10	4	3	24	8	66			
Roitelet à triple bandeau, mâle				1		1	2	5	3	7		1			1		1	2		1			2		1	1	5	34			1
Roitelet à triple bandeau, femelle						1		2	4	7			1	2									1	1				19			
Gobemouche noir	1			1	1	4																						7			
Accenteur mouchet	1				1		2	1	1	3			1	2	1			1	7				3		2	2		28	2		1
Pipit des arbres							2																					2			
Bergeronnette printanière				1																								1			
Grosbec casse-noyaux																									1			1			
Bouvreuril pivoine																												0	2		
Pinson des arbres															2								1				1	4	4		1
Bruant jaune			3																									3			
TOTAL: 34 Espèces	11	2	8	17	8	19	36	54	43	62	5	20	69	30	16	0	11	15	32	9	9	32	56	20	15	105	43	747	19	7	16