

Nourrissage hivernal des oiseaux

Est-il judicieux de nourrir les oiseaux en hiver ?

Seuls les oiseaux nicheurs et hivernants les plus fréquents de notre pays bénéficient du nourrissage hivernal. Leurs effectifs ne sont généralement pas mis en danger par les conditions de vie de la saison froide auxquelles ils sont habitués. Les espèces rares et menacées figurant sur la Liste rouge ne fréquentent guère les mangeoires. En fait, le maintien d'un environnement riche et sain constitue l'objectif central de la sauvegarde de la diversité des oiseaux.

Un nourrissage adéquat n'atteint certes qu'un nombre limité d'espèces d'oiseaux mais il n'est pas néfaste. De plus, donner des graines offre une bonne occasion d'observer les oiseaux de près et d'avoir un contact enrichissant avec la nature. C'est pourquoi il n'y a aucune objection à approvisionner raisonnablement les oiseaux, pour autant que l'on ne néglige pas les problèmes plus urgents concernant la protection des oiseaux et de la nature.

Règle générale pour le nourrissage hivernal :

1. Quand doit-on les nourrir ?


- Le nourrissage peut aider les oiseaux à survivre quand une couche de neige recouvre le sol, quand le sol est profondément et durablement gelé ou lors de pluies givrantes.
- Le moment de la journée : les besoins alimentaires sont les plus importants le matin car les oiseaux sont affamés après une longue nuit hivernale. On peut éventuellement remplir à nouveau les mangeoires dans le courant de l'après-midi, car les oiseaux refont le plein vers le soir en prévision de la nuit.

2. Que doit-on leur donner ?

Prenez par principe une nourriture naturelle et de qualité irréprochable qui ne soit ni salée, ni cuisinée et qui ne contienne aucun additif chimique.

Le pain n'est pas recommandé. Pour des raisons écologiques, nous renonçons à l'utilisation d'ingrédients exotiques comme l'huile de palme, la graisse de coco ou les cacahouètes. Seuls les pigeons et les moineaux mangent les mélanges contenant beaucoup de graines de céréales. C'est pourquoi il est conseillé d'utiliser des mélanges contenant en majorité des graines de tournesol et de chanvre. Les graines de tournesol foncées ont une coque plus tendre qui peut facilement être ouverte.

- **Les granivores** (oiseaux à bec conique et fort : fringillidés, moineaux, bruants) préfèrent les graines de tournesol et de chanvre. Ils prennent aussi la nourriture destinée aux insectivores.
- **Les insectivores** (oiseaux à bec fin et pointu) consomment avant tout une nourriture animale et des petites graines. Peu d'espèces, tels le merle noir, le rougegorge et l'étourneau, fréquentent régulièrement les mangeoires. Ils mangent volontiers des flocons d'avoine, des raisins secs, des fruits même un peu blets, des noix et des noisettes hachées, de la graisse ou du séré.



- **Les migrants** viennent plus rarement à la mangeoire. Cependant, au printemps surtout, des chutes de neige peuvent les empêcher de trouver leur nourriture. Dans de tels cas, on peut les aider en découvrant les tas de fumiers ou les composts et en enlevant la neige sous les arbres, sous les buissons et sur les devantes de portes. A ces endroits, nous pouvons déposer des flocons d'avoine, des raisins secs ou quelques vieilles pommes.

3. Comment doit-on les nourrir ?

- La nourriture devrait être à l'abri de l'humidité et du gel (mangeoires qui protègent les réserves de graines, filets, anneaux ou boules à graines).
- A proximité de la mangeoire, il devrait y avoir des arbres et des buissons qui puissent servir d'abri en cas de danger.
- Les abords immédiats de la mangeoire devraient être à découvert, dans un rayon de deux mètres au minimum, afin que les prédateurs comme les chats ne puissent guetter les oiseaux.
- La transmission de maladies contagieuses est de loin le plus grand danger sur les lieux de nourrissage hivernaux. Parmi elles, la salmonellose est une infection intestinale bactérienne mortelle. Les oiseaux ne devraient pas pouvoir se poser sur les graines afin que leurs fientes ne souillent pas la nourriture. Les salissures éventuelles les doivent être nettoyées à l'eau bouillante. S'il se trouve des oiseaux morts autour de la mangeoire, il faut l'enlever et bien la nettoyer. Il faut attendre 2 ou 3 jours avant de recommencer à alimenter les oiseaux.

4. Qu'en est-il de l'eau ?

Les oiseaux se baignent aussi en hiver et étanchent leur soif à un point d'eau. Cependant, le danger de propagation de maladie est ici en-

core plus grand. Si les règles d'hygiène sont strictement respectées et que l'eau est changée au moins une fois par jour, nous pouvons alors recommander les points d'eau. Les bains d'oiseaux avec de l'eau courante sont les meilleurs. Veuillez les installer hors de la portée des chats !

Combat contre l'ambrosie

L'ambrosie à feuille d'armoise (*Ambrosia artemisiifolia*) est une plante envahissante originaire d'Amérique du Nord. Les graines d'ambrosie peuvent se cacher dans les mélanges de graines pour oiseaux. Les pollens de cette plante peuvent provoquer des rhumes des foins et des crises d'asthme sévères. C'est pourquoi il faut si possible empêcher la poursuite de la propagation de cette plante. Les plantes en germination dans le jardin doivent immédiatement être arrachées et jetées à la poubelle où elles seront incinérées (pour de plus amples informations : www.acw.admin.ch). C'est ainsi que nous contribuerons à ne pas discrediter le nourrissage des oiseaux !

