

Scopri le variazioni di colorazione nella Poiana!

Hai visto una Poiana?
 Hai fatto caso alla colorazione del piumaggio?

Partecipa alla nostra ricerca!

Inserisci l'osservazione di Poiana su
Ornitho.it

Seleziona il progetto "BUMO" e scrivi nelle
 note il codice che identifica il morfotipo in
 fotografia più simile a quello osservato
(es: Bumo1, Bumo2, Bumo3 etc.)

- Inserisci un solo individuo per codice e viceversa.
- Prova a riconoscere tutte le poiane e non soltanto le più rare.

Hai scattato una fotografia?
 Allegala volentieri!

Trasmettere le mie osservazioni - Uccelli

*** Solo i campi preceduti da un asterisco sono obbligatori. Evitare di inserire dati rigorosamente certi

* Data
 19.09.2015 [ultimo_sabato] [ultima_domenica] [ieri] [oggi]

* Luogo
 Caramanico Terme - senza località definita altitudine (650 m (modi))
 [cambiare la località]

* Specie
 [maschera di selezione] Poiana

* Numero totale d'individui
 Valore esatto 1

▼ I campi qui sotto non sono obbligatori *** (vedi sotto)


Codice progetto : [BUMO] Buteo Morph

Potete fornire un'immagine JPEG (max. 450 pixels) o un suono MP3 della vostra osservazione (max. 1 Mb)

Browse... No file selected.

Commenti
 Nota Not protetta
 Bumo1

Successivo



Completamente scura,
(quasi) senza bianco



In generale scura,
 Poco bianco sul ventre



Banda chiara sul petto divide
 collo e ventre scuri



Banda chiara sul petto separa
 collo e ventre chiazzati, con
 testa e fianchi ancora scuri



Il collo può essere chiaro e
 macchiettato, con testa
 chiara striata. Fianchi ancora
 scuri



Biancastra, le copritrici
 sono ancora perlopiù scure



Generalmente bianca, testa
 chiara e collo variabile. Le
 copritrici sono bianche!

Scopri le variazioni di colorazione nella Poiana!



e.f.kappers@rug.nl

Elena F. Kappers^{1,2}, Bart Kempnaers², Christiaan Both¹

¹Conservation Ecology Group, Groningen Institute for Evolutionary Life Sciences (GELIFES), University of Groningen, Paesi Bassi
²Department of Behavioural Ecology and Evolutionary Genetics, Max Planck Institute for Ornithology, Seewiesen, Germania

Il progetto "Buteo morph" in pillole

La Poiana ha un piumaggio molto variabile: ci sono poiane molto scure, ma anche individui con un piumaggio molto più chiaro, e nel mezzo c'è una variazione continua. E' interessante che questa variazione abbia una base genetica, che a quanto pare è stata mantenuta nel tempo evolutivo. La domanda è perché questo sia il caso, e una delle possibilità è che individui di un colore (chiamati anche morfotipi) siano meglio adattati in un habitat piuttosto che in un altro. Si sa ancora poco sulla variazione spaziale dei diversi morfotipi tra popolazioni.

Con questa ricerca perciò vogliamo vedere se la variazione nella colorazione si riflette in una distribuzione spaziale diversa dei morfotipi, considerando osservazioni di individui sia giovani che adulti fatte durante tutto l'anno in tutto l'areale della specie. Vogliamo vedere se la distribuzione dei morfotipi può essere correlata a specifiche caratteristiche dell'habitat e/o a variabili climatiche.

Un modo per scoprirlo è attraverso l'utilizzo di dati che possono essere raccolti da tutti, con un cosiddetto approccio Citizen Science. Il progetto sarà in corso fino al 2017.



Bumo1



Bumo2



Bumo3



Bumo4



Bumo5



Bumo6



Bumo7